Smithsonian
Institution
Libraries

Gift of

DR. DAN NICOLSON

SCHÖNBRUNN'S

FLORA,

ODER

SYSTEMATISCH GEORDNETES VERZEICHNISS DER IM KAIS. KÖNIGL. HOLLÄNDISCH-BOTANISCHEN HOFGARTEN ZU SCHÖNBRUNN CULTIVIRTEN GEWÄCHSE

VON

JOS. BOOS,

k. k. Hofgartenassistenten

WIEN und TRIEST,
im Verlag der Geistingerschen Buchhandlung.
1816.

QK
73
S32
B66
1816
SCNHRB

Seiner Fürstlichen Gnaden

dem hochgebornen Fürsten

und Herrn

Ferdinand Fürsten zu Trauttmansdorff - Weinsberg und Neustadt am Kocher, gefürsteten Grafen von Umffenbach, Freyherrn auf Gleichenberg, Negau, Burgau etc. etc. Ritter des goldenen Vliefses, Grofskreuze des königl. Ungarischen St. Stephan - Ordens, der königl. Französischen Ehrenlegion, und des königl. Bayrischen Hubertus - Ordens, k. k. wirklichen geheimen Rathe, Kämmerer, Staats - und Conferenzminister, Obersten sämmtlicher kais. königl. Leibgarden, und Seiner kais. königl. apost. Majestät

Erstem Obersthofmeister,

dem hohen Beförderer und Beschützer der Künste und Wissenschaften

seinem erhabenen Chef und Gönner in dankbarster Ehrfurcht

gewidmet

vom

Verfasser.

June 1978
1168.09

Kurze Vorerinnerung.

Es sind nun bereits zwey und sechzig Jahre verflossen, seit welchen der k. k. Holländisch - botanische Hofgarten gegründet ist. Jeder Botaniker und Kunstverständige weifs nur zu genau, als dafs ich hier erst Erwähnung davon machen dürfte, wie derselbe von jener Zeit an bis auf heutigen Tag durch die besondere Aufmerksamkeit und Gnade unserer höchstseeligen Beherscher, und wie ganz vorzüglich derselbe durch den so allgemein bekannten Schutz und die

Unterstützung unseres jetztregierenden gnädigsten Kaisers, deren sich das Fach der Gartenkunst und Botanik erfreuet, mit den auserlesensten Pflanzenschätzen Indiens und Amerikas sowohl, als jenen vom Cap und den Inseln des Indischen Oceans bereichert wurde; wie er sich später durch Tausch mit den vorzüglichsten Gärten Deutschlands und anderer Länder immer mehr vervollkommte und erhob; und was für eine Auswahl an höchst seltenen und schönen Vegatabilien aller Art und aus allen Zonen und Ländern derselbe jetzt einschliefst.

Doch wozu nützt dieser Reichthum diese Vollkommenheit eines Gartens, wenn die Kenntnifs desselben nicht allgemein ist, wenn nicht Jedem, dem an ihr gelegen ist, ein Weg geöffnet wird ihr zu huldigen und seine Wifsbegierde zu befriedigen?

Um zu diesem Zwecke leichter gelangen zu können, habe ich gegenwärtiges Verzeichnifs aller mir bekannten im hiesigen k. k. Hofgarten befindlichen inn- und ausländischen Gartenge-

wächse (in soferne jene nicht gar zu gemein sind) verfafst, und habe das frohe Bewufstseyn, den Verehrern dieses Hofgartens einen nicht ganz unbedeutenden Dienst geleistet zu haben.

In Rücksicht des Leitfadens bey Bearbeitung meines Verzeichnifses, bin ich dem Linneischen Systeme nach der Ausgabe C. H. Persoon's gefolgt; theils, weil es das neueste botanische Universalwerk ist, welches die meisten Berichtigungen enthält; theils, weil es sich doch jeder nur einigermassen bemittelte Kräuterkenner anschaffen, und die im Verzeichnifse enthaltenen Gewächse wenigstens in Persoon's Synopsis, in so ferne sie in dieser enthalten sind, aufsuchen und nachlesen kann. Aus diesen Gründen, und um das Aufsuchen zu erleichtern, habe ich bey jeder Pflanze den Band, und die Seite worin sie in erstgenanntem Werke beschrieben ist, angeführt. Nur solche bey welchen Persoon's Benennung offenbar irrig ist, benannte ich nach jenen Autoren die diese Irrungen zuerst berichtiget haben, und setzte, Per-

soon's Benennung als Synonym darunter. Ganz neue Arten aber benannte ich nach jenen Autoren, die sie zuerst bekannt machten. — Sonst habe ich auch noch die vorzüglichsten Synonymen angegeben.

Was die Deutschen Benennungen der Gewächse, welche ich beygesetzet habe, anbelangt, bin ich gröfstentheils der Willdenow'schen Uebersetzung gefolgt. Bey den neuen aber, und solchen, die ich nirgends verdeutschet fand, war mein Bestreben immer dahin gerichtet, durch eine genaue und wörtliche Deutsche Uibersetzung die Herleitung des Lateinischen oder Griechischen Nahmens so viel als möglich auffallend zu machen.

Um das Volumen dieses Verzeichnifses sowohl, als dessen Preis, so viel es nur immer thunlich war, zu verringern, habe ich keine Beschreibungen beygefügt, (diefs wäre auch nicht der Zweck eines Verzeichnifses) sondern nur kleine für Jeden interessante Angaben: der Deutschen Benennung, des

Vaterlandes, der Blüthezeit, des Standortes im hiesigen Hofgarten, und der Ausdauer.

Die Dauer und den Standort, welchen die Gewächse im k. k. Hofgarten einnehmen, habe ich durch folgende gewöhnliche Zeichen und Buchstaben ausgedrückt:

⊙ Für jährige Gewächse.
♂ — zweyjährige —
♃ — perennirende —
♄ — holzige —

W. H. Warmes Haus. Bey solchen, die über Winter beyläufig 10 — 15 Grade ober Null nach Reaumur's Thermometer erfordern und auch den Sommer über im Gewächshause stehen bleiben.

Ch. Caphaus. Bey jenen, die über Winter 5 — 10 Grade ober Null erfordern und den Sommer über im Freyen stehen.

K. H. Kaltes Haus. Bey solchen die in Winter 1 — 5 Grade ober Null verlangen und den

Sommer über gleichfalls im Freyen stehen.

Im F. Im Freyen. Bey jenen endlich welche das ganze Jahr hindurch im Freyen verbleiben.

Es befinden sich im hiesigen k. k. Hofgarten freylich noch viele, zum Theil sehr seltene Gewächse, die ich, da sie noch nicht geblüht haben, als noch unbeschriebene und gänzlich unbekannte leider nicht in mein Verzeichnifs aufnehmen konnte; ich behalte mir es aber vor, selbe zu einer anderen Zeit, wenn sie schon benennet seyn werden, im Nachtrage zu liefern, den ich über die bisher noch unbeschriebenen sobald als möglich heraus zu geben gedenke. Jene aber, von denen blofs die Species noch nicht benennet ist, setzte ich mit der Angabe ihres Vaterlandes an's Ende jener Gattung, zu welcher sie gehören, oder zu gehören doch scheinen.

Schönbrunn am 20. Aprill 1816.

CLASSIS I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

1. Canna, Blumenrohr.

1. *C. variabilis.* Willd. im Magaz. der Gesell. naturf. Fr. zu Berlin. 1808. p. 169. Veränderliches Blumenrohr. In Carolina u. Florida. May — Jul. W. H. 4.
C. indica. Pers. syn. pl. 1. p. 1.
— — α. rubra. Ait. hort. kew. 1. p. 1.

2. *C. lutea.* Pers. l. c. Gelbblühendes Blumenrohr. Zwischen den Wendezirkeln. May — Jul. W. H. 4.
C. indica β lutea. Ait. l. c.

3. *C. rubra.* Willd. l. c. Rothblühendes Blumenrohr. In Westindien. May — Jul. W. H. 4.
C. coccinea. Pers. l. c.
— indica γ coccinea. Ait. l. c.

4. *C. chinensis.* Willd. l. c. p. 170. Chinesisches Blumenrohr. In Ostindien. May — Jul. W. H. 4.
C. indica. Pers. l. c.
— — patens. Ait. l. c.

5. *C. glauca.* Pers. l. c. Graugrünes Blumenrohr. In Sümpfen v. Carolina. May — July. W. H. ♃.

2. Renealmia, Renealmie.

1. *R. nutans.* Willd. enum. 1. p. 3. Ueberhängende Renealmie. In China. Jun. Jul. W. H. ♃.

2. *R. erecta.* (Globba erecta. Redouté plantes liliac. 3. t. 173.) Aufrechtstehende Renealmie. In Ostindien. —. W. H. ♃.

3. *R. calcarata.* Andrew. bot. reposit. t. 421. Gespornte Renealmie. In Ostindien. Septemb. W. H ♃.
R. angustifolia. Hortulan.

3. Amomum, Ingwer.

1. *A. Zingiber.* Pers. l. c. 1. p. 2. Aechter Ingwer. In Ostindien und Jamaica. Sept. Oct. W. H. ♃.

2. *A. Zerumbet.* Pers. l. c. Block-Ingwer. In Ostindien. Sept. Oct. W. H. ♃.

4. Hedychium, Kranzblume.

1. *H. coronarium.* Pers. l. c. Schöne Kranzblume. In Ostindien u. Java. Jul. — Sept. W. H. ♃.

5. Costus, Costwurz.

1. *C. speciosus.* Pers. l. c. 1. p. 3. Schöne Costwurz. In Ostindien. Jun. Jul. W. H. ♃.
C. arabicus. Jacq. ic. rar. 1. t. 1.

Coll. 1 p 143.
DSI

6. Alpinia, Alpinie.

1. *A. spiralis.* Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 1. t. 1. Spiralförmige Alpinie. Zu Caracas. Jul. Aug. W. H. 4.

7. Maranta, Marante.

1. *M. arundinacea.* Pers. l. c. Rohrartige Marante. In Jamaica u. Brasilien. May — Jul. W. H. 4.

2. *M. lutea.* Jacq. ic. rar. 2. t. 201. Gelbblühende Marante. Zu Caracas in feuchten Wäldern. May — Sept. W. H. 4.

8. Curcuma, Curcume.

1. *C. longa.* Pers. l. c. 1. p. 4. Lange Curcume. In Ostindien. May, Jun. W. H. 4.

9. Kaempferia, Kaempferie.

1. *K. Gulanga.* Pers. l. c. Sitzende Kämpferie. In Ostindien. May. W. H. 4.

2. *K. angustifolia.* Donn catalog. cantabrig. p. 1. Schmalblättrige Kämpferie. In Ostindien. —. W. H. 4.

3. *K. rotunda.* Pers. l. c. Gestielte Kämpferie. In Ostindien. May, Jun. W. H. 4.
K. longa. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 37. t. 317.

10. Thalia, Thalie.

1. *Th. cannaeformis.* Pers. l. c. Rohrartige Thalie. In Ostindien u. Südamerica. May — Jul. W. H. 4.

11. Lopezia, Lopezie.

1. *L. mexicana.* Willd. sp. pl. 1. p. 18. Mexicanische Lopezie. In Mexico. May — Jul. W. H. 2.
L. racemosa. Pers. l. c.

2. *L. hirsuta.* Jacq. collect. suppl. p. 3. t. 15. f. 4. Rauhhaarige Lopezie. In Mexico. May — Jul. W. H. 2.
L. racemosa β hirsuta. Pers. l. c.

3. *L. fruticosa.* Catalog. monach. p. 31. Strauchartige Lopezie. In Mexico? Jun. Jul. W. H. ♄.

12. Salicornia, Glasschmalz.

1. *S. herbacea.* Pers. l. c. 1. p. 5. Krautartiges Glasschmalz. Am Meerstrande in Eur. u. Virginien. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *S. fruticosa.* Pers. l. c. Strauchartiges Glasschmalz. Am Meerstrande in Eur. Jun. Jul. K. H. ♄.

DIGYNIA.

13. Blitum, Erdbeerspinat.

1. *B. capitatum.* Pers. l. c. 1. p. 6. Aehrentragender Erdbeerspinat. In Eur. besonders in Tyrol u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *B. virgatum.* Pers. l. c. Gemeiner Erdbeerspinat. In Deutschl. Spanien, Frankr., u. der Tartarey. Jun. Jul. Im F. ☉.

CLASSIS. II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

14. Jasminum, Jasmin.

1. *J. Sambac.* Pers. l. c. 1. p. 7. Arabischer Jasmin. In Ostindien. Blüht das ganze Jahr hindurch. W. H. ♄.
β. fl. pleno. Mit gefüllter Blüthe.
γ. undulatum. Willd. enum. 1. p. 9. Mit wellenförmigen Blättern.
J. undulatum. Pers. l. c.

2. *J. pubescens.* Pers. l. c. Weichhaariger Jasmin. Zu Calcutta. —. W. H. ♄.

3. *J. gracile.* Andrews bot. reposit. t. 127. Schlanker Jasmin. Auf der Insel Nordfolk. Jun. — Aug. W. H. ♄.
J. volubile. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 39. t. 321.

4. *J. glaucum.* Pers. l. c. Graugrüner Jasmin. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♄.

5. *J. tortuosum.* Willd. enum. 1. p. 10. Gedrehter Jasmin. In Ostindien. Jul. W. H. ♄.
J. flexile. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 46. t. 490.

6. *J. flexile.* Pers. l. c. 1. p. 8. Biegsamer Jasmin. In Ostindien. Jul. Aug. W. H. ♄.

7. *J. azoricum.* Pers. l. c. Azorischer Jasmin. Auf den Azorischen Inseln. May — Jul. Ch. ♄.

8. *J. fruticans.* Pers. l. c. Strauchartiger Jasmin. In Südeur. u. im Orient. May, Jun. Im F. ♄.

9. *J. humile.* Pers. l. c. Niedriger Jasmin. —. May, Jun. Im F. ♄.

10. *J. odoratissimum.* Pers. l. c. Wohlriechender Jasmin. Auf Madera. May — Aug. K. H. ♄.

11. *J. officinale.* Pers. l. c. Gemeiner Jasmin. In Südeur. u. Ostindien. May — Aug. Im F. ♄.

12. *J. grandiflorum.* Pers. l. c. Grofsblühender Jasmin. In Ostindien. May — Aug. Ch. ♄.

15. Ligustrum, Rainweide.

1. *L. vulgare.* Pers. l. c. Gemeine Rainweide. Auf sandigen Hügeln in Eur. Jun. Im F. ♄.

6. Phillyrea, Steinlinde.

1. *Ph. media.* Pers. l. c. Mittlere Steinlinde. In Südeur. Jun. Jul. K. H. ♄.

2. *Ph. angustifolia.* Pers. l. c. Schmalblättrige Steinlinde. In Portugall, Spanien u. Italien. Jun. Jul. K. H. ♄.

3. *Ph. latifolia.* Pers. l. c. Breitblättrige Steinlinde. In Südeur. Jun. Jul. K. H. ♄.

4. *Ph. laevis.* Willd. enum. 1. p. 12. Glatte Steinlinde. In Südeur. u. Nordafr. Jun. Jul. K. H. ♄.

17. Olea, Oelbaum.

1. *O. europaea.* Pers. l. c. Gemeiner Oelbaum. In Südeur. u. Nordafr. May. K. H. ♄.

2. *O. exasperata.* Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 1. t. 251. Warziger Oelbaum. Am Cap. Apr. May. Ch. ♄.

3. *O. capensis.* Pers. l. c. Capischer Oelbaum. Am Cap. —. Ch. ♄.

4. *O. undulata.* Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 1. t. 2. Wellenblättriger Oelbaum. Am Cap. Apr. May. Ch. ♄.

5. *O. americana.* Pers. l. c. 1. p. 9. Americanischer Oelbaum. In Carolina. Jun. Jul. K. H. ♄.

6. *O. excelsa.* Pers. l. c. Hoher Oelbaum. Auf Madera. —. Ch. ♄.

7. *O. fragrans.* Pers. l. c. Wohlriechender Oelbaum. In Cochinchina, China u. Japan. Jun. Jul. Ch. ♄.

8. Eine noch unbeschriebene Art.

18. Chionanthus, Schneeblume.

1. *Ch. virginica.* Pers. l. c. Virginische Schneeblume. Von Pensylvan. bis Carolina. Jun. Jul. Im F. ♄.

19. Syringa, Flieder.

1. *S. vulgaris.* Pers. l. c. Gemeiner Flieder. In Persien. May. Im F. ♄.

2. *S. chinensis.* Willd. arb. berol. p. 378. Chinesischer Flieder. In China. May. Im F. ♄. S. dubia. Pers. l. c.

3. *S. persica.* Pers. l. c. Persischer Flieder. In Persien. May. Im F. ♄.
β. laciniata. Mit zerschlitzten Blättern.

20. Fontanesia, Fontanesie.

1. *F. phillyreoides.* Pers. l. c. 1. p. 10. Stein-

lindenartige Fontanesie. Am Caspischen Meere. —. K. H. ♄.

21. Veronica, Ehrenpreis.

1. *V. virginica.* Pers. l. c. Virginischer Ehrenpreis. In Virginien u. Japan. Jun. Jul. Im F. 2|.

2. *V. spuria.* Pers. l. c. Mittlerer Ehrenpreis. In Südeur. Thüringen u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 2|.

3. *V. maritima.* Pers. l. c. Meerstrands-Ehrenpreis. Am Meerstrande in Eur. Jul. Im F. 2|.

4. *V. longifolia.* Pers. l. c. Langblättriger Ehrenpreis. In Oesterr. Schweden u. der Tartarey. Jun. Jul. Im F. 2|.

5. *V. incana.* Pers. l. c. Grauer Ehrenpreis. In der Ukrain. Jun. Jul. Im F. 2|.

6. *V. spicata.* Pers. l. c. Aehrentragender Ehrenpreis. In Europ. Hainen. Jun. Jul. Im F. 2|.

7. *V. orchidea.* Crantz stirp. austr. p. 333. Ragwurzartiger Ehrenpreis. In Oesterr. Jul. Aug. Im F. 2|.

8. *V. pinnata.* Pers. l. c. 1. p. 11. Gefiederter Ehrenpreis. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. 2|.

9. *V. officinalis.* Pers. l. c. Aechter Ehrenpreis. In Europ. Wäldern. Jun. Jul. Im F. 2|.

10. *V. decussata.* Pers. l. c. Buxblättriger Ehrenpreis. Im Magellanischen Sunde. —. K. H. ♄.

11. *V. gentianoides.* Pers. l. c. Entzianartiger Ehrenpreis. Am Caucasus, in Cappadocien u. Armenien. May, Jun. Im F. 2|.

12. *V. fruticulosa.* Pers. l. c. Stauden-Ehrenpreis. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz u. den Pyrenäen. Jun. Jul. Im F. ♄.

13. *V. saxatilis.* Pers. l. c. Stein-Ehrenpreis. Auf Alpen in Oesterr. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. ♄.

14. *V. prostrata.* Pers. l. c. 1. p. 12. Gestreckter Ehrenpreis. Auf Hügeln in Deutschl. Ital. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 24.

15. *V. Chamaedrys.* Pers. l. c. Wald-Ehrenpreis. Auf Trieften in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

16. *V. austriaca.* Pers. l. c. Oesterreichischer Ehrenpreis. In Mähren, Schlesien u. Krain. Jun. Jul. Im F. 24.

17. *V. urticaefolia.* Pers. l. c. Nesselblättriger Ehrenpreis. In Oesterr. Krain u. Schlesien, auf Niederalpen. May, Jun. Im F. 24.

18. *V. latifolia.* Pers. l. c. Breitblättriger Ehrenpreis. In Oesterr. u. Deutschl. auf sonnigen Hügeln. May. Jun. Im F. 24.
V. Pseudo — chamaedrys. Jacq. fl. austr. 1. p. 37. t. 60.

19. *V. paniculata.* Pers. l. c. Rispenblüthiger Ehrenpreis. In Böhmen u. der Tartarey. Jun. Jul. Im F. 24.
V. dentata. Schmidt bohem. 1. n. 31.

22. Wulfenia, Wulfenie.

1. *W. carinthiaca.* Pers. l. c. 1. p. 14. Kärnthnerische Wulfenie. In Kärnthen auf der Kibeggeralpe. Jun. Jul. Im F. 24.

23. Utricularia, Wasserschlauch.

1. *U. vulgaris.* Pers. l. c. 1. p. 18. Gemeiner Wasserschlauch. In stehenden Wassern v. Eur. Jun. Jul. Im freyen Wasserbehälter. 24.

24. Justicia, Justicie.

1. *J. assurgens.* Pers. l. c. 1. p. 19. Aufsteigende Justicie. In Jamaica u. St. Crux. May — Aug. W. H. ♄.

2. *J. Ecbolium.* Pers. l. c. 1. p. 20. Grünblühende Justicie. In Arabien, Malabar u. Ceylon. Jun. Jul. W. H. ♄.

3. *J. coccinea.* Pers. l. c. Scharlachrothe Justicie. Zu Cayenne. Jun. Jul. W. H. ♄.

4. *J. pulcherrima.* Pers. l. c. Prächtige Justicie. Im wärmeren Amer. Jun. — Aug. W. H. ♄.

5. *J. cristata.* Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 38. t. 320. Gekämmte Justicie. Zu Caracas. Aug. Sept. W. H. ♄.

6. *J. lucida.* Vahl. enum. 2. p. 400. Glänzende Justicie. In Westindien. Aug. W. H. ♄.

7. *J. formosa.* Jacq. eclog. ineditae. Schöne Justicie. —. Bl. den ganzen Sommer hindurch. W. H. ♄.

8. *J. Gendarussa.* Pers. l. c. Weidenblättrige Justicie. Auf Ceylon, Java u. Malabar. Bl. den ganzen Sommer hindurch. W. H. ♄.

9. *J. nasuta.* Pers. l. c. Schnabelförmige Justicie. In Ostindien. Jun. — Aug. W. H. ♄.

10. *J. ciliaris.* Pers. l. c. 1. p. 21. Gefranzte Justicie. In Peru. Jun. Jul. W. H. ☉.

11. *J. bracteolata.* Pers. l. c. Mennigrothe Justicie. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. ♄.

12. *J. lithospermifolia.* Pers. l. c. Steinsamenblättrige Justicie. —. Jun. — Aug. W. H. ♄.

13. *J. Adhatoda.* Pers. l. c. 1. p. 22. Treibende Justicie. Auf Ceylon u. Malabar. Jun. Jul. K. H. ♄.

14. *J. furcata.* Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 2. t. 3. Zweyzackige Justicie. Zu Lima. Jun. Jul. W. H. ♄.
J. peruviana. Pers. l. c. 1. p. 22.

15. *J. orchioides.* Pers. l. c. Ragwurzartige Justicie. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♄.

16. *J. microphylla.* Pers. l. c. Kleinblättrige Justicie. Auf St. Crux. Jul. Aug. W. H. ♄.

17. *J. quadrifida.* Vahl. enum. 1. p. 12. Viertheilige Justicie. In Mexico. Jun. Jul. W. H. ♄.
J. superba Hortulan.

25. Stachytarpheta, Fettähre.

1. *St. jamaicensis.* Pers. l. c. 2. p. 139. Jamaikische Fettähre. Auf den Caraibischen Inseln u. zu Jamaica. Jul. Aug. W. H. 24.
Verbena jamaicensis. Jacq. obs. 4. t. 85.

2. *St. mutabilis.* Pers. l. c. 2. p. 140. Veränderliche Fettähre. In Südamer. Jul. Aug. ♄.
Verbena mutabilis. Jacq. ic. rar. 2. t. 207. Collect. 2. p. 334.

26. Lycopus, Zigeunerkraut.

1. *L. europaeus.* Lin. sp. pl. p. 30. Ge-

meines Zigeunerkraut. An feuchten Stellen in Eur. u. Amer. Jun. Jul. Im F. 4.
L. vulgaris. Pers. l. c. 1. p. 24.

27. Monarda, Monarde.

1. *M. fistulosa.* Pers. l. c. Purpurfarbige Monarde. In Canada. Jul. Im F. 4.

2. *M. oblongata.* Pers. l. c. Langblättrige Monarde. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 4.

3. *M. didyma.* Pers. l. c. Scharlachrothe Monarde. In Pensylvanien u. Florida. Jun. Jul. Im F. 4.

4. *M. rugosa.* Pers. l. c. Weifse Monarde In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 4.

5. *M. clinopodia.* Pers. l. c. Fleischfarbige Monarde. In Virginien. Jun. Jul. Im F. 4.

28. Rosmarinus, Rosmarin.

1. *R. officinalis.* Pers. l. c. Gemeiner Rosmarin. Auf Hügeln in Südeur. u. Nordafr. Jun. Jul. K. H. ♄.

29. Ziziphora, Zizikraut.

1. *Z. dasyantha* Bieberst. flor. taur. caucas. 1. p. 18. Rauhblumiges Zizikraut. Am Caucasus auf Bergen. Jun. Jul. Im F. ♄.

30. Salvia, Salbey.

1. *S. officinalis.* Pers. l. c. 1. p. 25. Gemeine Salbey. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ♄.

2. *S. triloba.* Lin. suppl. 88. Dreylappige

Salbey. Im Griechischen Archipelagus. Jun. Jul. K. H. ♄.
S. Clusii. Pers. l. c.

3. *S. Chamaedrys.* Willd. hort. berolin. 1. p. 29. t. 29. Gamanderblättrige Salbey. In Mexico. Sept. Oct. Ch. ♄.
S. chamaedryoides. Pers. l. c.

4. *S. Horminum.* Pers. l. c. 1. p. 26. Scharlach-Salbey. In Griechenland u. Apulien. Jun. Jul. K. H. ☉.

5. *S. oblongata.* Vahl. enum. 1. p. 256. Länglichte Salbey. —. May. Im F. 24.
S. micrantha. Desfont. hort. paris. p. 57.

6. *S. austriaca.* Pers. l. c. Oesterreichische Salbey. In Oesterr. Ungarn u. der Moldau auf trockenen Heiden. Jun. Jul. Im F. 24.

7. *S. disermas.* Pers. l. c. Zottige Salbey. In Syrien. Jun. Jul. K. H. 24.

8. *S. mexicana.* Pers. l. c. 1. p. 27. Mexicanische Salbey. An feuchten Stellen in Mexico. Jun. Jul. Ch. ♄.

9. *S. Boosiana.* Jacq. eclog. pl. rar. fasc. 5. p. 69. n. 47. Boosische Salbey. In Peru auf Niederalpen. Bl. das ganze Jahr hindurch. W. H. ♄.
S. Boosii. Trattinnick. observ. bot. fasc. 2. p. 58. n. 92.

10. *S. amarissima.* Vahl enum. 1. p. 241. Bittere Salbey. In Mexico. Sept. — Dec. Ch. ♄.

11. *S. reptans.* Jacq. hort. schoenbr. 3 p. 38. t. 319. Auslaufende Salbey. In Mexico. Nov. Dec. Ch. 24.
S. angustifolia. Vahl enum. 1. p. 253.
— virgata. Ortega. dec. 3.

12. *S. formosa.* Willd. sp. pl. 1. p. 140. Prächtige Salbey. In Peru. Jul. Aug. Ch. ♄. S. nodosa. Pers. l. c.

13. *S. coccinea.* Pers. l. c. Scharlachrothe Salbey. Neben Flüssen in Florida. Jul. Aug. Ch. ♄.

14. *S. hispanica.* Pers. l. c. Spanische Salbey. In Span. u. Ital. Jul. Aug. Im. F. ☉.

15. *S. glutinosa.* Pers. l. c. 1. p. 28. Gelbe Salbey. Auf lehmigem Grunde in Eur. Jul. Aug. Im F. 24.

16. *S. canariensis.* Pers. l. c. Canarische Salbey. Auf den Canarischen Inseln. Jun. Jul. Ch. ♄.

17. *S. aurea.* Pers. l. c. Goldfarbige Salbey. Neben Flüssen am Cap. Jun. Ch. ♄.

18. *S. Sclarea.* Pers. l. c. Muscateller Salbey. In Italien u. Syrien. Jun. — Aug. Im F. ♂. β. caucasica. Muscateller Salbey vom Caucasus.

19. *S. Aethiopis.* Pers. l. c. Ungarische Salbey. In Oesterr. Illyrien, Frankr. u. Africa auf Heiden. Jun. Jul. Im F. ♂.

20. *S. bicolor.* Pers. l. c. 1. p. 29. Zweyfarbige Salbey. Bey Tanger in Africa. Jun. Jul. Ch. ♂.

21. *S. hablizíana.* Pers. l. c. Hablizelsche Salbey. In Taurien. Jun. Jul. Ch. 24. S. scabiosaefolia. Lam. in diar. hist. nat. 2. p. 44. t. 27.

22. *S. interrupta.* Pers. l. c. Unterbrochengefiederte Salbey. In der Barbarey. Jun. Jul. K. H. ♄.

23. *S. ceratophylla.* Pers. l. c. Schlitzblättrige Salbey. In Syrien u. Persien. Jun. Jul. K. H. ♂.
S. exasperata. Cav. ic. 6. p. 38 — 39. t. 558.

24. *S. ceratophylloides.* Pers. l. c. Halbgefiederte Salbey. In Sizilien u. Aegypten. Jun. Jul. K. H. ♂.

25. *S. Forskaelei.* Pers. l. c. Forskälische Salbey. Im Orient. Jun. — Aug. K. H. 4.

26. *S. nutans.* Pers. l. c. Hängende Salbey. In Ungarn u. Rufsland. Jul. Aug. Im F. 4.

31. Collinsonia, Collinsonie.

1. *C. canadensis.* Pers. l. c. Canadische Collinsonie. In schattigen Wäldern Virginiens u. Canadas. Jun. Jul. Im F. 4.

TRIGYNIA.

32. Piper, Pfeffer.

1. *P. nigrum*? Pers. l. c. 1. p. 31. Schwarzer Pfeffer. In Ostindien. Jul. Aug. W. H. ♄.

2. *P. medium.* Pers. l. c. Mittlerer Pfeffer. Auf den Caraibischen Inseln. Jun. Jul. W. H. ♄

3. *P. decumanum.* Pers. l. c. Herzblättriger Pfeffer. Auf Martinique u. zu Caracas. Jul. Aug. W. H. ♄.
P. marginatum. Jacq. collect. 4. p. 128. Ic. rar. 2. t. 215.

4. *P. prunifolium.* Jacq. eclog. ined. Pflaumenblättriger Pfeffer. Zu Caracas Jul. Aug. W. H. ♄.

5. *P. flexuosum.* Jacq. eclog. ined. Gebogener Pfeffer. Zu Caracas Jul. Aug. W. H. ♄.

6. *P. aduncum.* Pers. l. c. 1. p. 32. Krummer Pfeffer. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. ♄.

7. *P. Bredemeyeri.* Jacq. eclog. ined. Bredemeyerscher Pfeffer. In Caracas. Jun. — Aug. W. H. ♄.
P. rugosum. Bredemeyer mscrpt.

8. *P. glaucescens.* Jacq. eclog. fasc. 8. p. 112. n. 76. Graugrüner Pfeffer —. Bl. den ganzen Sommer hindurch. W. H. ♄.

9. *P. verrucosum.* Pers. l. c. Warziger Pfeffer. In Jamaica u. Gujana. Jun. Jul. W. H. ♄.

10. *P. blandum.* Pers. l. c. 1. p. 33. Geschmackloser Pfeffer. Zu Caracas. Aug. — Oct. W. H. 2.

11. *P. magnoliaefolium.* Jacq. ic. rar. 2. t. 213. Collect. 3. p. 210. Magnolienblättriger Pfeffer. Auf Felsen zu Caracas. Jun. — Aug. W. H. ♄.

12. *P. obtusifolium.* Pers. l. c. Stumpfblättriger Pfeffer. In Westindien. Jun. Jul. W. H. ♄.
P. clusiaefolium. Jacq. collect. 3. p. 209. Icon. rar. 2. t. 212.

13. *P. cuneifolium.* Jacq. ic. rar. 2. t. 214. Collect. 4. p. 127. Keilblättriger Pfeffer. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. ♄.

14. *P. umbellatum Pers.* l. c. 1. p. 34 Doldenblüthiger Pfeffer. In Westindien. Jul. Aug. W. H. ♄.

15. *P. pereskiaefolium Pers.* l. c. Pereskien-

blättriger Pfeffer. Auf Venezuela. Jul. Aug. W. H. 4.

16. *P. polystachyon Pers.* l. c. Vielähriger Pfeffer. Auf Jamaica. Jun. — Aug. W. H. 4.

17. *P. verticillatum Pers.* l. c. Quirlblättriger Pfeffer. In Jamaica. Jul. Aug. W. H. 4.

18. *P. pulchellum Pers.* l. c. Schöner Pfeffer. Auf Jamaica. Jun. — Aug. W. H. 4.

19. *P. inaequalifolium Pers.* l. c. Ungleichblättriger Pfeffer. Zu Lima. —. W. H. 4.
P. anisatum. Hort. paris.

CLASSIS. III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

33. Boerhaavia, Boerhaavie.

1. *B. diffusa Pers.* l. c. 1. p. 36. Verwirrtästige Boerhaavie. In Jamaica u. Veracrux. Jun. Jul. W. H. ☉.

2. *B. hirsuta.* Willd. phytog. 1. n. 3. Haarige Boerhaavie. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. ♄.
B. diffusa β hirsuta. Pers. l. c.

3. *B. scandens Pers.* l. c. Kletternde Boerhaavie. In Westindien. Jun. Jul. W. H. ♄.

4. *B. excelsa Pers.* l. c. Hohe Boerhaavie. —. May — Sept. W. H. ♄.

34. Valeriana, Baldrian.

1. *V. rubra Pers.* l. c. 1. p. 37. Rother Baldrian. In Südtyrol, Italien, der Schweiz, Frankreich, der Barbarey u. im Orient. May — Sept. Im F. 24.

2. *V. Phu Pers.* l. c. Grofser Baldrian. In Schlesien, Schwaben, Elsafs. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *V. officinalis Pers.* l. c. Offizineller Baldrian. In sumpfigen Hainen v. Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *V. repens.* Host mscrpt. Kriechender Baldrian. In Oesterr. in Donausümpfen. Jun. Jul. Im F. 24.
V. exaltata? Mikan jun.

5. *V. sambucifolia.* Mikan jun. Hollunderblättriger Baldrian. In Böhmen. Jun. — Aug. Im F. 24.

6. *V. tripteris.* Pers. l. c. Dreyblättriger Baldrian. Auf Niederalpen in Oesterr. u. d. Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.

7. *V. montana.* Pers. l. c. 1. p. 38. Berg-Baldrian. Auf Alpen in Oesterr. Salzb. der Schweiz und den Pyrenäen. Jun. — Aug. Im F. 24.

35. Cneorum, Zeyland.

1. *C. tricoccon* Pers. l. c. 1. p. 39. Spanischer Zeyland. In Spanien u. Südfrankreich. Jun. Jul. K. H. ♄.

36. Crocus, Safran.

1. *C. sativus* Lin. sp. pl. p. 50. Aechter Safran. Im Orient. Oct. Nov. Im F. 24.
C. officinalis. Pers. l. c. 1. p. 41.

2. *C. moesiacus*. Curt. bot. mag. n. 652. Griechischer Safran. In Griechenland. März. im F. 24.

3. *C. vernus*. Pers. l. c. Frühlings-Safran. Auf südeuropäischen Alpen. März. Im F. 24.

37. Antholyza, Rachenlilie.

1. *A. Cunonia*. Pers. l. c. 1. p. 42. Schönrothe Rachenlilie. Am Cap. Jän. Febr. Ch. 24.

2. *A. aethiopica*. Pers. l. c. Aethiopische Rachenlilie. Am Cap. Jän. Febr. Ch. 24.

38. Watsonia, Watsonie.

1. *W. revoluta*. Pers. l. c. Schöne Watsonie. Am Cap wie die folgende Apr. May. Ch. 24.
Gladiolus Watsonius. Thunb. diss. n. 10.

2. *W. humilis*. Pers. l. c. Niedrige Watsonie. May. Ch. 24.
Gladiolus Merianellus. Thunb. diss. n. 11.

39. Gladiolus, Siegwurz.

1. *G. punctatus* Pers. l. c. Punktirte Siegwurz. Ist wie alle folgenden, bey welchen das Vaterland nicht angegeben ist, am Cap zu Hause. März, Apr. Ch. 24.

2. *G. communis*. Pers. l. c. Gemeine Siegwurz. In Südeur. und d. Barbarey. May, Jun. Im F. 24.

3. *G. cardinalis*. Curt. bot. mag. 135. prächtige Siegwurz. —. Ch. 24.

4. *G. carneus*. Pers. l. c. Fleischfarbige Siegwurz. Apr. May. Ch. 24.

5. *G. Merianus*. Thunb. diss. n. 12. Grofse Siegwurz. Apr. May. Ch. 24.
Watson. Meriana. Pers. l. c. 1. p. 42.

6. *G. roseus*. Jacq. icon. rar. 2. t. 261 Collect. suppl. p. 22. Rosenrothe Siegwurz. Apr. May. Ch. 24.
Watsonia amoena. Pers. l. c. 1. p. 43.

7. *G. tenellus*. Pers. l. c. 1 p. 44. Zarte Siegwurz. May. Jun. Ch. 24.

8. *G. plicatus*. Pers. l. c. Gefaltene Siegwurz. Apr. May. Ch. 24.

9. *G. albidus*. Pers. l. c. 1. p. 45. Weifsliche Siegwurz. Apr. — Jun. Ch. 24.

10. *G. cuspidatus*. Pers. l. c. Zugespitzte Siegwurz. May, Jun. Ch. 24.

11. *G. crispus*. Pers. l. c. Krause Siegwurz. May. Jun. Ch. 24.

12. *G. tubiflorus*. Pers. l. c. Langröhrige Siegwurz. May, Jun. Ch. 24.

13. *G. longiflorus*. Pers. l. c. 1. p. 46. Langblüthige Siegwurz. May, Jun. Ch. 24.
Ixia longiflora Ait. hort. kew 1. p. 58.

14. *G. gramineus* Pers. l. c. Grasartige Siegwurz. May, Jun. Ch. 24.

40. Ixia, Ixie.

1. *I. ochroleuca.* Pers. l. c. Grünlichweifse Ixie. Wächst sammt den meisten übrigen am Cap. Apr. May. Ch. 24.

2. *I. Bulbocodium.* Pers. l. c. Europäische Ixie. Am Mittelländischen Meere. Apr. K. H. 24.

3. *I. cruciata.* Pers. l. c. 1. p. 47. Kreuzblättrige Ixie. May. Ch. 24.

4. *I. heterophylla.* Pers. l. c. Verschiedenblättrige Ixie. May. Jun. Ch. 24.
Galaxia plicata. Jacq. ic. rar. 2. t. 291. Collect. suppl. 30.

5. *I. incarnata.* Pers. l. c. Fleischfarbige Ixie. May, Jun. Ch. 24.

6. *I. angusta.* Pers. l. c. Schmale Ixie. May, Jun. Ch. 24.

7. *I. leucantha.* Pers. l. c. 1. p. 48. Weifse Ixie. May, Jun. Ch. 24.

8. *I. erecta.* Thunb. diss. n. 18. Aufrechte Ixie. May, Jun. Ch. 24.
I. polystachya. Pers. l. c.

9. *I. maculata.* Pers. l. c. Gefleckte Ixie. May, Jun. Ch. 24.

10. *I. crocata* Thunb. diss. n. 20 Safranfarbige Ixie. May, Jun. Ch. 24.
Gladiol. crocatus. Pers. l. c. 1. p. 44.

11. *I. deusta* Pers. l. c. Verbrannte Ixie. May, Jun. Ch. 24.

12. *I. miniata.* Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 10 t. 24. Mennigrothe Ixie. May, Jun. Ch. 24.

13. *I. hyalina.* Lin. suppl. 91. Durchscheinende Ixie. Apr. May. Ch. 24.
Gladiolus hyalinus. Pers. l. c. 1. p. 44.
Ixia fenestrata. Jacq. ic. rar. 2. 4. t. 289. Collect. 3. p. 270.

14. *I. coerulescens.* Pers. l. c. 1. p. 48 Weifsblaue Ixie. May, Jun. Ch. 24.
Ixia villosa. Ait. hort. kw. 1. p. 58.

15. *I. rubro-cyanea.* Jacq. ic. rar. 2. t. 285. Collect. 3. p. 268. Bunte Ixie. Apr. May. Ch. 24.
J. cyanea Pers. l. c.

16. *I. punicea.* Pers. l. c. Dunkelrothe Ixie. Apr. May. Ch. 24.

17. *I. bulbifera.* Pers. l. c. 1. p. 49. Zwiebeltragende Ixie. Apr. Jun. Ch. 24.

41. Moraea, Moräa.

1. *M. longifolia.* Pers. l. c. Langblättrige Moräa. Am Cap. May, Jun. Ch. 24.
Moraea flexuosa. Lin. suppl. 100.
Ixia longifolia. Jacq. hort. vind. 3. p. 47. t. 90.

2. *M. elegans.* Pers. l. c. Schöne Moräa. Am Cap. May, Jun. Ch. 24.
Sisyrinchium elegans. Jacq. hort. schönbr. 1. p. 6. t. 12.

3. *M. Northiana.* Schneev. ic. t. 41 — 42. Northische Moräa. In Brasilien. May — Jul. W. H. 24.
Iris Northiana. Pers. l. c. 1. p. 52.

4. *M. iridioides.* Lin. mant. 28. Schwertelartige Moräa. Im Orient. Apr. — Aug. Ch. 24.
Iris orientalis. Pers. l. c.

5. *M. chinensis.* Thunb. jap. 34. Bunte Moräa. In China, Japan u. Ostindien. Jun. — Aug. Ch. 24.
Ixia chinensis. Pers. l. c. 1. p. 48.

42. Iris, Schwertel.

1. *I. pumila.* Pers. l. c. 1. p. 50. Niedriger Schwertel. Auf Hügeln in Oesterr. Deutschl. Frankreich. März, Apr. Im F. 24.

2. *I. susiana.* Pers. l. c. 1. p. 51. Prächtiger Schwertel. Im Orient. May. K. H. 24.

3. *I. florentina.* Pers. l. c. Florentinischer Schwertel. In Südeur. May. Im F. 24.

4. *I. squalens.* Pers. l. c. Gelbbunter Schwertel. In Südeur. May. Im F. 24.

5. *I. Swertii.* Pers. l. c. Schwertischer Schwertel. —. Jun. Im F. 24.

6. *I. hungarica* Waldstein et Kitaib. pl. rar. hung. 3. p. 251 t. 226. Ungarischer Schwertel. In Ungarn. May. Im F. 24.
I. bohemica. Schmidt fl bohem. cent 4.

7. *I. sambucina.* Pers. l. c. Hollunder-Schwertel. In Südeur. May, Jun. Im F. 24.

8. *I. germanica.* Pers. l. c. Deutscher Schwertel. In Südeur. May, Jun. Im F. 24.

9. *I. pallida.* Lam. encycl. 3. p. 282. Blasblauer Schwertel. Im Orient? Jun. Jul. Im F. 24.
I. pallide coerulea. Pers l. c.
I. odoratissima. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 5. t. 9.

10. *I. Xiphium.* Pers. l. c. 1. p. 52. Spanischer

Schwertel. In Spanien, Portug. u. Sibirien, May, Jun. Im F. 24.
1. variabilis. Jacq. collect. 2. p. 321.

11. *I Pseud-Acorus.* Pers. l. c. Wasser-Schwertel. In Sümpfen v. Eur. May, Jun. Im F. 24.

12. *I. foetida.* Pers. l. c. Stinkender Schwertel. In Engl. Toscan. u. Frankr. May. Jun. Im F. 24.

13. *I. virginica.* Pers. l. c. Virginischer Schwertel. In Virgin. May — Jul. Im F. 24.

14. *I. halophila.* Pers. l. c. Salz-Schwertel. Auf salzigem Boden in Sibirien. May, Jun. Im. F. 24.

15. *I. ochroleuca.* Pers. l. c. Weifsgelber Schwertel. Im Orient. May, Jun. Im F. 24.

16. *I. persica.* Pers. l. c. 1. p. 53. Persischer Schwertel. In Persien. Apr. K. H. 24.

17. *I. graminea.* Pers. l. c. Grasblättriger Schwertel. In Oesterr. auf sumpfigen Wiesen. Jun. Jul. Im F. 24.

18. *I. spuria.* Pers. l. c. Bastard-Schwertel. In Ungarn, Deutschl. Frankr. u. Sibir. auf sumpfigen Wiesen. Jun. Jul. Im F. 24.

19. *I. Guldenstaedtii.* Lepech. act. petrop. 1781. 1. p. 292. t. 8. Güldenstädtischer Schwertel. In Sibirien. May. Im F. 24.

20. *I. sibirica.* Lin. sp. pl. 57. Wald-Schwertel. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz u. Sibir. auf sumpfigen Wiesen. May — Jul. Im F. 24.
i. pratensis. Pers. l. c.

43. Commelina, Commeline.

1. *C. erecta.* Pers. l. c. 1. p. 55. Aufrechte Commeline. In Virgin. Jun. Jul. K. H. 24.

2. *C. africana.* Pers. l. c. Africanische Commeline. In Aethiopien. Jun. Jul. K. H. 24.

3. *C. tuberosa.* Lin. sp. pl. 61. Knollige Commeline. In Mexico. Jul. Aug. K. H. 24.

4. *C. coelestis.* Willd. enum. 1. p. 69. Himmlische Commeline. —. Jul. Aug. W. H. 24.

44. Killingia, Killingie.

1. *K. triceps.* Lin. suppl. 104. Dreyköpfige Killingie. An feuchten Stellen in Ostind. u. Amer. Jun. Jul. W. H. 24.
K. nivea. Pers. l. c. 1. p. 57.

45. Cyperus, Cyperngras.

1. *C. articulatus.* Pers. l. c. 1. p. 60. Gegliedertes Cyperngras. Im wärmer. Amer. —. W. H. 24.

2. *C. esculentus.* Pers. l. c. 1. p. 63. Eßbares Cyperngras. (Erdmandel). In Ital. Südfrankr. Span. u. im Orient. Jul. Aug. Im F. 24.

3. *C. Papyrus.* Pers. l. c. 1. p. 64. Papier-Cyperngras. In Flüssen v. Calabrien, Sicil. Syrien u. Aegypt. Jun. Jul. K. H. 24.

4. *C alternifolius.* Pers. l. c. 1. p. 65. Wechselblättriges Cyperngras. Auf Madagascar. Jun. Jul. W. H. 24.

5. Eine noch unbeschriebene Art, welche am Cap zu Hause ist.

DIGYNIA.

46. Phalaris, Glanzgras.

1. *Ph. arundinacea.* Pers. l. c. 1. p. 78. Rohrartiges Glanzgras. Am Wasser in Eur. Bl. den ganzen Sommer hindurch. Im F. 4.
Arundo colorata. Ait. hort. kew. 1. p. 116.

2. *Ph. canariensis.* Pers. l. c. Canarisches Glanzgras. Auf den Canarischen Ins. Aug. Im F. ⊙.

47. Panicum, Fennich.

1. *P. plicatum.* Pers. l. c. 1. p. 82. Gefalteter Fennich. Auf der St. Moritzinsel. May — Jul. W. H. 4.

2. *P. maximum.* Pers. l. c. 1. p. 83. Grofser Fennich. Auf der Ins. Guadeloupe. —. W. H. 4.

48. Ceresia, Ceresie.

1. *C. elegans.* Pers. l. c. 1. p. 85. Schöne Ceresie. In Peru. —. W. H. 4.
Paspalum membranaceum. Lamarck ill. gen. p. 177. t. 43. f. 2.

49. Eleusine, Eleusine.

1. *E. domingensis.* Pers. l. c. 1. p. 87. Domingische Eleusine. In St. Domingo. Jun. — Aug. W. H. 4.
Cynosurus domingensis. Jacq. ic. rar. 1. t. 22. Misc. 2. p. 363.

50. Chloris, Chloris.

1. *Ch. petraea.* Pers. l. c. Felsen Chloris. Auf

Kalkfelsen in Georgien, Florida, Jamaica u. am Cap. Sept. — März. Ch. 24.

2. *Ch. radiata.* Pers. l. c. 1. p. 88. Gestrahlte Chloris. In Westind. Jun. — Aug. W. H. ☉.

51. Arundo, Rohr.

1. *A. Donax.* Pers. l. c. 1. p. 102. Breitblättriges Rohr. In Span. Frankr. der Schweiz, Krain u. Siebenbürg. —. Im F. 24.
β versicolor. Mit bunten Blättern.

2. *A. Phragmites.* Pers. l. c. Gemeines Rohr. In Seen u. Flüssen v. Eur. u. Nordamer. Jun. Jul. Im freyen Wasserbehälter. 24.

3. *A. speciosa.* Schrad. fl. germ. 1. p. 219. Schönes Rohr. Auf Alpen in der Schweiz, Krain u. Ungarn. Jun. Jul. Im F. 24.
A. Calamagrostis. Pers. l. c.

52. Saccharum, Zuckerrohr.

1. *S. officinarum.* Pers. l. c. Aechtes Zuckerrohr. In beyden Indien. —. W. H. 24.

2. *S. Ravennae.* Pers. l. c. 1. p. 103. Ravenna-Zuckerrohr. In Ital. —. K. H. 24.

53. Erianthus, Wollblume.

1. *E. saccharoides.* Mich. fl. amer. bor. 1. p. 55. Zuckerrohrartige Wollblume. An feuchten Stellen in Carolina. Jun. Jul. K. H. 24.
Saccharum giganteum. Pers. l. c.
— argenteum. Brouss.

54. Andropogon, Bartgras.

1. *A. Schoenanthus.* Pers. l. c. 1. p. 104. Wohlriechendes Bartgras. In Arab. u. Ostind. —. W. H. 24.
A. citriodorum Hortulan.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

55. Protea, Silberbaum.

1. *P. rosacea.* Pers. l. c. 1. p. 114. Rosenartiger Silberbaum. Am Cap wie alle folgenden. —. Ch. ♄.
P. nana. Thunb. prod. 26.

2. *P. torta.* Pers. l. c. Gedrehter Silberbaum. Jul. Ch. ♄.

3. *P. vinerea.* Pers. l. c. 1. p. 115. Grauer Silberbaum. —. Ch. ♄.

4. *P. emarginata* Hort. paris. Ausgerandeter Silberbaum. —. Ch. ♄.

5. *P. mellifera.* Pers. l. c. Zucker-Silberbaum. —. Ch. ♄.

6. *P. conifera.* Pers. l. c. Zapfentragender Silberbaum. Jul. Aug. Ch. ♄.

7. *P. Levisanus.* Pers. l. c. Quendelblättriger Silberbaum. Aug. Sept. Ch. ♄.

8. *P. sericea.* Pers. l. c. Seidenartiger Silberbaum. —. Ch. ♄.

9. *P. saligna.* Pers. l. c. Weidenblättriger Silberbaum. Jul. — Sept. Ch. ♄.

10. *P. argentea.* Pers. l. c. Aechter Silberbaum. —. Ch. ♄.

11. *P. speciosa* β nigra. Pers. l. c. Prächtiger Silberbaum m. schwarzen Kelchschuppen. —. Ch. ♄.

12. *P. cynaroides.* Pers. l. c. 1. p. 116. Grofsköpfiger Silberbaum. —. Ch. ♄.

56. Banksia, Banksie.

1. *B. serrata.* Pers. l. c. Sägeblättrige Banksie. Wächst in Neuholland, wie alle übrigen Arten dieser Gattung. —. Ch. ♄.

2. *B. praemorsa.* Pers. l. c. Abgebissene Banksie. —. Ch. ♄.

3. *B. microstachya.* Pers. l. c. Kleinährige Banksie. —. Ch. ♄.

4. *B. heterophylla.* Catal. hort. carlsruhan. p. 36. Verschiedenblättrige Banksie. —. Ch. ♄.

57. Hakea, Hakea.

1. *H. linifolia.* Hort. paris. Linienblättrige Hakea. Wächst wie alle folgenden Arten dieser Gattung in der Botany-Bay in Neuholland. —. Ch. ♄.

2. *H. dactyloides.* Pers. l. c. 1. p. 117. Fingerartige Hakea. —. Ch. ♄.

3. *H. heterophylla.* Hort. paris. Verschiedenblättrige Hakea. —. Ch. ♄.

4. *H. suaveolens.* Brown. in linnean soc. transact. 10. p. 182. Wohlriechende Hakea. —. Ch. ♄.

58. Embothryum, Prachtstrauch.

1. *E. salicifolium.* Vent. hort. cels. 8. t. 8. Weidenblättriger Prachtstrauch. In Neuholland. —. Ch. ♄.

59. Globularia, Kugelblume.

1. *G. longifolia.* Pers. l. c. 1. p. 118. Langblättrige Kugelblume. Zu Madera. Jun. Jul. Ch. ♄.

2. *G. vulgaris.* Pers. l. c. Gemeine Kugelblume. In Eur. May. Jun. Im F. 2.

3. *G. cordifolia.* Pers. l. c. Herzblättrige Kugelblume. In Oesterr. Ungarn, der Schweiz und den Pyrenäen auf sonnigen Hügeln. May. Jun. Im F. 2.

60. Cephalanthus, Kopfblume.

1. *C. occidentalis.* Pers. l. c. 1. p. 119. Abendländische Kopfblume. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. ♄.

61. Scabiosa, Scabiose.

1. *Sc. alpina.* Pers. l. c. Alpen-Scabiose. Auf den Schweizeralpen und den Pyrenäen. Jun. Jul. Im F. 2.

2. *Sc. transylvanica.* Pers. l. c. Siebenbürgische Scabiose. In Siebenb. u. Ung. zwischen Getreide. Jun. Jul. Im F. ☉.

3. *Sc. leucantha.* Pers. l. c. Weifsblühende Scabiose. Auf Hügeln in Krain u. Languedoc März, Apr. K. H. 2.

4. *Sc. uralensis.* Pers. l. c. 1. p. 120. Uralische Scabiose. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. ⊙.

5. *Sc. sylvatica.* Pers. l. c. Wald-Scabiose. Auf Bergwiesen in Oesterr. Deutschl. der Schweiz u. Frankr. May, Jun. Im F. 2.

6. *Sc. stellata.* Pers. l. c. Sternförmige Scabiose. In Span. Jun. Jul. Im F. ⊙.

7. *Sc. atropurpurea.* Pers. l. c. 1. p. 121. Schwarzrothe Scabiose. In Ostind.? Jun. Jul. Im F. ⊙.

8. *Sc. africana.* Pers. l. c. Africanische Scabiose. In Africa u. im Orient. Jun. Jul. Ch. ♄.

9. *Sc. cretica.* Pers. l. c. Candische Scabiose. In Candien. Jun. Jul. K. H. ♄.

10. *Sc. bannatica.* Pers. l. c. Bannatische Scabiose. Im Bannate. Jun. Jul. Im F. ⊙.

62. Knautia, Knautie.

1. *K. orientalis.* Pers. l. c. Orientalische Knautie. Im Orient. Jun. Jul. Im F. ⊙.

63. Spermacoce, Zahnwirbel.

1. *Sp. suffrutescens.* Jacq. hort. schönbr. 3. p. 40. t. 322. Staudenartiger Zahnwirbel. —. Bl. den ganzen Sommer hindurch. W. H. 2.

2. *Sp. rubra.* Jacq. hort. schönbr. 3. p. 3. t. 256. Rothblühender Zahnwirbel. —. Sept. — Decemb. W. H. ⊙.

64. Houstonia, Houstonie.

1. *H. coccinea.* Pers. l. c. 1. p. 125. Scharlachrothe Houstonie. In Mexico. Jun. Jul. Ch. ♄.

65. Rubia, Röthe.

1. *R. tinctorum.* Pers. l. c. 1. p. 129. Färber-Röthe. In Südeur. Jul. Aug. Im F. 4.

66. Ixora, Ixore.

1. *I. coccinea.* Pers. l. c. 1. p. 130. Scharlachrothe Ixore. In Ostind. Jul. Aug. W. H. ♄.

67. Aegiphila, Ziegenstrauch.

1. *Ae. martinicensis.* Pers. l. c. 1. p. 132. Martinikischer Ziegenstrauch. An den Waldrändern zu Martinique. Jun. Jul. W. H. ♄.

68. Callicarpa, Schönbeere.

1. *C. americana.* Pers. l. c. 1. p. 133. Americanische Schönbeere. In Carol. u. Virgin. Jun. Jul. K. H. ♄.

2. *C. macrophylla.* Pers. l. c. Grofsblättrige Schönbeere. In Ostind. —. W. H. ♄.

69. Buddleja, Buddleje.

1. *B. globosa.* Pers. l, c. 1. p. 135. Kopftragende Buddleje. An feuchten Stellen in Chili. Jun. Jul. Ch. ♄.
B. capitata. Jacq. ic. rar. 2. t. 307. Collect. 2. p. 332.

2. *B. salvifolia.* Pers. l. c. 1. p. 136. Salbeyblättrige Buddleje. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

3. *B. salicifolia.* Pers. l. c. Weidenblättrige Buddleje. Am Cap. Aug. — Oct. Ch. ♄.

70. Exacum, Bitterblatt.

1. E. *viscosum*. Pers. l. c. Klebriges Bitterblatt. Auf den Canarischen Inseln. Jun. — Dec. Ch. ♄.

71. Plantago, Wegetritt.

1. *P. hirsuta*. Pers. l. c. 1. p. 139. Haariger Wegetritt. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

2. *P. Cynops*. Pers. l. c. 1. p. 140. Strauchartiger Wegetritt. In der Provence, Ital. u. Sibir. Jun. Jul. K. H. ♄.

72. Spielmannia, Spielmannie.

1. *Sp. africana*. Pers. l. c. 1. p. 141. Africanische Spielmannie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

73. Sanguisorba, Wiesenknopf.

1. *S. officinalis*. Pers. l. c. Gemeiner Wiesenknopf. Auf feuchten Wiesen in Eur. Jun. Jul. Im F. ♃.

74. Cissus, Klimme.

1. *C. Ampelopsis*. Pers. l. c. 1. p. 142. Weinverwandte Klimme. In Nordamer. —. K. H. ♄.

2. *C. vitiginea*. Pers. l. c. Weinartige Klimme. In Ostind. —. W. H. ♄.

3. *C. antarctica*. Vent. choix. p. 21. t. 21. Neuholländische Klimme. In Neuholl. —. Ch. ♄.

4. *C. sicyoides*. Pers. l. c. Stichlingartige Klimme. In Jamaica. —. W. H. ♄

5. *C. smilacina.* Willd. enum. 1. p. 163. Stechwindenartige Klimme. In Jamaica. —. W. H. ♄.

6. *C. quadrangularis.* Pers. l. c. Viereckige Klimme. In Arabien u. Ostind. —. W. H. ♄.

7. *C. acida.* Pers. l. c. Saure Klimme. In Westind. Jun. Jul. W. H. ♃.

8. *C. orientalis.* Pers. l. c. 1. p. 143. Morgenländische Klimme. Im Orient. Jul. Aug. K. H. ♄.

75. Epimedium, Sockenblume.

1. *E. alpinum.* Pers. l. c. Alpen-Sockenblume. Auf Alpen in Südeur. Apr. May. Im F. ♃.

76. Cornus, Hartriegel.

1. *C. florida.* Pers. l. c. Schönblühender Hartriegel. In Pensylvan. Virgin. u. Carol. May, Jun. Im F. ♄.

2. *C. mascula.* Pers. l. c. Gelber Hartriegel. (Dürlizen). An Zäunen in Eur. Apr. Im F. ♄.

3. *C. sanguinea.* Pers. l. c. Rother Hartriegel. An Hecken in Eur. Asien u. Nordamer. May, Jun. Im F. ♄.

4. *C. alba.* Pers. l. c. Weifser Hartriegel. In Sibir. u. Canada. Jun. Jul. Im F. ♄.

5. *C. sericea.* Pers. l. c. Rostfarbiger Hartriegel. In Südcarol. u. Pensylv. May. Jun. Im F. ♄.

6. *C. circinata.* Pers. l. c. Rundblättriger Hartriegel. In Pensylv. Jun. Jul. Im F. ♄.

7. *C. stricta.* Pers. l. c. 1. p. 144. Steifer Hartriegel. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. ♄.

8. *C. paniculata.* Pers. l. c. Rispenblüthiger Hartriegel. In Nordamer. Jun. Im F. ♄.

9. *C. alternifolia.* Pers. l. c. Wechselblättriger Hartriegel. In Nordamer. Jun. Im F. ♄.

77. Fagara, Fagare.

1. *F. Pterota.* Pers. l. c. Geflügelte Fagare. In Jamaica. May. W. H. ♄.

78. Monetia, Monetie.

1. *M. barlerioides.* L' Herit. stirp. 1. p. 1. t. 1. Vierdornige Monetie. In Ostind. u. am Cap. Jul. Aug. W. H. ♄.
Azima tetracantha. Pers. l. c. 1. p. 145.

79. Ptelea, Lederblume.

1. *Pt. trifoliata.* Pers. l. c. Dreyblättrige Lederblume. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. ♄.

80. Pothos, Pothos.

1. *P. lanceolata.* Pers. l. c. 1. p. 147. Lanzettblättriger Pothos. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. 24.

2. *P. crassinervia.* Pers. l. c. Dicknerviger Pothos. Auf waldigen Bergen zu Caracas. Jun. Jul. W. H. 24.

3. *P. macrophylla.* Pers. l. c. Grofsblättriger Pothos. In Westind. Jun. Jul. W. H. 24.
P. grandifolia. Jacq. ic. rar. 3. t. 610. Collect. 4. p. 121.

4. *P. digitata.* Pers. l. c. Fingerblättriger Pothos. Auf waldigen Bergen zu Caracas. Jänn. Febr. W. H. ♄.

81. Chloranthus, Grünblume.

1. *Ch. inconspicuus.* Pers. l. c. 1. p. 148. Kleinblüthige Grünblume. In China u. Japan. Jän. Febr. Ch. ♄.

82. Elaeagnus, Oleaster.

1. *E. angustifolia.* Pers. l. c. Schmalblättriger Oleaster. In Böhmen, Ungarn, Span. Syrien u. Cappadocien. May. Jun. Im F. ♄.

2. *E. orientalis.* Pers. l. c. Levantischer Oleaster. Im Orient. —. K. H. ♄.

83. Rivina, Rivine.

1. *R. humilis.* Pers. l. c. 1. p. 149. Niedrige Rivine. Auf den Caraibischen Inseln, Jamaica u. Barbados. Jun. Jul. W. H. ♄.

2. *R. laevis.* Pers. l. c. Glatte Rivine. In America. Jun. Jul. W. H. ♄.

3. *R. brasiliensis.* Pers. l. c. Brasilische Rivine. In Südamer. Jun. Jul. W. H. ♄.

4. *R. octandra.* Pers. l. c. Achtfädige Rivine. Im wärmer. Amer. —. W. H. ♄.

84. Camphorosma, Kampferkraut.

1. *C. monspeliaca.* Pers. l. c. Haariges Kampferkraut. Auf sandigem Grunde in Span. Languedoc u. in der Tartarey. Jul. Aug. K. H. ♄.

DIGYNIA.

85. Hamamelis, Zaubernufs.

1. *H. virginica.* Pers. l. c. 1. p. 150. Virginische Zaubernufs. In Virgin. Sept. Oct. Im F. ♄.

TETRAGYNIA.

86. Ilex, Hülsen.

1. *I. Aquifolium.* Pers. l. c. 1. p. 151. Gemeine Hülsen. In Südeur. Japan u. Virgin. May. Im F. ♄.

β. albo variegata. Mit weifsgestreiften Blättern.
γ. aureo — — gelbgestreiften —.
δ. luteo macula . — gelbgefleckten —.
ε. ferox. — auf der Oberfläche stachligen Blättern.

2. *J. opaca.* Pers. l. c. Dunkelblättrige Hülsen. In Carol. —. K. H. ♄.

3. *J. balearica.* Desf. catal. hort. paris. p. 201. Balearische Hülsen. Auf den Balearischen Inseln. —. Ch. ♄.

4. *J. Perado.* Pers. l. c. Madera'sche Hülsen. Zu Madera. —. Ch. ♄.
J. maderiensis. Lam. encycl. 3. p. 146.

5. *J. aestivalis.* Pers. l. c. Sommer-Hülsen. Zu Madera. Jun. Jul. Ch. ♄.

6. *J. Cassine.* Pers. l. c. Lorbeerblättrige Hülsen. In Carol. May, Jun. K. H. ♄.

7. *J. vomitoria.* Pers. l. c. Brech-Hülsen. In Südcarol. May, Jun. K. H. ♄.

8. *J. salicifolia.* Pers. l. c. Weidenblättrige Hülsen. Auf der St. Moritzinsel, Jun. Jul. W. H. ♄.

9. *J. canadensis.* Michaux fl. amer. boreal. 229. Canadische Hülsen. In Canada. —. K. H. ♄.

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

87. Heliotropium, Scorpionschwanz.

1. *H. peruvianum.* Pers. l. c. 1. p. 155. Wohlriechender Scorpionschwanz. In Peru. Bl. den ganzen Sommer hindurch. W. H. ♄.

2. *H. grandiflorum.* Hort. paris. Grofsblüthiger Scorpionschwanz. —. Bl. den ganzen Sommer hindurch. W. H. ♄.

3. *H. indicum.* Pers. l. c. Indischer Scorpionschwanz. In beyd. Ind. Jun. W. H. ☉.

4. *H. curassavicum.* Pers. l. c. 1. p. 156. Curassavischer Scorpionschwanz. In Westindien. Jun. Jul. W. H. ☉.

88. Myosotis, Mauseohr.

1. *M. scorpioides.* Pers. l. c. Sumpf-Mauseohr. An Bächen u. feuchten Stellen in Eur. May — Aug. Im F. 2.
M. palustris. Roth germ. I. 87. II. 221.

89. Lithospermum, Steinsame.

1. *L. officinale.* Pers. l. c. 1. p. 157. Gemeiner Steinsame. In Eur. May — Jul. Im F. 24.

2. *L. purpureo-coeruleum.* Pers. l. c. 1. p. 158. Rother Steinsame. In Hainen v. Ungarn, England. Deutschl. Frankr. u. Ital. May — Jul. Im F. 24.

90. Anchusa, Ochsenzunge.

1. *A. officinalis.* Pers. l. c. 1. p. 159. Gemeine Ochsenzunge. In Deutschl. May, Jun. Im F. 24.

2. *A. italica.* Pers. l. c. Italienische Ochsenzunge. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ♂.

91. Cynoglossum, Hundszunge.

1. *C. officinale.* Pers. l. c. Gemeine Hundszunge. In Eur. May, Jun. Im F. ♂.

2. *C. pictum.* Pers. l. c. Bunte Hundszunge. In Südeur. der Barbar. u. zu Madera. Jun. Jul. Im F. ♂.

3. *C. umbellatum.* Waldst. et Kitaib. pl. rar. hung. 2. p. 158. t. 148. Doldenblüthige Hundszunge. Im Bannate. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *C. linifolium.* Pers. l. c. 1. p. 160. Flachsblättrige Hundszunge. In Span. u. Portug. Jun. Jul. Im F. ⊙.

5. *C. Omphalodes.* Pers. l. c. Frühlings-Hundszunge. In Wäldern zu Piemont u. Krain März, Apr. Im F. 24.

92. Pulmonaria, Lungenkraut.

1. *P. officinalis.* Pers. l. c. 1. p. 161. Gemeines Lungenkraut. In Ungarn, Deutschl. der Schweiz u. Schweden. May, Jun. Im F. 24.

93. Symphytum, Schwarzwurz.

1. *S. officinale.* Pers. l. c. Gemeine Schwarzwurz. In Eur. May, Jun. Im F. 24.
β. purpureum. Mit purpurrothen Blüthen.

2. *S. tuberosum.* Pers. l. c. Knollige Schwarzwurz. In Süddeutschl. Montpell. u. Span. May — Jul. Im F. 24.

3. *S. tauricum.* Pers. l. c. Taurische Schwarzwurz. In Taur. May. Im F. 24.
S. orientale. Bieberst. fl. taurico-caucas. 1 p. 129.

94. Cerinthe, Wachsblume.

1. *C. maior.* Pers. l. c. Grofse Wachsblume. In Sibir. u. der Schweiz Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *C. aspera.* Mill. dict. n. 1. Scharfblättrige Wachsblume. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ☉.
C. maior β aspera. Pers. l. c.

3. *C. minor.* Pers. l. c. Kleine Wachsblume. In Oesterr. Steyerm. und Deutschl. Jun. Jul. Im F. 24.

95. Onosma, Lotwurz.

1. *O. echioides.* Pers. l. c. Natterkopfähnliche Lotwurz. In Oesterr. Böhm. u. Ungarn auf trocknen Haiden. Jun. Jul. Im F. 24.

96. Borago, Boretsche.

1. *B. officinalis.* Pers. l. c. 1. p. 162. Gemeine Boretsche. In der Normandie. Jul. Aug. Im F. ☉.

2. *B. laxiflora.* Loiseleur fl. gall. p. 106. Schlaffblüthige Boretsche. In Corsica. Jul. Aug. K. H. 24.

97. Lycopsis, Krummhals.

1. *L. pulla.* Pers. l. c. Kleiner Krummhals. Im südlicheren Eur. auf sonnigen Hügeln. May. Im F. 24.

98. Echium, Natterkopf.

1. *E. bifrons.* Decand. catal. hort. monspel. p. 107. Zweyförmiger Natterkopf. —. —. Ch. ♄.

2. *E. candicans.* Pers. l. c. 1. p. 163. Weifslicher Natterkopf. Auf hohen Felsen zu Madera. Jun. — Aug. Ch. ♄.

3. *E. giganteum.* Pers. l. c. Höchster Natterkopf. Auf Felsen zu Teneriffa. Jun. Ch. ♄.

4. *E. fastuosum.* Jacq. eclog. fasc. 5. p. 61. t. 41. Prächtiger Natterkopf. —. Jun. Ch. ♄.

99. Messerschmidia, Messerschmidie.

1. *M. fruticosa.* Pers. l. c. 1. p. 164. Strauchartige Messerschmidie. Zu Teneriffa u. den Canarischen Inseln. Jul. Aug. Ch. ♄.

100. Tournefortia, Tournefortie.

1. *T. hirsutissima.* Pers. l. c. 1. p. 165. Haarige Tournefortie. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. W. H. ♄.

2. *T. volubilis.* Pers. l. c. Windende Tournefortie. In Jamaica, Mexico u. Peru. Jul. W. H. ♄.

3. *T. cymosa.* Lin. sp. pl. 202. Doldentraubige Tournefortie. In Jamaica, May — Jul. W. H. ♄. T. macrophylla. Pers. l. c.

4. *T. foetidissima.* Pers. l. c. Stinkende Tournefortie. In Mexico u. Jamaica. Jun. Jul. W. H. ♄.

101. Cordia, Cordie.

1. *C. Sebestena.* Pers. l. c. 1. p. 166. Sebesten-Cordie. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♄.

102. Ehretia, Ehretie.

1. *E. tinifolia.* Pers. l. c. Lorbeerblättrige Ehretie. In Jamaica. Jul. Aug. W. H. ♄.

2. *E. Beurreria.* Pers. l. c. 1. p. 167. Ovale Ehretie. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. ♄.

3. *E. laxa.* Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 18. t. 41. Schlaffe Ehretie. Auf Bourbon. Jun. Jul. W. H. ♄.

103. Varronia, Varronie.

1. *V. bullata.* Pers. l. c. Aufgeblasene Varronie. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. ♄.

2. *V. alba.* Pers. l. c. Weifse Varronie. In Amer. —. W. H. ♄

3. *V. monosperma.* Pers. l. c. Einsamige Varronie. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. ♄.

4. *V. alnifolia.* Cavan. Ellerblättrige Varronie. — Jänn. — Apr. W. H. ♄.

104. Hydrophyllum, Rinnenblume.

1, *H. magellanicum.* Pers. l. c. 1. p. 168. Magellanische Rinnenblume. Auf der Magellanischen Landenge. Jun. Jul. K. H. 4.

2. *H. canadense.* Pers. l. c. Canadische Rinnenblume. In feuchten Wäldern v. Canada. Jun. Jul. Im F. 4.

105. Ellisia, Ellisie.

1. *E. Nyctelea.* Pers. l. c. Virginische Ellisie. In Virgin. Jul. Aug. Im F. ☉.

106. Nolana, Nolane.

1. *N. prostrata.* Pers. l. c. Liegende Nolane. In Peru. Jul. Aug. Im F. ☉.

107. Androsace, Mannsschild.

1. *A. villosa.* Pers. l. c. 1. p. 169. Rauher Mannsschild. Auf Oesterreichisch. u. Schweizeralpen. May, Jun. Im F. 4.

2. *A. lactea.* Pers. l. c. Milchweifser Mannsschild. Auf Oesterreichisch. u. Schweizeralpen. Jun. Jul. Im F. 4.

108. Primula, Primel.

1. *P. veris.* Pers. l. c. Frühlings-Primel. In Eur. May. Im F. 4.

2. *P. elatior.* Pers. l. c. Garten-Primel. In Eur. May. Im F. 24.

3. *P. vulgaris.* Smith brit. 1. p. 222. Gemeine Primel. In Deutschl. Engl. u. Frankr. Apr. May. Im F. 24.
P. acaulis. Pers. l. c.

β. flore pleno violaceo. Mit gefülltvioletter Blüthe.

4. *P. farinosa.* Pers. l. c. Mehlblättrige Primel. Auf Alpen u. feuchten Wiesen in Eur. May. Im F. 24.

5. *P. cortusoides.* Pers. l. c. 1. p. 170. Schönste Primel. In Sibir. May, Jul. K. H. 24.

6. *P. marginata.* Pers. l. c. Gerandete Primel. Auf den Schweizeralpen. May — Jul. Im F. 24.

7. *P. Auricula.* Pers. l. c. Aurikel-Primel. Auf Bergfelsen in Eur. Apr. May. Im F. 24.

8. *P. Palinuri.* Petagna instit. bot. 2. p. 332. Palinurische Primel. Auf Felsen des Vorgebirges Palinuro im Königreiche Neapel. Apr. May. K. H. ♄.

9. *P. minima.* Pers. l. c. Kleinste Primel. Auf Alpen in Oester. Kärnthen, Krain u. der Schweiz. Jun. Aug. Im F. 24.

10. *P. integrifolia.* Pers. l. c. Ganzblättrige Primel. Auf Alpen in Oesterr. Steyerm. Krain u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.

109. Cortusa, Cortuse.

1. *C. Mathioli.* Pers. l. c. Europäische Cortuse. Auf Alpen in Oesterr. Schles. u. Sibir. Jun. Jul. Im F. 24.

110. Soldanella, Alpenglöckchen.

1. *S. alpina.* Willd. en 1. p. 192. Gemeines Alpenglöckchen. Auf Alpen in Oesterr. Salzb. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 4.
S. alpina β Clusii. Pers. l. c.

2. *S. montana.* Willd. l. c. Berg-Alpenglöckchen. Auf sehr feuchten Bergwiesen in Oesterr. Böhmen u. Passau. May. Jun. Im F. 4.
S. alpina. Pers. l. c.

111. Dodecatheon, Göttergabe.

1. *D. Meadia.* Pers. l. c. Virginische Göttergabe. In Virgin. May, Jun. Im F. 4.

112. Cyclamen, Erdscheibe.

1. *C. coum.* Pers. l. c. 1. p. 171. Rundblättrige Erdscheibe. In Südeur. Jun. K. H. 4.

2. *C. europaeum.* Pers. l. c. Europäische Erdscheibe. In schattigen Wäldern v. Oesterr. Böhm. Schles. Jun. — Aug. Im F. 4.

3. *C. persicum.* Pers. l. c. Persische Erdscheibe. Auf der Insel Cypern. Jun. Jul. K. H. 4.

4. *C. hederaefolium.* Pers. l. c. Epheublättrige Erdscheibe. In Ital. Jun. Jul. K. H. 4.

5. *C. autumnale.* Cujus? Herbstliche Erdscheibe. —. Bl. im Herbste. K. H. 4.

113. Menyanthes, Zottenblume.

1. *M. nymphoides.* Pers. l. c. Seeblumenartige Zottenblume. In stehendem Gewässer des südlicheren Eur. Jun. Jul. Im freyen Wasserbehälter 4. Waldschmidtia nymphoides. Wiggers primit. fl. holsat. p. 20.

2. *M. trifoliata,* Pers. l. c. Dreyblättrige Zottenblume. In Sümpfen v. Eur. u. Nordamer. May. Im freyen Wasserbehälter 4.

114. Lysimachia, Lysimachie.

1. *L. vulgaris.* Pers. l. c. 1. p. 172. Gemeine Lysimachie. In schattigen Hainen an Bächen. Jun. Jul. Im F. 4.

2. *L. Ephemerum.* Pers. l. c. Weidenblättrige Lysimachie. In Span. Medien u. Sibir. Jul. Aug. Im F. 4.

3. *L. dubia.* Pers. l. c. Hellrothe Lysimachie. Im Orient. Jun. Jul. Im F. 4.

4. *L. hirsuta.* Michaux. flor. amer. 1. p. 127 Vierblättrige Lysimachie. In Carol. u. Pensylv. Jun. Jul. Im F. 4.
L. quadrifolia. Pers. l. c.

5. *L. ciliata.* Pers. l. c. Gefranzte Lysimachie. In Neujork. Jun. Jul. Im F. 4.

6. *L. punctata.* Pers. l. c. Punktirte Lysimachie. In Krain, der Schweiz, Holland u. Sibir. Jun. Jul. Im F. 4.

115. Anagallis, Gauchheil.

1. *A. grandiflora.* Hort. monachiens. Grofsblüthiges Gauchheil. —. Jun. — Aug. Ch. ♄.

116. Styphelia, Styphelie.

1. *St. daphnoides.* Pers. l. c. 1. p. 174. Seidelbastartige Styphelie. In Australien. —. Ch. ♄.

2. *St. Gnydium.* Pers. l. c. Gniedienartige Styphelie. In Australien. —. Ch. ♄. May.

117. Cremastostemon, Hängfaden.

1. *C. capensis.* Jacq. fragm. p. 68. n. 216. t. 103. f. 1. Capischer Hängfaden. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

118. Itea, Itea.

1. *I. virginica.* Pers. l. c. 1. p. 175. Virginische Itea. In Virgin. —. K. H. ♄.

119. Plumbago, Bleywurz,

1. *P. europaea.* Pers. l. c. Europäische Bleywurz. In Südeur. u. Peru. Sept. Oct. Im F. 24.

2. *P. zeylanica.* Pers. l. c. Zeylonische Bleywurz. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♄.

3. *P. rosea.* Pers. l. c. Rosenrothe Bleywurz. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♄.

4. *P. scandens.* Pers. l. c. Klimmende Bleywurz. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♄.

120. Mirabilis, Jalape.

1. *M. dichotoma.* Pers. l. c. 1. p. 176. Gabelförmige Jalape. In Mexico. Jun. — Aug. K. H. 24.

2. *M. Jalapa.* Pers. l. c. Gemeine Jalape. In beyden Ind. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *M. longiflora.* Pers. l. c. Langblumige Jalape. Auf kalten Bergen in Mexico. Jun. Jul. Im F. 24.

121. Convolvulus, Winde.

1. *C. Batatas.* Pers. l. c. 1. p. 178. Bataten-Winde. In beyden Ind. Jul. Aug. W. H. 24.

2. *C. canariensis.* Pers. l. c. 1. p. 179. Canarische Winde. Auf den Canarischen Inseln. —. Ch. ♄.

3. *C. siculus.* Pers. l. c. 1. p. 180. Sicilianische Winde. In Sicilien. Jun. Jul. Im F. ☉.

4. *C. lineatus.* Pers. l. c. Gestrichelte Winde. Am Meerstrande in Südeur. Jun. Jul. K. H. ♃.

5. *C. Cneorum.* Pers. l. c. 1. p. 181. Candische Winde. In Span. Cand. und Syrien. Jun. Jul. K. H. ♄.

6. *C. Cantabrica.* Pers. l. c. Cantabrische Winde. In Südeur. Taurien und Africa. Jun. Im F. ♃.

7. *C. tricolor.* Pers. l. c. 1. p. 182. Dreyfarbige Winde. In Sicil. Span. und Nordafr. Jun. Jul. Im F. ☉.

8. *C.* ? *monospermus.* Cujus ? Einsamige Winde. —. W. H. ♄.

122. Ipomoea, Trichterwinde.

1. *J. Quamoclit.* Pers. l. c. 1. p. 182. Gefiederte Trichterwinde. In Ostind. Jul. August. W. H. ☉.

2. *J coccinea.* Pers. l. c. Scharlachrothe Trichterwinde. In Westind. Jun. Jul. W. H. ☉.

3. *J. bona nox.* Pers. l. c. 1. p. 183. Stachlige Trichterwinde. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☉.

4. *J. violacea.* Pers. l. c. Violette Trichterwinde. In Südamer. Jun. Jul. W. H. ☉.

5. *J. purpurea.* Pers. l. c. Purpurrothe Trichterwinde. In Amer. Jun. Jul. W. H. ☉.

6. *J. discolor.* Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 6. t. 261. Zweyfarbige Trichterwinde —. Jul. Aug. W. H. ☉.

7. *J. Nil.* Pers. l. c. 1. p. 184. Blaue Trichterwinde. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. ☉.

8. *J. ternata.* Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 16. t. 37. Dreyblättrige Trichterwinde. In Südamer. Jul. Aug. W. H. ♄.

9. *J. heterophylla.* Pers. l. c. 1. p. 185. Verschiedenblättrige Trichterwinde. In Mexico u. auf der Insel Cuba. Jul. Aug. W. H. ♄.

123. Cobaea, Cobäa.

1. *C. scandens.* Pers. l. c. Klimmende Cobäa. In Mexico. Jun. — Oct. W. H. ♄.

124. Polemonium, Sperrkraut.

1. *P. coeruleum.* Pers. l. c. Blaues Sperrkraut. Im nördlicheren Eur. Oesterr. Böhm. Ungarn und in Asien. Jun. Jul. Im F. 4.

125. Phlox, Flammenblume.

1. *Ph. paniculata.* Pers. l. c. 1. p. 186. Rispenblüthige Flammenblume. In Nordamer. Jun. — Sept. Im F. 4.

2. *Ph. aristata.* Pers. l. c. Gegrannte Flammenblume. In Carolina. Jun. Jul. Im F. 4.

3. *Ph. suaveolens.* Pers. l. c. Wohlriechende Flammenblume. In Nordamer. Jun. — Aug. Im F. 4.

4. *Ph. maculata.* Pers. l. c. Gefleckte Flammenblume. In Virginien. Jun. Jul. Im F. 4.

5. *Ph. glaberrima.* Pers. l. c. Glatte Flammenblume. In Virgin. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *Ph. divaricata.* Pers. l. c. Ausgebreitete Flammenblume. Auf Bergen in Virgin. May. Im F. 24.

7. *Ph. reptans.* Pers. l. c. Kriechende Flammenblume. Auf Bergen in Carol. Jun. Jul. Im F. 24.

8. *Ph. subulata.* Pers. l. c. Pfriemenartige Flammenblume. In Virgin. Jun. Jul. Im F. 24.

9. *Ph. setacea.* Pers. l. c. Borstenblättrige Flammenblume. In Virgin. Jun. Jul. Im F. 24.

126. Vestia, Vestie.

1. *V. lycioides.* Willd. enum 1. p. 208. Bocksdornartige Vestie. In Chili. Jun. Jul. Ch. ♄. Cantua foetida. Pers. l. c. 1. p. 187. Periphragmos foetidus. Ruiz et Pavon fl. peruv. 2. p. 17. t. 132.

127. Caldasia, Caldasie.

1. *C. heterophylla.* Willd. hort. berol. 1. p. 71. t. 71. Verschiedenblättrige Caldasie. In Mexico. Bl. das ganze Jahr hindurch. W. H. 24. Bonplandia geminiflora. Pers. l. c.

128. Campanula, Glockenblume.

1. *C. pulla.* Pers. l. c. 1. p. 188. Dunkelblaue Glockenblume. Auf Alpen in Oesterr. und Steyerm. Jun. Jul. Im. F. 24.

2. *C. rotundifolia.* Pers. l. c. Rundblättrige Glockenblume. In Hainen und an Zäunen in Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

3. *C. persicifolia.* Pers. l. c. 1. p. 189. Pfirschig-

blättrige Glockenblume. In Wäldern v. Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

β flore pleno albo. Mit weifsgefüllter Blüthe.

4. *C. pyramidalis.* Pers. l. c. Pyramidenartige Glockenblume. In Ital. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *C. rapunculoides.* Pers. l. c. 1. p. 190. Rapunzelartige Glockenblume. In Oesterreich, Deutschl. der Schweiz u. Frankr. Jun. — Aug. Im F. 24.

6. *C. Trachelium.* Pers. l. c. Gemeine Glockenblume. An Zäunen u. Hainen von Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

7. *C. glomerata.* Pers. l. c. Knaulblumige Glockenblume. Auf Wiesen u. Kalkhügeln in Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

8. *C. peregrina.* Lin. mant. 2. p. 204. Fremde Glockenblume. Am Cap? Jun. Jul. Ch. 24.

9. *C. Medium.* Pers. l. c. 1. p. 191. Grofsblumige Glockenblume. In Krain u. Ital. Jun Jul. Im F. ♂.

10. *C. divergens.* Waldst. et Kitaib. Ausgebreitete Glockenblume. In Ungarn. May, Jun. Im F. ♂.

11. *lingulata.* Pers. l. c. Zungenblättrige Glockenblume. In Ungarn. May, Jun. Im F. ♂.

12. *C. alpina.* Pers. l. c. 1. p. 192. Alpen-Glockenblume. Auf Alpen in Oesterr. u. der Schweiz. Jun. — Aug. Im F. 24.

13. *C. mollis.* Pers. l. c. Weiche Glockenblume. In Syr. Sicil. u. Span. Jun. — Aug. K. H. ☉.

14. *C. sibirica.* Pers. l. c. Sibirische Glockenblume. In Sibir. u. Oesterr. May, Jun. Im F. ♂.

15. *C. aurea.* Pers. l. c. Goldfarbige Glockenblume. Auf Felsen zu Madera. Jun. Jul. Ch. ♄.

129. Phyteuma, Rapwurzel.

1. *Ph. hemisphaericum.* Pers. l. c. 1. p. 194. Halbrunde Rapwurzel. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz u. Ital. May, Jun. Im F. 4.

2. *Ph. orbiculare.* Pers. l. c. Kugelförmige Rapwurzel. Auf Bergwiesen in Deutschland, der Schweiz u. Ital. Jun. Jul. Im F. 4.

3. *Ph. spicatum.* Pers. l. c. Aehrentragende Rapwurzel. Auf waldigen Bergen in Deutschland, der Schweiz, Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 4.

130. Trachelium, Halskraut.

1. *T. coeruleum.* Pers. l. c. 1. p. 195. Blaues Halskraut. An schattigen Oertern in Ital. u. im Orient. Jun. — Aug. K. H. 4.

131. Goodenia, Goodenie.

1. *G. ovata.* Pers. l. c. Eyförmige Goodenie. In Neuholl. May, Jun. Ch. ♄.

2. *G. grandiflora.* Curt. bot. mag. 890. Grofsblüthige Goodenie. In Neuholl. May — Jul. Ch. 4. G. appendiculata. Jacq. fragm. bot. p. 62. n. 200. t. 92.

3. *G. calendulacea.* Pers. l. c. Ringelblumenartige Goodenie. In Neuholl. —. Ch. ♄.

132. Gardenia, Gardenie.

1. *G. radicans.* Pers. l. c. 1. p. 198. Wurzelnde Gardenie. In Japan. —. Ch. ♄.

2. *G. florida.* Pers. l. c. Vollblüthige Gardenie. In Ostind. Amboina u. am Cap. Nov. Dec. W. H. ♄.

3. *G. Thunbergia.* Pers. l. c. Thunbergische Gardenie. Am Cap u. zu Manilla. —. W. H. ♄.

4. *G. Randia* β mitis. Swartz' fl. ind. occident. 1. p. 528. Zahme Gardenie. Auf den Antill. u. zu Jamaica. —. W. H. ♄.
Randia latifolia β ? mitis. Pers. l. c. 1. p. 199.

133. Hamelia, Hamelie.

1. *H. patens.* Pers. l. c. 1. p. 203. Abstehende Hamelie. An Bergzäunen in Hispaniola u. Peru. May — Sept. W. H. ♄.

2. *H. chrysantha.* Pers. l. c. Goldfarbige Hamelie. An Bergzäunen von Jamaica u. Caracas. May — Sept. W. H. ♄.

134. Rondeletia, Rondeletie.

1. *R. racemosa.* Pers. l. c. 1. p. 204. Traubentragende Rondeletie. Auf waldigen Bergen zu Jamaica. Jun. — Aug. W. H. ♄.

135. Macrocnemum, Stengelblume.

1. *M. speciosum.* Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 19. t. 43. Schöne Stengelblume. Zu Caracas. Jul. Aug. W. H. ♄.

136. Serissa, Serisse.

1. *S. foetida.* Pers. l. c. 1. p. 205. Stinkende Serisse. In Ind. u. Japan. May — Jul. Ch. ♄. Lycium japonicum. Thunb. t. 17.

137. Psychotria, Psychotrie.

1. *Ps. undata.* Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 5. t. 260. Wogenblättrige Psychotrie. Auf den Bahamainseln. Jul. — Oct. W. H. ♄.

138. Coffea, Coffee.

1. *C. arabica.* Pers. l. c. 1. p. 208. Arabischer Coffee. Im glücklichen Arab. u. Aethiop. May — Oct. W. H. ♄.

139. Paederia, Knackbeere.

1. *P. foetida.* Pers. l. c. 1. p. 210. Stinkende Knackbeere. In Ostind. —. W. H. ♄.

140. Azalea, Azalea.

1. *A. procumbens.* Pers. l. c. 1. p. 212. Liegende Azalea. Auf Alpen in Eur. Jun. Jul. Im F. ♄.

2. *A. pontica.* Pers. l. c. Pontische Azalea. Am schwarzen Meere u. in Gallicien. Jun. Jul. K. H. ♄.

3. *A. viscosa.* Pers. l. c. 1. p. 213. Klebrige Azalea. In Virgin. Jun. — Aug. K. H. ♄.

4. *A. glauca.* Pers. l. c. Graugrüne Azalea. In Virgin. u. Carol. Jun. — Aug. K. H. ♄.

141. Lonicera, Lonicere.

1. *L. Caprifolium.* Pers. l. c. Durchwachsene Lonicere. (Geisblatt). In Südeur. May — Jul. Im F. ♄.

2. *L. Periclymenum.* Pers. l. c. Deutsche Lonicere. In Mitteleur. May, Jun. Im F. ♄.

3. *L. dioica.* Lin. syst. veg. p. 181. Graue Lonicere. In Nordamer. Jun. Im F. ♄.
L. parviflora. Pers. l. c.

4. *L. sempervirens.* Pers. l. c. Immergrüne Lonicere. In Wäldern v. Carol. u. Mexico. May — Jul. Im F. ♄.

5. *L. grata.* Pers. l. c. Schöne Lonicere. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. ♄.

6. *L. japonica.* Pers. l. c. Japanische Lonicere. In Japan. —. Ch. ♄.

7. *L. nigra.* Pers. l. c. Schwarze Lonicere. In Oesterr. der Schweiz u. Frankr. auf Niederalpen. Jun. Jul. Im F. ♄.

8. *L. Xylosteum.* Pers. l. c. Gemeine Lonicere. (Beinholz). An Zäunen in Eur. May — Jul. Im F. ♄.

9. *L. tatarica.* Pers. l. c. Tartarische Lonicere. In der Tartarey. May, Jun. Im F. ♄.

β. sibirica. Mit schönrothen Blüthen.

10. *L. alpigena.* Pers. l. c. Alpen-Lonicere. Auf Alpen im südlicher. Eur. May, Jun. Im F. ♄.

11. *L. coerulea.* Pers. l. c. Blaue Lonicere. In Oesterr. u. der Schweiz auf Alpen Jun. Jul. Im F. ♄.

142. Symphoricarpos, Zwillingsfrucht.

1. *S. vulgaris.* Michaux. fl. amer. 1. p. 106.

Gemeine Zwillingsfrucht. In Virgin. u. Carolina. Jul. Aug. Im F. ♄.
Lonicera Symphoricarpos. Pers. l. c. 1. p. 214.

143. Diervilla, Dierville.

1. *D. canadensis.* Willd. enum. 1. p. 222. Canadische Dierville. In Canada, Neujork und Carolina. Jun. Jul. Im F. ♄.
Diervilla humilis. Pers. l. c.
Lonicera Diervilla. Lin. sp. pl. p. 249.

144. Verbascum, Königskerze.

1. *V. condensatum.* Schrad. monog. Verbasc. sect. 1. p. 31. t. 3. Dichtbewachsene Königskerze. In Oesterr. Jun. Jul. Im F. ♂.

2. *V. speciosum.* Schrad. hor t. goetting. fasc. 2. p. 22. t. 16. Schöne Königskerze. In Oesterr. Jun. Jul. Im F. ♂.

3. *V. phlomoides.* Pers. l. c. 1. p. 215. Phlomisartige Königskerze. In Deutschl. u. Ital. Jun. Jul. Im F. ♂.

4. *V. pyramidatum.* Bieberst. fl. taur. caucas. 1. p. 161. Pyramidenartige Königskerze. Am Caucasus. —. Im F. ♂.

5. *V. Lychnitis.* Pers. l. c. Lychnisartige Königskerze. Auf kalkigem Boden in Eur. Jun. Jul. Im F. 2.

6. *V. nigrum.* Pers. l. c. Schwarze Königskerze. In Waldgegenden v. Eur. Jun. Jul. Im F. 2.

7. *V. austriacum.* Schrad. fl. germ. ined. Oesterreichische Königskerze. In Oesterr. Jun. Jul. Im F. ♂.

8. *V. phoeniceum.* Pers. l. c. Violete Königskerze. Im östlichen Eur. Krain u. Deutschl. Jun. Jul. Im F. 24.

9. *V. Blattaria.* Pers. l. c. Veränderliche Königskerze. Im südlicheren Eur. Jul. Aug. Im F. ♂.

145. Datura, Stechapfel.

1. *D. Tatula.* Pers. l. c. 1. p. 216. Blafsblauer Stechapfel. Am Cap. Jun. Jul. Im F. ⊙.

2. *D. fastuosa.* Pers. l. c. Schöner Stechapfel. In Aegypt. May, Jun. Im F. ⊙.

3. *D. Metel.* Pers. l. c. Weifser Stechapfel. In Asien, Afr. u. den Canar. Inseln. Jun. — Aug. W. H. ⊙.

4. *D. ceratocaula.* Pers. l. c. Gabelstieliger Stechapfel. Auf Cuba. Jul. Aug. W. H. ⊙.

5. *D. suaveolens.* Humboldt et Bonpl. Wohlriechender Stechapfel. In Mexico. Jun. — Sept. W. H. ♄.
D. arborea Hortulan.

146. Hyoscyamus, Bilsenkraut.

1. *H. aureus.* Pers. l. c. 1. p. 217. Goldfarbiges Bilsenkraut. In Candien und im Orient. May — Aug. K. H. 24.

2. *H. Scopolia.* Pers. l. c. Glockenförmiges Bilsenkraut. In Wäldern bey Idria u. im Banat. May, Jun. Im F. 24.

147. Nicotiana, Taback.

1. *N. Tabacum.* Pers. l. c. Gemeiner Taback. In Amer. Jun. — Aug. Im F. ⊙.

2. *N. macrophylla.* Spreng. ind. hort. halens. 1807. p. 45. Grofsblättriger Taback. In Amer. Jul. Aug. Im F. ☉.

3. *N. rustica.* Pers. l. c. Bauern-Taback. In Amer. Jun. Jul. Im F. ☉.

4. *N. paniculata.* Pers. l. c. Jungfern-Taback. In Peru. Jun. Jul. Im F. ☉.

5. *N. undulata.* Pers. l. c. Wellenblättriger Taback. Bey der Stadt Jackson in Neuholl. Jun. Jul. Ch. 24.

148. Solandra, Solandre.

1. *S. grandiflora.* Pers. l. c. 1. p. 218. Grofsblumige Solandre. Auf den höchsten Bäumen in Jamaica. Jun. Jul. W. H. ♄.

β foliis glabris. Mit glatten Blättern.

149. Mandragora, Alraun.

1. *M. officinalis.* Decand. fl. franc. 3. p. 610. Officineller Alraun. Auf sonnigen Oertern in Krain, Span. der Schweiz, Sibir. Ital. Cand. u. den Cycladischen Inseln. May. Im F. 24.
Atropa Mandragora. Pers. l. c.

150. Atropa, Tollkraut.

1. *A. Belladonna.* Pers. l. c. Gemeines Tollkraut. Auf waldigen Bergen in Oesterr. Deutschl. u. Ital. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *A. frutescens.* Pers. l. c. 1. p. 219. Strauchartiges Tollkraut. In Span. Jun. Jul. K. H. 24.

151. Nicandra, Nicandre.

1. *N. physaloides.* Pers. l. c. Schluttenartige Nicandre. In Peru. Jul. Aug. Im F. ⊙. Atropa physaloides. Lin. sp. pl. 260.

152. Physalis, Schlutte.

1. *Ph. somnifera.* Pers. l. c. 1. p. 220. Schlafmachende Schlutte. In Mexico und Span. Jul. Aug. Ch. ♄.

2. *Ph. flexuosa.* Pers. l. c. Gebogene Schlutte. In Ostind. Jun. — Aug. Ch. ♄.

3. *Ph. viscosa.* Pers. l. c. Klebrige Schlutte. In Virgin. u. zu Buenos Ayres. Jun. — Aug. Ch. 2|.

4. *Ph. Alkekengi.* Pers. l. c. Gemeine Schlutte. An Gräben v. Deutschl. Ital. u. Japan. Jun. Jul. Im F. 2|.

5. *Ph. peruviana.* Pers. l. c. Peruvianische Schlutte. (Ananaskirsche). Zu Lima. Jun. Jul. Ch. ♄.

6. *Ph. prostrata.* Pers. l. c. Liegende Schlutte. In Peru. Jun. Jul. W. H. ⊙.

153. Solanum, Nachtschatten.

1. *S. auriculatum.* Pers. l. c. 1. p. 221. Geöhrter Nachtschatten. Auf den Inseln Madagascar, St. Moritz u. Bourbon. May, Jun. W. H. ♄.

2. *S. Melongena.* Pers. l. c. Eytragender Nachtschatten. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ⊙.

β. ovigera. Mit weifser eyförmiger Frucht.

3. *S. diphyllum.* Pers. l. c. 1. p. 222. Zweyblättriger Nachtschatten. Im wärmeren Amer. Jun. Jul. W. H. ♄.

4. *S. fugax.* Pers. l. c. Hinfälliger Nachtschatten. Zu Caracas. Jun. — Aug. W. H. ♄.

5. *S. stellatum.* Pers. l. c. Sternförmiger Nachtschatten. —. May — Aug. W. H. ♄.

6. *S. nodiflorum.* Pers. l. c. 1. p. 223. Knotenblüthiger Nachtschatten. Auf der St. Moritzinsel. Jul. Aug. W. H. ♄.

7. *S. Pseudo-capsicum.* Pers. l. c. Beifsbeerenartiger Nachtschatten. Zu Madera. Jun. — Aug. Ch. ♄.

8. *S. Dulcamara.* Pers. l. c. 1. p. 224. Kletternder Nachtschatten. (Bittersüfs). An feuchten Stellen in Eur. Jun. Jul. Im F. ♄.

9. *S. aggregatum.* Jacq. ic. rar. 2. t. 323. Coll. 4. p. 124. Gehäufter Nachtschatten. Am Cap. Aug. — Oct. Ch. ♄.
Atropa solanacea. Pers. l. c. 1. p. 219.

10. *S. bombense.* Jacq. stirp. amer. 49. Bombascher Nachtschatten. Auf der Insel Bomba bey Carthagena. Jun. — Sept. Ch. ♄.

11. *S. betaceum.* Pers. l. c. Mangoldblättriger Nachtschatten. In Mexico. —. Ch. ♄.

12. *S. bonariense.* Pers. l. c. 1. p. 225. Bonarischer Nachtschatten. Zu Buenos-Ayres. Aug. — Oct. K. H. ♄.

13. *S. macrocarpon.* Pers. l. c. Grofsfrüchtiger Nachtschatten. In Peru. Jun. — Aug. W. H. ♄.

14. *S. radicans.* Pers. l. c. Wurzelnder Nachtschatten. In Peru. Jun. — Aug. Ch. ♃.

15. *S. reclinatum.* Pers. l. c. Niedergebogener Nachtschatten. —. Jun. — Aug. Ch. ♂.

16. *S. Lycopersicum.* Pers. l. c. 1. p. 226. Liebesapfel-Nachtschatten. Im wärmer. Amer. Jun. — Aug. Im F. ☉.

17. *L. Pseudo-Lycopersicum.* Pers. l. c. Falscher Liebesapfel-Nachtschatten. —. Jun. Jul. Im F. ☉.

18. *S. carolinense.* Pers. l. c. 1. p. 227. Carolinischer Nachtschatten. In Carolina. —. K. H. ☉.

19. *S. sodomeum.* Pers. l. c. 1. p. 228. Sodoms-Nachtschatten. In Africa, besonders am Cap. Jul. Aug. Ch. ♄.

20. *S. marginatum.* Pers. l. c. Gerändeter Nachtschatten. In Abyssinien. Jun. — Aug. Ch. ♄.

21. *S. stramonifolium.* Pers. l. c. Stechapfelblättriger Nachtschatten. In Westind. Jul. Aug. W. H. ♄.

22. *S. ferrugineum.* Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 46. t. 334. Rostfarbener Nachtschatten. —. Jun. — Aug. W. H. ♄.

23. *S. tomentosum* Pers. l. c. Filziger Nachtschatten. In Aethiop. Jun. Jul. W. H. ♄.
β. coccineum. Mit scharlachrothen Früchten.

24. *S. giganteum.* Pers. l. c. Riesenartiger Nachtschatten. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.

25. *S. igneum.* Pers. l. c. Feuriger Nachtschatten. Im wärmer. Amer. Jun. — Aug. W. H. ♄.

26. *S. Pyracanthos.* Pers. l. c. Rothstachliger Nachtschatten. Zu Madagascar. Jun. Jul. W. H. ♄.

27. *S. violaceum.* Ort. decas 5. p. 56. Violeter Nachtschatten. In Mexico. Apr. — Jul. W. H. ♄.

154. Capsicum, Beissbeere.

1. *C. annuum.* Pers. l. c. Jährige Beifsbeere. In Südamer. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *C. baccatum.* Pers. l. c. Kleinfrüchtige Beifsbeere. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♄.

3. *C. sinense.* Pers. l. c. Chinesische Beifsbeere. In China. Jun. Jul. Ch. ♄.

4. *C. grossum.* Pers. l. c. 1. p. 230. Grofsfrüchtige Beifsbeere. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☉.

5. *C. frutescens.* Pers. l. c. Strauchartige Beifsbeere. In beyden Ind. Jun. Jul. W. H. ♄.

6. *C. cerasiforme.* Pers. l. c. Rundfrüchtige Beifsbeere. —. Jun. Jul. W. H. ♄.

155. Cestrum, Hammerstrauch.

1. *C. laurifolium.* Pers. l. c. Lorbeerblättriger Hammerstrauch. Im wärmer. Amer. Nov. — Febr. W. H. ♄.

2. *C. macrophyllum.* Pers. l. c. Grofsblättriger Hammerstrauch. Auf den Antillen u. zu Portoricco. März. W. H. ♄.

3. *C. Parqui.* Pers. l. c. Chilischer Hammerstrauch. An feuchten Stellen zu Chili. Jun. — Aug. K. H. ♄.

4. *C. salicifolium.* Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 42. t. 329. Weidenblättriger Hammerstrauch. Zu Caracas. Nov. Dec. W. H. ♄.

5. *C. hirsutum.* Jacq. l. c. 3. p. 41. t. 324. Rauhhaariger Hammerstrauch. —. Apr. May. W. H. ♄.

6. *C. vespertinum.* Pers. l. c. Abend-Hammerstrauch. Auf den Antillen. Jun. — Aug. W. H. ♄.

7. *C. pendulinum.* Jacq. l. c. 3. p. 42. t. 327. Hängender Hammerstrauch. Zu Caracas. Jun. — Aug. W. H. ♄.

8. *C. tinctorium.* Jacq. l. c. 3. p. 45. t. 332. Färber-Hammerstrauch. Zu Caracas. May — Sept. W. H. ♄.

9. *C. foetidissimum.* Jacq. l. c. 3. p. 43. t. 329. Stinkender Hammerstrauch. In Westind. März, Apr. u. Sept. Oct. W. H. ♄.

10. *C. cauliflorum.* Jacq. l. c. 3. p. 41. t. 325. Stammblüthiger Hammerstrauch. —. Apr. May. W. H. ♄.

11. *C. odontospermum.* Jacq. l. c. 3. p. 44. t. 331. Zahnfrüchtiger Hammerstrauch. —. Sept. Oct. W. H. ♄.

12. *C. fastigiatum.* Jacq. l. c. 3. p. 44. t. 330. Gleichhochästiger Hammerstrauch. Auf Cuba. Jun. — Aug. W. H. ♄.

156. Lycium, Bocksdorn.

1. *L. afrum.* Pers. l. c. 1. p. 231. Africanischer Bocksdorn. Im nördlichen Africa. Jun. Jul. K. H. ♄.

2. *L. tenue.* Willd. enum. 1. p. 245. Zarter Bocksdorn. —. Jun. Jul. Ch. ♄.

3. *L. ruthenicum.* Pers. l. c. Russischer Bocksdorn. In Sibir. an der Wolga. Jun. Jul. Im F. ♄.

4. *L. barbarum.* Pers. l. c. Gemeiner Bocksdorn. In Eur. Asien u. Africa. Jun. — Aug. Im F. ♄.

5. *L. cinereum.* Pers. l. c. 1. p. 232. Grauer Bocksdorn. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

6. *L. boerhaavifolium.* Pers. l. c. Graublättriger Bocksdorn. In Peru. —. W. H. ♄.

157. Pogonia, Pogonie.

1. *P. debilis.* Pers. l. c. Schwache Pogonie. In Neuholl. Jun. Jul. Ch. ♄.
Andrewsia debilis. Vent. jard. de la Malmais. 2. p. et t. 108.

2. *P. glabra.* Andrews bot. reposit. t. 283. Glatte Pogonie. In Neuholl. Apr. Ch. ♄.
Andrewsia glabra Vent. l. c.

158. Ardisia, Ardisie.

1. *A. coriacea.* Pers. l. c. Lederartige Ardisie. Auf den Antillen. —. W. H. ♄.

2. *A. crenulata.* Pers. l. c. 1. p. 233. Feingekerbte Ardisie. Auf den Antillen. —. W. H. ♄.

159. Myrsine, Myrsine.

1. *M. africana.* Pers. l. c. Africanische Myrsine. Am Cap u. in Aethiop. Jun. Jul. Ch. ♄.

2. *M. retusa.* Pers. l. c. Zurückgebogene Myrsine. Auf den Azorisch. Inseln. Jun. Jul. Ch. ♄.

160. Leea, Leea.

1. *L. crispa.* Pers. l. c. Krause Leea. Am Cap. —. Ch. 4.

161. Jacquinia, Jacquinie.

2. *J. arborea.* Pers. l. c. 1. p. 234. Baumartige Jacquinie. Auf der Insel Montserrat. —. W. H. ♄.

2. *J. aristata.* Jacq. fragm. bot. p. 64. t. 95. f. 2. Gegrannte Jacquinie. In Westind. Jul. Aug. u. Nov. Dec. W. H. ♄.

3. *J. revoluta.* Jacq. l. c. p. 64. t. 95. f. 1. Zurückgerollte Jacquinie. Zu Caracas. —. W. H. ♄.

162. Sickingia, Sickingie.

1. *S. Erythroxylon.* Pers. l. c. Rothholzige Sickingie. Auf waldigen Bergen zu Caracas. —. W. H. ♄.

163. Chrysophyllum, Goldblatt.

1. *Ch. Cainito.* Pers. l. c. 1. p. 236. Cainito-Goldblatt. Auf Martinique. May, Jun. W. H. ♄.

2. *Ch. argenteum.* Pers. l. c. Silberfarbiges Goldblatt. Auf Martinique. —. W. H. ♄.

3. *Ch. glabrum.* Pers. l. c. Glattes Goldblatt. In Wäldern zu Martinique. —. W. H. ♄.

164. Sideroxylon, Eisenholz.

1. *S. inerme.* Pers. l. c. Dornenloses Eisenholz. In Aethiop. Jul. — Sept. W. H. ♄.

165. Bumelia, Hochstamm.

1. *B. salicifolia.* Pers. l. c. 1. p. 237. Weidenblättriger Hochstamm. Auf trockenen Hügeln in Jamaica, St. Crux u. den Bahamainseln. Jun. Jul. W. H. ♄.
Sideroxylon Mastichodendron. Jacq. collect. 2. p. 253. t. 17. f. 5.

2. *B. lycioides.* Pers. l. c. Bocksdornartiger Hochstamm. In Canada u. Carolina. Jul. Aug. K. H. ♄.
Sideroxylon lycioides. Duham. arb. 2. p. 260. t. 68.

3. *B. tenax.* Pers. l. c. Zäher Hochstamm. An Meereshecken in Carolina. Sept. Oct. K. H. ♄.
Sideroxylon tenax. Lin. mant. 48.

166. Scleroxylon, Schwerholz.

1. *Sc. mite.* Willd. enum. 1. p. 249. Wehrloses Schwerholz. Am Cap. —. Ch. ♄.
Manglilla Milleriana. Pers. l. c.
Sideroxylon mite. Lin. syst. veg. 193.

2. *S. melanophleum.* Willd. enum. l. c. Schwarzrindiges Schwerholz. Am Cap. Aug. Sept. Ch. ♄.
Manglilla melanophleos. Pers. l. c.
Sideroxylon melanophleum. Lin. mant. 48.

167. Rhamnus, Wegdorn.

1. *Rh. catharticus.* Pers. l. c. 1. p. 238. Gemeiner Wegdorn. In Wäldern v. Eur. Jun. Jul. Im F. ♄.

2. *R. saxatilis.* Pers. l. c. Stein-Wegdorn. Auf Bergen in Oesterr. Ungarn, Siebenbürg. Deutschl. Ital. u. der Schweiz. May. Im F. ♄.

3. *R. Frangula.* Pers. l. c. 1. p. 239. Glatter Wegdorn. (Pulverholz). In feuchten Hainen von Eur. Jun. Jul. Im F. ♄.

4. *R. hybridus.* Pers. l. c. Bastard-Wegdorn. Kömmt nur in Gärten vor. Jun. Jul. Im F. ♄.

5. *R. Alaternus.* Pers. l. c. Immergrüner Wegdorn. In Südeur. May, Jun. Im F. ♄.
β. foliis luteo varieg. Mit gelbgefleckten Blätt.
γ. — albo — . — weifsgefleckten —.

168. Zizyphus, Judendorn.

1. *Z. Ignaneus.* Lam. encycl. 3. p. 318. Eidechsen-Wegdorn. Auf den Antill. u. zu Curassao. —. W. H. ♄.
Rh. Ignaneus. Pers. l. c. 1. p. 240.

2. *Z. vulgaris.* Willd. sp. pl. 1. p. 1105. Gemeiner Judendorn. In Südeur. May, Jun. Im F. ♄.
Rh. Zizyphus. Pers. l. c.

3. *Z. volubilis.* Willd. arb. 415. Windender Judendorn. In Carolina. Jun. — Aug. K. H. ♄.
Rh. volubilis. Pers. l. c.

4. *Z. Paliurus.* Willd. l. c. Geflügelter Judendorn. In Südeur. u. im Orient. Jun. Jul. K. H. ♄.
Rh. Paliurus. Pers. l. c. 1. p. 241.

169. Condalia, Condalie.

1. *C. microphylla.* Pers. l. c. Kleinblättrige Condalie. Zu Chili —. Ch. ♄.

170. Elaeodendrum, Oelstrauch.

1. *E. orientale.* Pers. l. c. Orientalischer

Oelstrauch. Auf der St. Moritzinsel. —. W. H. ♄.

171. Celastrus, Celaster.

1. *C. scandens.* Pers. l. c. 1. p. 242. Klimmender Celaster. In Canada. May, Jun. Im F. ♄.

2. *C. buxifolius.* Pers. l. c. 1. p. 243. Buchsblättriger Celaster. Am Cap u. in Aethiop. Jun. Jul. Ch. ♄.

3. *C. pyracanthus.* Pers. l. c. Birnenblättriger Celaster. Am Cap u. in Aethiop. Jun. Jul. Ch. ♄.

172. Evonymus, Spindelbaum.

1. *E. japonicus.* Pers. l. c. Japanischer Spindelbaum. In Japan. Oct. Nov. Ch. ♄.

2. *E. europaeus.* Pers. l. c. Gemeiner Spindelbaum. An Hecken in Eur. May, Jun. Im F. ♄.

3. *E. verrucosus.* Pers. l. c. Warziger Spindelbaum. Auf Bergen in Oesterr. Krain u. Pohlen. Jun. Jul. Im F. ♄.

4. *E. latifolius.* Pers. l. c. Breitblättriger Spindelbaum. In Oesterr. Ungarn, Steyerm. Böhmen u. Schlesien. Jun. Jul. Im F. ♄.

5. *E. atropurpureus.* Pers. l. c. Dunkelrother Spindelbaum. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. ♄.

6. *E. americanus.* Pers. l. c. Americanischer Spindelbaum. In Virgin. u. Carol. Im F. ♄.

173. Ceanothus, Ceanothus.

1. *C. americanus.* Pers. l. c. 1. p. 244. Americanischer Ceanothus. In Virgin. u. Carol. —. K. H. ♄.

2. *C. microphyllus.* Pers. l. c. Kleinblättriger Ceanothus. In Georgien u. Florida. —. K. H. ♄.

3. *C. colubrinus.* Pers. l. c. Schlangen-Ceanothus. In Amer. May, Jun. W. H. ♄.
Rhamnus colubrinus Lin. syst. veg. 195.

4. *C. africanus.* Pers. l. c. Africanischer Ceanothus. Am Cap u. in Aethiop. Jun. Jul. Ch. ♄.

5. *C. discolor.* Venten. jardin. de la Malmaison. 1. t. 58. Zweyfarbiger Ceanothus. Auf den Südseeinseln. Aug. Ch. ♄.

174. Phylica, Phylica.

1. *Ph. ericoides.* Pers. l. c. 1. p. 245. Heidenartige Phylica. Am Cap u. in Aethiop. Jun. — Dec. Ch. ♄.

2. *Ph. bicolor.* Pers. l. c. Zweyfarbige Phylica. Am Cap. —. Ch. ♄.

3. *Ph. plumosa.* Pers. l. c. Fedrige Phylica. In Aethiop. —. Ch. ♄.

4. *Ph. buxifolia.* Pers. l. c. Buchsblättrige Phylica. Am Cap u. in Aethiop. Jän. Febr. u. Jun. Jul. Ch. ♄.

5. *Ph. paniculata.* Pers. l. c. Rispenblüthige. Phylica. Am Cap. —. May — Jul. Ch. ♄.

175. Brunia, Brunie.

1. *B. abrotanoides.* Pers. l. c. 1. p. 246. Stabwurzartige Brunie. Am Cap u. in Aethiop. Jun. Jul. Ch. ♄.

176. Diosma, Buccostrauch.

1. *D. album.* Pers. l. c. 1. p. 247. Weifser Buccostrauch. Am Cap. —. Ch. ♄.

2. *D. ericoides*, Pers. l. c. Heidenartiger Buccostrauch. In Aethiop. Nov. Dec. Ch. ♄.

3. *D. ciliatum*. Pers. l. c. Gefranzter Buccostrauch. Am Cap. Apr. May. Ch. ♄.

177. Agathosma, Agathosma.

1. *A. imbricatum*. Willd. enum. 1. p. 259. Dachziegelblättrige Agathosma. Am Cap. —. Ch. ♄. Diosma imbricatum. Pers. l. c.

178. Gouania, Gouanie.

1. *G? mauritiana*. Hort. schönbrunnens. Moritzische Gouanie. Auf der St. Moritzinsel. —. W. H. ♄.

179. Pittosporum, Klebsame.

1. *P. undulatum*. Pers. l. c. 1. p. 248. Wellenblättriger Klebsame. Auf den Canarischen Inseln. März — May. Ch. ♄.

2. *P. sinense*. Hort. paris. Chinesischer Klebsame. In China. —. Ch. ♄.

180. Cedrela, Cedrele.

1. *C. odorata*. Pers. l. c. Wohlriechende Cedrele. In Südamer. —. W. H. ♄.

181. Billardiera, Billardiere.

1. *B. scandens*. Pers. l. c. 1. p. 249. Rankende Billardiere. In Neuholl. Jän. Febr. Ch. ♄.

182. Ribes, Johannisbeere.

1. *R. rubrum*. Pers. l. c. 1. p. 251. Gemei-

ne Johannisbeere. In den nördlichen Gegenden Schwedens u. Englands. May. Im F. ♄.

2. *R. petraeum.* Pers. l. c. Rothblühende Johannisbeere. Auf den Steyerschen u. Kärnthenschen Alpen, dann auf Bergen in Schles. u. Böhmen. May. Im F. ♄.

3. *R. prostratum.* Pers. l. c. Niedergestreckte Johannisbeere. Auf der Ins. Neufundland. May. Im F. ♄.

4. *R. alpinum.* Pers. l. c. Alpen-Johannisbeere. Auf Alpen in Eur. May. Im F. ♄.

5. *R. nigrum.* Pers. l. c. Schwarze Johannisbeere. An den Ufern der Flüsse u. an Zäunen des nördlicheren Eur. u. in Nordamer. May. Im F. ♄.

6. *R. floridum.* L'Herit. stirp. nov. 1. p. 4. Pensylvanische Johannisbeere. In Pensylvan. May Im F. ♄.
R. pensylvanicum. Pers. l. c.

7. *R. Diacantha.* Pers. l. c. 1. p. 252. Zweystachlige Johannisbeere. In Davurien. May. Im F. ♄.

8. *R. Grossularia.* Pers. l. c. Stachlige Johannisbeere. In Wäldern u. Hecken v. Eur. May. Im F. ♄.

9. *R. Cynosbati.* Pers. l. c. Stachelfrüchtige Johannisbeere. In Canada. May. Im F. ♄.

183. Hedera, Epheu.

1. *H. Helix.* Pers. l. c. Gemeiner Epheu. In Eur. an alten Mauern u. Bäumen. Sept. Oct. Im F. ♄.

184. Vitis, Wein.

1. *V. vinifera.* Pers. l. c. Gemeiner Wein. Im gemäfsigten Asien. May, Jun. Im F. ♄.

2. *V. incisa.* Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 14. t. 410. Eingeschnittener Wein. In Nordamer.? May. Im F. ♄.

3. *V. Labrusca.* Pers. l. c. 1. p. 253. Filziger Wein. In Pensylvan. u. Carolina. May. Jun. Im F. ♄.

4. *V. vulpina.* Pers. l. c. Fuchs-Wein. In Virgin. May, Jun. Im F. ♄.

5. *V. laciniosa.* Pers. l. c. Petersilien-Wein. —. May, Jun. Im F. ♄.

6. *V. hederacea.* Willd. arb. 410. Epheuartiger Wein. In Canada. May. Jun. Im F. ♄.
Cissus hederacea. Pers. l. c. 1. p. 143.
Hedera quinquefolia. Lin. sp. pl. 292.

7. *V. arborea.* Lin. sp. pl. p. 294. Baumartiger Wein. In Carol. u. Virgin. May, Jun. K. H. ♄.

185. Claytonia, Claytonie.

1. *Cl. perfoliata.* Pers. l. c. Durchwachsene Claytonie. In Nordamer. u. auf Cuba. Jul. Aug. Im F. ☉.
Cl. cubensis. Humboldt et Bonpl. pl. aequin. 1. p. 91. t. 26.

186. Viola, Veilchen.

1. *V. palmata.* Pers. l. c. 1. p. 254. Handförmiges Veilchen. In Virgin. May. K. H. 4.

2. *V. odorata.* Pers. l. c. Wohlriechendes Veilchen. In Hainen v. Eur. März, Apr. Im F. 24.

β. flore pleno. Mit gefüllter Blüthe.

3. *V. montana.* Pers. l. c. Berg-Veilchen. In Oesterr. u. Deutschlands Auen. May. Im F. 24.

4. *V. lactea.* Pers. l. c. Milchweifses Veilchen. In Oesterr. u. England. May. Im F. 24.

5. *V. mirabilis.* Pers. l. c. 1. p. 255. Verschiedenblüthiges Veilchen. In Deutschl. u. Schwedens Hainen. May. Im F. 24.

6. *V. biflora.* Pers. l. c. Zweyblüthiges Veilchen. Auf Alpen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

7. *V. tricolor.* Pers. l. c. Dreyfarbiges Veilchen. Auf bebauten Stellen in Eur. May, Jun. Im F. ☉.

8. *V. rothomagensis.* Pers. l. c. Normandisches Veilchen. Auf Bergen bey Rouen in Frankr. Jun. — Aug. Im. F. 24.

187. Impatiens, Balsamine.

1. *I. Balsamina.* Pers. l. c. 1. p. 257. Gemeine Balsamine. In Ostind. Jun. — Oct. Im F. ☉.

2. *I. Nolitangere.* Pers. l. c. Wilde Balsamine. In Hainen v. Eur. u. Canada. Jun. Jul. Im F. ☉.

188. Gomphrena. Winterblume.

1. G. *globosa.* Pers. l. c. Kugelrunde Winterblume. In Ostind. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *G. brasiliensis.* Pers. l. c. Brasilische Winterblume. In Brasilien. Sept. Oct. W. H. ♄.

3. *G. interrupta.* Pers. l. c. Unterbrochenährige Winterblume. In Jamaica u. Hispaniola. Jul. Aug. W. H. ☉.

189. Achyranthes, Spreublume.

1. *A. argentea.* Pers. l. c. 1. p. 258. Weifsliche Spreublume. In Sicil. u. am Cap. May — Jul. Ch. 2|.

2. *A. fruticosa.* Pers. l. c. Strauchartige Spreublume. In Ostind. May, Jun. W. H. ♄.

3. *A. lappacea.* Pers. l. c. Klettenartige Spreublume. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♄.

4. *A. porrigens.* Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 54. t. 350. Ausgebreitete Spreublume. In Peru. Jun. — Oct. W. H. ♄.

5. *A. axillaris.* Hornemann. Achselblüthige Spreublume. —. Apr. — Aug. W. H. ♄.

190. Celosia, Hahnenkamm.

1. *C. cristata.* Pers. l. c. Gemeiner Hahnenkamm. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☉.

2. *C. coccinea.* Pers. l. c. 1. p. 260. Scharlachrother Hahnenkamm. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☉.

3. *C. virgata.* Pers. l. c. Ruthenförmiger Hahnenkamm. —. May — Oct. W. H. ♄.

191. Illecebrum, Knorpelblume.

1. *I. lanatum.* Ait. hort. kew. 1. p. 289. Wollige Knorpelblume. In Ostind. Jun, Jul. W. H. ☉.
Achyranthes lanata. Pers. l. c. 1. p. 259.

192. Buttneria, Buttnerie.

1. *B. cordata.* Pers. l. c. 1. p. 262. Herzblättrige Buttnerie. In Peru. Apr. — Oct. W. H. ♄.

193. Heliconia, Heliconie.

1. *H. Bihai.* Pers. l. c. 1. p. 263. Spitzblättrige Heliconie. Im wärmer. Amer. an feuchten Stellen. —. W. H. 24.

2. *H. humilis.* Pers. l. c. Niedrige Heliconie. Zu Caracas u. Gujana. —. W. H. 24.

3. *H. psittacorum.* Pers. l. c. Papageyen-Heliconie. In Surinam u. Jamaica. —. W. H. 24.

194. Strelitzia, Strelitzie.

1. *St. Reginae.* Pers. l. c. Prächtige Strelitzie. Am Cap. Apr. May. W. H. 24.

195. Theophrasta, Theophraste.

1. *Th. longifolia.* Pers. l. c. 1. p. 265. Langblättrige Theophraste. Zu Caracas. Jun. — Aug. W. H. ♄.

2. *Th. pinnata.* Jacq. fragm. bot. p, 49. n. 168. t. 64 — 65 — 66. f. 2. Zu Caracas. —. W. H. ♄.

196. Rauwolfia, Rauwolfie.

1. *R. canescens.* Pers. l. c. Graue Rauwolfie. In Jamaica u. den Caraib. Ins. Jun. Jul. W. H. ♄.

197. Ochrosia, Ochrosie.

1. *O. maculata.* Juss. gen. p. 144. Gefleckte Ochrosie. Auf Bourbon u. den Inseln des stillen Meeres. Jun. — Aug. W. H. ♄.
Ophioxylon Ochrosia. Pers. l. c. 1. p. 266.

198. Arduina, Arduine.

1. *A. bispinosa.* Mill. ic. t. 300. Zweystachlige Arduine. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄. Carissa Arduina. Pers. l. c.

199. Cerbera, Schellenbaum.

1. *C. Manghas.* Pers. l. c. Ostindischer Schellenbaum. In Ostind. am Wasser. —. W. H. ♄.

200. Allamanda, Allamanda.

1. *A. cathartica.* Pers. l. c. 1. p. 524. Purgirende Allamanda. An Flüssen zu Gujana u. Surinam. W. H. ♄.

201. Vinca, Sinngrün.

1. *V. minor.* Pers. l. c. 1. p. 267. Kleines Sinngrün. In Wäldern v. Deutschl. Frankr. u. Engl. Jun. Jul. Im. F. ♄.

2. *V. herbacea.* Pers. l. c. Krautartiges Sinngrün. In Ungarn. May — Aug. Im F. 4.

3. *V. major.* Pers. l. c. Grofses Sinngrün. Zu Languedoc, Span. u. in der Schweiz. Jun-Jul. Im F. ♄.

4. *V. rosea,* Pers. l. c. Rosenfarbiges Sinngrün. Zu Madagascar, Ceylon u. Java. May — Oct. W. H. ♄.

β. flore albo. Mit weifser Blüthe.

γ. — — fauce luteo. Mit weifser Blüthe u. gelben Schlunde.

202. Plumeria, Plumerie.

1. *Pl. rubra.* Pers. l. c. Rothblühende Plumerie. In Jamaica u. Surinam. Jun. W. H. ♄.

2. *Pl. alba.* Pers. l. c. Weifsblühende Plumerie. In Jamaica. —. W. H. ♄.

203. Tabernaemontana, Tabernaemontane.

1. *T. citrifolia.* Pers. l. c. 1. p. 268. Citronenblättrige Tabernämontane. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. ♄.

2. *T. coronaria.* Willd. enum. 1. p. 275. Oleanderartige Tabernämontane. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♄.
Nerium coronarium. Pers. l. c. 1. p. 269.

3. *T.* ? Von der St. Moritzinsel.

204. Nerium, Oleander.

1. *N. Oleander.* Pers. l. c. 1. p. 269. Gemeiner Oleander. An den Ufern der Flüsse in Nordafr. u. Ostind. Jun. — Sept. K. H. ♄.

β. flore pleno. Mit gefüllter Blüthe.

γ. — — flavescenti. Mit gelblichgefüllter Blüthe.

2. *N. odorum.* Pers. l. c. Wohlriechender Oleander. In Ostind. Jun. — Aug. W. H. ♄.

205. Echites, Klammerstrauch.

1. *E. succulenta.* Pers. l. c. 1. p. 271. Saftiger Klammerstrauch. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♄.

2. *E. difformis.* Walter fl. carolin. 98. Ungestalteter Klammerstrauch. In Carolina. —. K. H. ♄.

206. Periploca, Schlinge.

1. *P. graeca.* Pers. l. c. Griechische Schlinge. In Syrien u. Sibir. Jun. — Aug. Im F. ♄.

2. *P. africana.* Pers. l. c. 1. p. 272. Capische Schlinge. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.

207. Cynanchum, Hundswürger.

1. *C. viminale.* Pers. l. c. Blattloser Hundswürger. In Africa u. Ostind. —. W. H. ♄.

2. *C. crispum.* Pers. l. c, Krauser Hundswürger. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

3. *C. acutum.* Pers. l. c. 1. p. 273. Spitziger Hundswürger. In Sicil. Span. u. Astrachan. Jun. Jul. K. H. ♄.

4. *C. erectum.* Pers. l. c. Aufrechter Hundswürger. In Syrien. Jun. — Aug. K. H. ♄.

208. Apocynum, Apocynum.

1. *A. androsaemifolium.* Pers. l. c. 1. p. 274. Fliegenfangendes Apocynum. In Virgin. u. Carol. Jun. Jul. Im F. 4.

209. Asclepias, Schwalbenwurz.

1. *A. syriaca.* Pers. l. c. 1. p. 275. Syrische Schwalbenwurz. Im Orient u. Nordamer. Jul. Aug. Im F. 4.

2. *A. curassavica.* Pers. l. c. 1. p. 276. Orangefarbige Schwalbenwurz. In Curassao. Jun. — Aug. W. H. ♄.

3. *A. nivea.* Pers. l. c. Weifsblüthige Schwalbenwurz. In Virgin. u. dem wärmer. Amer. Jun. Jul. K. H. 24.

4. *A. angustifolia.* Willd. enum. suppl. p. 13. Schmalblättrige Schwalbenwurz. —. Jul. Aug. K. H. 24.

5. *A. fuscata.* Willd. l. c. Braune Schwalbenwurz. —. —. K. H. 24.

6. *A. incarnata.* Pers. l. c. Rothblühende Schwalbenwurz. In Canada u. Virgin. Jul. Aug. Im F. 24.

7. *A. fruticosa.* Pers. l. c. Strauchartige Schwalbenwurz. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

8. *A. Vincetoxicum.* Lin. sp. pl. p. 314. Gemeine Schwalbenwurz. In Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.
Cynanchum Vincetoxicum. Pers. l. c. 1. p. 274.

9. *A. nigra.* Lin. sp. pl. p. 315. Schwarze Schwalbenwurz. Auf Hügeln zu Montpellier. Jun. — Aug. Im F. 24.
Cynanch. nigrum. Pers. l. c.

10. *A. tuberosa.* Pers. l. c. 1. p. 277. Knollige Schwalbenwurz. In Carol. Jun. — Aug. K. H. 24.

210. Schollia, Schollie.

1. *Sch. craſsifolia.* Jacq. eclog. plant. fasc. 1. p. 5. t. 2. Dickblättrige Schollie. An der Meerenge von Sunda zwischen Sumatra u. Java u. in China. Jun. — Aug. W. H. ♄.
Asclepias carnosa. Pers. l. c. 1. p. 275.

211. Stapelia, Stapelie.

1. *St. glauca.* Jacq. Stap. monog. Graugrüne Stapelie. Am Cap auf sehr trocknen Stellen wie alle folgende. Jul. Aug. W. H. ♄.
St. revoluta. Pers. l. c. 1. p. 278.

2. *St. hirsuta.* Pers. l. c. Haarige Stapelie. Jul. — Sept. W. H. ♄.

3. *St. patula.* Willd enum. 1. p. 231. Abstehende Stapelie. Jul. — Sept. W. H. ♄.
St. sororia. Pers. l. c.

4. *St. sororia.* Willd. l. c. Verschwesterte Stapelie. Jul. — Sept. W. H. ♄.
St. sororia varietas. Jacq. l. c.

5. *St. grandiflora.* Pers. l. c. Grofsblühende Stapelie. Jul. Aug. W. H. ♄.

6. *St. ambigua.* Pers. l. c. Vielblüthige Stapelie. Jul. — Sept. W. H. ♄.

7. *St. maculosa.* Jacq. l. c. Fleckige Stapelie. Jul. — Sept. W. H. ♄.

8. *St. Asterias.* Pers. l. c. Sternförmige Stapelie. Jul. Aug. W. H. ♄.

9. *St. deflexa.* Jacq. l. c. Herabgebogene Stapelie. Jul. — Oct. W. H. ♄.

10. *St. bufonia.* Jacq. l. c. Krötten-Stapelie. Jul. — Sept. W. H. ♄.

11. *St. trisulca.* Jacq. l. c. Dreyfurchige Stapelie. Jul. — Sept. W. H. ♄.

12. *St. gemmiflora.* Pers. l. c. Knospenblüthige Stapelie. Jul. Aug. W. H. ♄.

13. *St. replicata.* Jacq. l. c. Zurückgebogene Stapelie. Jul. Aug. W. H. ♄.

14. *St. divaricata.* Pers. l. c. Ausgebreitete Stapelie. Aug. — Oct. W. H. ♄.

15. *St. caespitosa.* Pers. l. c. Rasen-Stapelie. Jul. Aug. W. H. ♄.

16. *St. concinna?* Pers. l. c. 1. p. 279. Zierliche Stapelie. —. W. H. ♄.

17. *St. glandulifera.* Pers. l. c. Drüsenblüthige Stapelie. Jul. Aug. W. H. ♄.

18. *St. hirtella.* Jacq. l. c. Rauhhaarige Stapelie. Jun. Jul. W. H. ♄.

19. *St. pedunculata.* Pers. l. c. Langstielige Stapelie. Jul. Aug. W. H. ♄.

20. *St. vetula.* Pers. l. c. 1. p. 280. Dunkle Stapelie. Jul. — Sept. W. H. ♄.

21. *St. planiflora.* Jacq. l. c. Flachblüthige Stapelie. Jul. Aug. W. H. ♄.

22. *St. variegata.* Pers. l. c. Bunte Stapelie. Jul. — Oct. W. H. ♄.

23. *St. reticulata.* Pers. l. c. Netzförmige Stapelie. Jul. Aug. W. H. ♄.

24. *St. marmorata.* Jacq. l. c. Marmorirte Stapelie. Aug. Sept. W. H. ♄.

25. *St. tubata.* Jacq. l. c. RöhrigeStapelie. Jul. Aug. W. H. ♄.

26. *St. clavata.* Pers. l. c. Keilenartige Stapelie. Jul. Aug. Ch. ♄.

212. Spigelia, Spigelie.

1. *Sp. marilandica.* Pers. l. c. 1. p. 281. Marilandische Spigelie. In Virgin. Mariland u. Carol. May — Jul. K. H. 24.

213. Chironia, Chironie.

1. *Ch. baccifera.* Pers. l. c. 1. p. 282. Beerentragende Chironie. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♄.

2. *Ch. frutescens.* Pers. l. c. Strauchartige Chironie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

DIGYNIA.

214. Gentiana, Entzian.

1. *G. pannonica.* Pers. l. c. 1. p. 284. Pannonischer Entzian. In Oesterr. und Steyerm. auf Alpen. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *G. asclepiadea.* Pers. l. c. Schwalbenwurzartiger Entzian. Auf Bergen in Oesterr. der Schweiz, Ital. u. Spanien. Jul. Aug. Im F. 24.

3. *G. cruciata.* Pers. l. c. Kreuz - Entzian. Auf sonnigen Hügeln in Oesterr. der Schweiz u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *G. Pneumonanthe.* Pers. l. c. Gemeiner Entzian. Auf feuchten Wiesen in Eur. u. Amer. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *G. acaulis.* Lin. sp. pl. p. 330. Stengelloser Entzian. Auf Alpen im südlichen Eur. Jun. Jul. Im F. 24.
G. grandiflora. Pers. l. c. 1. p. 285.

6. *G. verna.* Pers. l. c. Frühlings-Entzian. Auf Alpen in Oesterr. Steyerm. der Schweiz u. den Pyrenäen. May — Jul. Im F. 24.

7. *G. Amarella.* Pers. l. c. 1. p. 286. Deutscher Entzian. Auf Bergen in Eur. Jul. — Oct. Im F. ⊙.
G. germanica. Willd. sp. pl. 1. p. 1346.

8. *G. ciliata.* Pers. l. c. 1. p. 287. Gefranzter Entzian. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz, Frankr. u. Italien auf Bergen. Jul. — Oct. Im F. 24.

215. Dichondra, Zweykorn.

1. *D. sericea.* Pers. l. c. 1. p. 288. Seidenartiges Zweykorn. In Jamaica, Peru u. auf der St. Moritzinsel. Jun. — Aug. W. H. 24.

2. *D. argentea.* Humboldt et Bonpland. Silberblättriges Zweykorn. Im wärmer. Amer. —. W. H. 24.

216. Heuchera, Heuchere.

1. *H. americana.* Pers. l. c. 1. p. 290. Americanische Heuchere. In Pensylvan. u. Carol. Jun. — Aug. Im F. 24.

217. Ulmus, Rüster.

1. *U. campestris.* Pers. l. c. 1. p. 291. Gemeiner Rüster. In Eur. Apr. May. Im F. ♄.

2. *U. suberosa.* Pers. l. c. Kork-Rüster. In Eur. Apr. May. Im F. ♄.

3. *U. effusa.* Pers. l. c. Langstieliger Rüster. In Eur. Apr. May. Im F. ♄.

4. *U. americana.* Pers. l. c. Americanischer Rüster. In Nordamer. Apr. Im F. ♄.

5. *U. parvifolia.* Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 6. t. 262. Kleinblättriger Rüster. Am Caspischen Meere. Sept. Oct. K. H. ♄.
Planera Richardi. Pers. l. c.

218. Planera, Planere.

1. *Pl. aquatica.* Pers. l. c. Wasserliebende Planere. An den Ufern der Flüsse Ohio u. Missisipi. Apr. May. Im F. ♄.

219. Celtis, Zürgelbaum.

1. *C. australis.* Pers. l. c. Gemeiner Zürgelbaum. In Südeur. dem Banat u. Nordafr. May. K. H. ♄.

2. *C. occidentalis.* Pers. l. c. 1. p. 292. Americanischer Zürgelbaum. In Virgin. u. Pensylvan. May, Jun. Im. F. ♄.

3. *C. Tournefortii.* Pers. l. c. Tournefortischer Zürgelbaum. In Armenien. —. K. H. ♄.

4. Eine noch unbeschriebene Art aus Luisiana.

220. Atriplex, Melde.

1. *A. Halimus.* Pers. l. c. Strauchartige Melde. Am Meerstrande in Span. Portug. England, der Barbarey u. Sibir. Jun. Jul. K. H. ♄.

2. *A. odorata.* Pers. l. c. 1. p. 293. Wohlriechende Melde. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.
A. albicans. Ait hort. kew. 3. p. 430.

3. *A portulacoides.* Pers. l. c. Portalak-Melde. An den Europ. Meeresküsten. Jun. Jul. K. H. ♄.

221. Chenopodium, Gaensefufs.

1. *Ch. Botrys.* Pers. l. c. 1. p. 294. Eichenblättriger Gänsefufs. In Südeur. Jun. — Aug. Im F. ☉.

2. *Ch. suffruticosum.* Willd. enum. 1. p. 290. Staudenartiger Gänsefufs. In Mexico u. Pensylvan. Jul. Aug. K. H. ♄.

3. *Ch. pauciflorum.* Von Portenschlag Ledermeyr. Armblühender Gänsefufs. —. May — Jul. K. H. ♄.

4. *Ch. scoparium.* Pers. l. c. 1. p. 295. Besenartiger Gänsefufs. In Krain, Griechenland, China, u. Japan. Aug. Im F. ☉.

222. Beta, Mangold.

1. *B. trygina.* Pers. l. c. Dreyweibiger Mangold. In Syrmien u. im Banat. Jun. Im F. ♃.

223. Salsola, Salzkraut.

1. *S. Kali.* Pers. l. c. Gemeines Salzkraut. An den Meeresküsten v. Eur. Jun. — Jul. Im F. ☉.

2. *S. Soda.* Pers. l. c. Glattes Salzkraut. (Sode). Auf salzigem Boden in Südeur. Jun. Jul. Im. F. ☉.

3. *S. sericea.* Ait. hort. kew. 1. p. 317. Seidenartiges Salzkraut. Am Cap. —. Ch. ♄.
S. diffusa. Pers. l. c. 1. p. 296.
Chenolea diffussa. Thunb. nov. gen. p. 10.

4. *S. fruticosa.* Pers. l. c. Strauchartiges Salzkraut. Am Meerstrande in Südeur. Jun. Jul. K. H. ♄.

224. Anredera, Anredere.

1. *A. spicata.* Pers. l. c. 1. p. 297. Aehrentragende Anredere. In Peru. Jun. Jul. W. H. 2. Basella vesicaria. Lamark encycl. 1. p. 382.

225. Bosea, Goldruthenbaum.

1. *B. Yervamora.* Pers. l. c. Canarischer Goldruthenbaum. Auf den Canarisch. Ins. —. Ch. ♄.

226. Phyllis, Phyllis.

1. *Ph. Nobla.* Pers. l. c. 1. p. 298. Schöne Phyllis. Auf den Canarischen Ins. Jun. Jul. Ch. ♄.

227. Panax, Kraftwurz.

1. *P. aculeatum.* Ait. hort. kew. 3. p. 448. Stachlige Kraftwurz. In China. Jun. Jul. Ch. ♄.

228. Cussonia, Cussonie.

1. *C. thyrsiflora.* Lin. suppl. 182. Keilblättrige Cussonie. Am Cap. Jul. Ch. ♄.
C. thyrsoidea. Per. l. c.

229. Eryngium, Mannstreu.

1. *E. Bourgati.* Pers. l. c. 1. p. 299. Weifsstachlige Mannstreu. In Südfrankr. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 2.

2. *E. planum.* Pers. l. c. Flachblättrige Mannstreu. In Oesterr. Südfrankr. Pohlen u. Rufsland. Jun. Jul. Im F. 2.

230. Astrantia, Astrantie.

1. *A. Epipactis.* Pers. l. c. 1. p. 304. Grüne Astrantie. Auf waldigen Bergen in Innerösterr. Ungarn u. Croatien. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *A. major.* Pers. l. c. Grosse Astrantie. Auf südeurop. Bergen. Jun. — Aug. Im F. 24.

3. *A. minor.* Pers. l. c. Kleine Astrantie. Auf den Kärnthnerischen, den Schweizeralpen u. den Pyrenäen. Jun. — Aug. Im F. 24.

231. Bupleurum, Hasenöhrlein.

1. *B. falcatum.* Pers. l. c. Sichelblättriges Hasenöhrlein. Auf Kalkhügeln in Deutschl. u. der Schweiz. Jun. — Aug. Im F. 24.

2. *B. fruticosum.* Pers. l. c. 1. p. 305. Strauchartiges Hasenöhrlein. In Südfrankr. u. im Orient. Jun. — Aug. K. H. ♄.

3. *B. difforme.* Pers. l. c. Zweyförmiges Hasenöhrlein. Am Cap. Sept. Oct. Ch. ♄.

232. Caucalis, Haftdolde.

1. *C. pulcherrima.* Willd. enum. 1. p. 303. Schönste Haftdolde. Am Caucasus u. in Iberien. Jun. Im F. ♂.
Caucalis orientalis. Pers. l. c. 1. p. 306.

233. Conium, Schierling.

1. *C. maculatum.* Pers. l. c. 1. p. 308. Gefleckter Schierling. In Eur. Jun. Jul. Im F. ♂.

234. Athamanta, Hirschwurz.

1. *A. cretensis.* Pers. l. c. 1. p. 310. Gebirgs-Hirschswurz. In Oesterr. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.

235. Crithmum, Bacille.

1. *C. maritimum.* Pers. l. c. 1. p. 311. See-Bacille. Am Meerstrande. In Eur. Jun. Jul. K. H. ♄.

236. Ferula, Seckenkraut.

1. *F. glauca.* Pers. l. c. Graugrünes Seckenkraut. In Sicil. u. Ital. Jul. K. H. 24.

237. Laserpitium, Laserkraut.

1. *L. aquilegifolium.* Pers. l. c. 1. p. 312. Ackeleyblättriges Laserkraut. Auf steinigen Hügeln in Oesterr. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *L. hispidum.* Bieberst. fl. taurico-caucasica 1. p. 221. Borstiges Laserkraut. Am Caucasus. Jun. Jul. Im F. 24.

238. Heracleum, Heilkraut.

1. *H. angustifolium.* Pers. l. c. 1. p. 314. Schmalblättriges Heilkraut. In Deutschl. Schwaben u. England. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *H. austriacum.* Pers. l. c. Oesterreichisches Heilkraut. Auf Alpen in Oesterr. Jul. Aug. Im F. 24.

239. Ligusticum, Liebstöckel.

1. *L. Levisticum.* Pers. l. c. Gewöhnliches Liebstöckel. Auf den Genuesischen Apenninen. Jun. Jul. Im F. 24.

240. Angelica, Engelwurz.

1. *A. Archangelica.* Pers. l. c. 1. p. 315. Garten-Engelwurz. Auf Alpen in Kärnthen, Lappl. u. den Carpathen. Jun. Jul. Im F. ♂.

2. *A. sylvestris.* Pers. l. c. Wald-Engelwurz. Im nördlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

241. Sison, Sison.

1. *S. canadense.* Lin. sp. pl. p. 363. Canadisches Sison. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 4. Chaerophyllum canadense. Pers. l. c. 1. p. 320.

242. Bubon, Bubon.

1. *B. macedonicum.* Pers. l. c. 1. p. 317. Macedonisches Bubon. In Macedon. u. Mauritan. Jun. Jul. K. H. ♂.

2. *B. Galbanum.* Pers. l. c. Galban-Bubon. Am Cap. Jun. —. Aug. Ch. ♄.

3. *B. laevigatum.* Pers. l. c. Glattes Bubon. Am Cap. —. Ch. ♄.

243. Aethusa, Gleifs.

1. *Ae. Meum.* Lin. syst. veg. p. 237. Bärwurz-Gleifs. Auf Alpenwiesen in Deutschl. der Schweiz, Ital. u. Spanien. May, Jun. Im F. 4. Meum Athamanta. Pers. l. c. 1. p. 319.

244. Scandix, Kerbel.

1. *Sc. Cerefolium.* Lin. sp. pl. p. 368. Gemeiner Kerbel. Im südlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. ☉. Chaerophyllum sativum. Pers. l. c. 1. p. 320.

245. Chaerophyllum, Kälberkropf.

1. *Ch. aromaticum.* Pers. l. c. Gewürzhafter Kälberkropf. In Oesterr. der Lausitz, Meissen u. Schlesien. Jul. Aug. Im F. 2.

246. Imperatoria, Meisterwurz.

1. *J. Ostruthium.* Pers. l. c. 1. p. 321. Gemeine Meisterwurz. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz u. zu Auvergne in Frankr. Jun. Jul. Im F. 2.

247. Pastinaca, Pastinak.

1. *P. sativa.* Pers. l. c. 1. p. 322. Gemeiner Pastinak. Auf Wiesen im südlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. ♂.

2. *P. Opopanax.* Pers. l. c. Gummiger Pastinak. In Ital. u. Sicil. Jun. Jul. Im F. 2.

248. Smyrnium, Smyrnium.

1. *S. perfoliatum.* Pers. l. c. Durchwachsenes Smyrnium. In Ungarn auf dem Kobelberge an der March, Ital. Candien u. Span. May, Jun. Im F. ♂.

2. *S. aureum.* Pers. l. c. Goldfarbiges Smyrnium. Auf Bergen in Carol. —. Im F. 2.

3. *S. integerrimum.* Pers. l. c. Ganzblättriges Smyrnium. In Virgin. Jun. Im F. 2.

249. Anethum, Dill.

1. *A. graveolens.* Pers. l. c. 1. p. 323. Gemeiner Dill. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *A. Foeniculum.* Pers. l. c. Fenchel-Dill. Auf Felsen zu Languedoc, Gasconien u. Madera. Jun. Jul. Im F. 4.

250. Carum, Kümmel.

1. *C. Carvi.* Pers. l. c. Gemeiner Kümmel. Auf Wiesen im nördlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. ♂.

251. Apium, Eppich.

1. *A. Petroselinum.* Pers. l. c. 1. p. 324. Petersilien-Eppich. In Sardinien an Quellen. Jun. Jul. Im F. ♂.

2. *A. graveolens.* Pers. l. c. Sellerie-Eppich. Auf feuchtem salzigen Boden in Eur. Jul. Aug. Im F. ♂.

252. Aegopodium, Giersch.

1. *A. Podagraria.* Pers. l. c. Gemeiner Giersch. An Zäunen in Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

TRIGYNIA.

253. Rhus, Sumach.

1. *Rh. Coriaria.* Pers. l. c. Gerber-Sumach. In Südeur. Dalmatien, Syrien u. Palästina. Jun. Jul. K. H. ♄.

2. *Rh. typhinum.* Pers. l. c. Virginischer Sumach. (Essigbaum). In Virgin. Jun. Jul. Im F. ♄.

3. *Rh. glabrum.* Pers. l. c. Glatter Sumach. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. ♄.

4. *Rh. Vernix.* Pers l. c. Firnifs-Sumach. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. ♄.

5. *Rh. succedaneum.* Pers. l. c. Japanischer Sumach. In Japan u. China. Jun. Jul. Ch. ♄.

6. *Rh. Copallinum.* Pers. l. c. Copall-Sumach. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. ♄.

7. *Rh. radicans.* Pers. l. c. 1. p. 325. Wurzelnder Sumach. In Virgin. u. Canada. Jun. Jul. Im F. ♄.

β. Toxicodendrum. Mit buchtigen Blättern.

8. *Rh. suaveolens.* Pers. l. c. Wohlriechende? Sumach. In Nordamer. —. K. H. ♄.

9. *Rh. tomentosum.* Pers. l. c. Filziger Sumach. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

10. *Rh. villosum.* Pers. l. c. Haariger Sumach. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.

11. *Rh. atomarium.* Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 51. t. 343. Kleingetupfter Sumach. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♄.

12. *Rh. viminale.* Pers. l. c. Weidenblättriger Sumach. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.

13. *Rh. pendulinum.* Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 24. t. 449. Hängender Sumach. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♄.

14. *Rh. Thezera.* Pers. l. c. Fünfblättriger Sumach. In Sicil. u. der Barbarey. —. K. H. ♄.

15. *Rh. Oxyacanthoides.* Pers. l. c. Weifsdornartiger Sumach. In Africa. —. Ch. ♄.

16. *Rh. laevigatum.* Pers. l. c. 1. p. 326. Unbehaarter Sumach. Am Cap. Sept. Oct. Ch. ♄. Rh. elongata. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 52. t. 345.

17. *Rh. lucidum.* Pers. l. c. Glänzender Sumach. Am Cap u. in Mexico. Jun. Jul. Ch. ♄.

18. *Rh. undulatum.* Pers. l. c. Weilenblättriger Sumach. Am Cap. Jul. — Sept. Ch. ♄.

19. *Rh. Cotinus.* Pers. l. c. Perücken-Sumach. In Oesterr. Ungarn., Südeur. u. Sibir. Jun. Jul. Im F. ♄.

20.)
21.) Drey noch unbeschriebene Arten vom Cap.
22.)

254. Viburnum, Schneeball.

1. *V. Tinus.* Pers. l. c. Lorbeerartiger Schneeball. In Portug. Span. Ital. u. der Barbarey. Jul. Aug. K. H. ♄.

β. lucidum. Ait. hort. kew. p. 370. Mit glänzenden Blättern.
Viburn. lucidum. Pers. l. c.

2. *V. rugosum.* Pers. l. c. Runzliger Schneeball. Auf den Canarischen Ins. —. Ch. ♄.

β. strictum. Hortulan. Mit geradelienigen Aesten.

3. *V. prunifolium.* Pers. l. c. Pflaumenblättriger Schneeball. In Virgin. u. Canada. Jun. Jul. Im F. ♄.

4. *V. dentatum.* Pers. l. c. Gezähnter Schneeball. In Pensylvan. Virgin. u. Carolina. Jun. Jul. Im F. ♄.

5. *V. Lantana.* Pers. l. c. 1. p. 327. Wolliger Schneeball. (Schlingbaum). In Wäldern v. Eur. Jun. Jul. Im F. ♄.

6. *V. Opulus.* Pers. l. c. Gemeiner Schneeball. In Wäldern v. Eur. Jun. Jul. Im F. ♄.

β. roseum Mit durchgehends unfruchtbar. Blüthen.

γ. foliis variegatis. Mit gestreiften Blättern.

7. *V. Lentago.* Pers. l. c. Birnenblättriger Schneeball. In Canada. Jun. Jul. Im F. ♄.

8. *V. cassinoides.* Pers. l. c. Dickblättriger Schneeball. In Nordamer. Jun. Jul. K. H. ♄.

9. *V. punicaefolium.* Catalog. hort. carlsru. han. p. 280. Granatapfelartiger Schneeball. In Nordamer. —. K. H. ♄.

255. Cassine, Cassine.

1. *C. capensis.* Pers. l. c. Capische Cassine. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♄.

2. *C. Maurocenia.* Pers. l. c. Lederblättrige Cassine. Am Cap u. in Aethiop. Jun. Jul. Ch. ♄.

256. Sambucus, Hollunder.

1. *S. Ebulus.* Pers. l. c. 1. p. 328. Zwerg-Hollunder. Attich. Im südlicher. Eur. u. der Barbarey. Jun. Jul. Im F. 2.

2. *S. nigra.* Pers. l. c. Gemeiner Hollunder. In Eur. u. Japan. Jun. Jul. Im F. ♄.

β. foliis variegatis. Mit gestreiften Blättern.

γ. — laciniatis. Mit zerschlitzten Blättern.

3. *S. canadensis.* Pers. l. c. Canadischer Hollunder. In Canada u. Carol. Jun. Jul. Im F. ♄.

4. *S. racemosa.* Pers. l. c. Trauben-Hollunder. Auf waldigen Bergen in Südeur. Jun. Jul. Im F. ♄.

257. Staphylea, Pimpernufs.

1. *St. pinnata.* Pers. l. c. Gemeine Pimpernufs. Im südlicher. Eur. May, Jun. Im F. ♄.

2. *St. trifolia.* Pers. l. c. Virginische Pimpernufs. In Virgin. Jun. Jul. Im F. ♄.

258. Tamarix, Tamariske.

1. *T. gallica.* Pers. l. c. Französische Tamariske. In Südeur. u. Nordasien. Aug. — Oct. Im F. ♄.

2. *T. germanica.* Pers. l. c. Deutsche Tamariske. An Ufern der Flüsse in Deutschl. Jun. Jul. Im F. ♄.

259. Turnera, Turnere.

1. *T. ulmifolia.* Pers. l. c. 1. p. 329. Rüsterblättrige Turnere. In Jamaica u. anderen Gegenden des wärmeren Amer. Jun. — Aug. W. H. ♄.

260. Modecca, Modecca.

1. *M. lobata.* Jacq. fragm. bot. p. 82. n. 255. t. 131. Lappige Modecca. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♄.

261. Basella, Beerblume.

1. *B. rubra.* Pers. l. c. 1. p. 331. Rothe Beerblume. In Ostind. Jun. W. H. ☉.

2. *B. alba.* Pers. l. c. Weifse Beerblume. In China u. Amboina. Jun. W. H. ☉.

3. *B. cordifolia.* Pers. l. c. Herzblättrige Beerblume. In Ostind. Jun. W. H. ☉.

262. Portulacaria, Portulacbaum.

1. *P. afra.* Pers. l. c. Africanischer Portulacbaum. In Africa. — . Ch. ♄.
Claytonia Portulacaria. Lin. mant. 211.

TETRAGYNIA.

463. Parnassia, Parnassie.

1. *P. palustris.* Pers. l. c. Weifse Parnassie. An sumpfigen Stellen in Eur. Sept. Oct. Im F. 4.

PENTAGYNIA.

264. Aralia, Aralie.

1. *A. arborea.* Pers. l. c. Baumartige Aralie. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. ♄.

2. *A. capitata.* Pers. l. c. Kopfblüthige Aralie. Auf Bergen zu Jamaica u. den Antill. Jul. W. H. ♄.

3. *A. spinosa.* Pers. l. c. 1. p. 330. Stachlige Aralie. In Virgin. u. Carol. Aug. Im F. ♄.

4. *A. racemosa.* Pers. l. c. Traubige Aralie. In Canada. Jul. Aug. Im F. 4.

265. Armeria, Grasnelke.

1. *A. vulgaris.* Willd. enum. 1. p. 333. Gemeine Armerie. Auf sandigem Boden in Eur. Jun — Aug. Im F. 4.
Statice Armeria. Pers. l. c.

2. *A. denticulata.* Bertoloni cent. pl. sicul. p. 4. Gezähnelte Grasnelke. In Ital. u. Sicilien. Jun. Jul. K. H. 4.

3. *A. fasciculata.* Willd. l. c. 1. p. 334. Buschige Grasnelke. Zu Corsica u. Portug. Jun. — Aug. K. H. ♄.
St. fasciculata. Pers. l. c.

4. *A. plantaginea.* Willd. l. c. Wegetrittartige Grasnelke. In Südeur. Jun. Jul. Im F. 4.

5. *A. latifolia.* Willd. l. c. Breitblättrige Grasnelke. In Südeur. Jun. Jul. Im F. 4.
Statice cephalotes. Pers. l. c.

266. tatice, Statice.

1. *St. Limonium.* Pers. l. c. 1. p. 333. Meerstrands-Statice. Am Meerstrande in Eur. u. Virgin. Jun. — Aug. Im F. 4.

2. *St. Gmelini.* Pers. l. c. Gmelinsche Statice. In Ungarn u. Sibir. Jun. — Aug. Im F. 4.

3. *St. scoparia.* Pers. l. c. Besen-Statice. In Sibir. Jun. — Aug. Im F. 4.

4. *St. spathulata.* Pers. l. c. Spatelblättrige Statice. Zu Montpellier u. in der Barbarey. Jun. — Aug. K. H. 4.

5. *St. virgata.* Willd. enum. 1. p. 336. Ruthenförmige Statice. In Spanien. Jun. Jul. K. H. 4.

6. *St. tatarica.* Pers. l. c. Tartarische Statice. In der Tartarey. Jun. — Aug. Im F. 4.

7. *St. purpurata.* Pers. l. c. 1. p. 334. Purpurfarbige Statice. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 4.

8. *St. monopetala.* Pers. l. c. Dickblättrige Statice. In Sicil. Jun. — Aug. K. H. ♄.
β maior, foliis latioribus. Mit stärkerem Wuchse und breiteren Blättern.

9. *St. sinuata.* Pers. l. c. Leyerblättrige Statice. In Sicil. Palästina u. Africa. Jun. — Aug. K. H. 4.

10. *St. mucronata.* Pers. l. c. Krausblättrige Statice. In der Barbarey. Jun. — Aug. K. H. ♄.

267. Linum, Flachs.

1. *L. perenne.* Pers. l. c. Ausdauernder Flachs. In Sibir. Jun. Jul. Im F. 4.

2. *L. tenuifolium.* Pers. l. c. 1. p. 335. Feinblättriger Flachs. Auf dürren Hügeln in Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

3. *L. maritimum.* Pers. l. c. Meerstrands-Flachs. In Oesterr. bey Baden, zu Montpellier, im Orient u. in Italien. Jul. Aug. Im F. 4.

4. *L. austriacum.* Pers. l. c. Oesterreichischer Flachs. In Oesterr. Jun. Jul. Im F. ♂.

5. *L. flavum.* Pers. l. c. 1. p. 336. Gelber Flachs. In Oesterr. Deutschl. u. Rufsland. Jun. — Aug. Im F. 4.

6. *L. trigynum.* Smith. exotic. bot. 1. p. 31. t. 17. Dreystieliger Flachs. In Ostindien. Jun. Jul. W. H. ♄.

268. Crassula, Dickblatt.

1. *Cr. coccinea.* Lin. sp. pl. p. 404. Scharlachrothes Dickblatt. Ist wie die meisten folgenden am Cap u. in Aethiop. zu Hause. Jun. Jul. Ch. ♄.
Larochea coccinea. Pers. l. c. 1. p. 337.

2. *Cr. dejecta.* Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 16 t. 433. Liegendes Dickblatt. Jul. — Sept. Ch. ♄.

3. *Cr. alba.* Hort. carlsruhan. Weifses Dickblatt. —. —. Ch. ♄.

4. *Cr. falcata.* Wendl. obs. 44. Sichelblättriges Dickblatt. Jul. — Sept. Ch. ♄.
Larochea falcata. Pers. l. c.
β. major. Mit stärkerem Wuchse.

5. *Cr. perfoliata.* Pers. l. c. 1. p. 338. Durchwachsenes Dickblatt. Jun. Jul. Ch. ♄.

6. *Cr. perforata.* Pers. l. c. Durchstochenes Dickblatt. Jun. Jul. Ch. ♄.
Cr. perfofsa. Decand. pl. succ. t. 25.
Cr. perfilata. Scop. del. fl. et faun. insub. 3. p. 12. t. 6.

7. *Cr. mollis.* Pers. l. c. Weiches Dickblatt. Jun. Jul. Ch. ♄.

8. *Cr. tetragona.* Pers. l. c. Viereckiges Dickblatt. Jun. Jul. Ch. ♄.

9. *Cr. imbricata.* Pers. l. c. Schuppenblättriges Dickblatt. Jun. Jul. Ch. ♄.

10. *Cr. obvallata.* Pers. l. c. Messerrücken förmiges Dickblatt. Jun. Jul. Ch. ♄.

11. *Cr. capitata.* Dum. Cours. botaniste cultivateur 5. p. 272. Kopfförmiges Dickblatt. —. Ch. ♄.

12. *Cr. cultrata.* Pers. l. c. Messerförmiges Dickblatt. Jun. Jul. Ch. ♄.

13. *Cr. portulacacea.* Pers. l. c. Portulacartiges Dickblatt. Jän. Febr. Ch. ♄.

14. *Cr. spathulata.* Pers l. c. Spatelblättriges Dickblatt. May — Aug. Ch. ♄.

15. *Cr. marginalis.* Pers. l. c. Punktirtrandiges Dickblatt. May — Decemb. Ch. ♄.

16. *Cr. cordata.* Pers. l. c. Herzblättriges Dickblatt. Jun. Jul. Ch. ♄.

17. *Cr. lactea.* Pers. l. c. Milchfarbiges Dickblatt. Jän. — März. Ch. ♄.

18. *Cr. arborescens.* Pers. l. c. Baumartiges Dickblatt. Jun. Jul Ch. ♄.
C. Cotyledon. Jacq. misc. 2. p. 295. t. 19.

19. *Cr. acutifolia.* Pers. l. c. 1. p. 339. Spitzblättriges Dickblatt. —. —. Ch. ♄.

20. *Cr. orbicularis.* Pers. l. c. 1. p. 340. Sternblättriges Dickblatt. Jul. Aug. Ch. 2.

21. *Cr. pellucida.* Pers. l. c. Durchscheinendes Dickblatt. Jul. Aug. Ch. 2.

22. *Cr. Umbella.* Jacq. collect. 4. p. 172. Icon. pl. rar. 2 t. 352. Dolden-Dickblatt. Am Cap. Jänn. Febr. Ch. 2.

POLYGYNIA.

269. Zanthorhiza, Gelbwurz.

1. *Z. apiifolia.* Pers. l. c. 1. p. 341. Sellerieblättrige Gelbwurz. In Neugeorgien u. Carol. März, Apr. K. H. ♄.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

270. Musa, Pisang.

1. *M. paradisiaca.* Pers. l. c. 1. p. 343. Gemeiner Pisang. In Ostind. Jun. — Aug. W. H. 4.

2. *M. maculata.* Jacq. hort. schönbr. 4. p. 23. t. 446. Gefleckter Pisang. Auf der St. Moritzinsel. Jun. — Aug. W. H. 4.

3. *M. rosacea.* Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 22. t. 445. Rosenartiger Pisang. Auf der St. Moritzinsel. Novemb. — Apr. W. H. 4.

4. *M. sapientium.* Pers. l. c. Bananen-Pisang. In Ostind. Jun. — Aug. W. H. 4.

5. *M. coccinea.* Pers. l. c. Scharlachrother Pisang. In China. Jun. — Aug. W. H. 4.

271. Bromelia, Ananas.

1. *Br. Ananas.* Pers. l. c. Gemeine Ananas. Im wärmer. Amer. May, Jun. W. H. ♄.

2. *Br. Karatas.* Pers. l. c. 1. p. 344. Wilde Ananas. In Südamer. May, Jun. W. H. ♄.

3. *Br. chrysantha.* Pers. l. c. Goldfarbige Ananas. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. ♄.

4. *Br. humilis.* Pers. l. c. Niedrige Ananas. —. May, Jun. W. H. ♄.

272. Pitcairnia, Pitcairnie.

1. *P. bromeliaefolia.* Pers. l. c. Ananasblättrige Pitcairnie. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. 24.

2. *P. latifolia.* Pers. l. c. Breitblättrige Pitcairnie. In Westind. Jun. Jul. W. H. 24.

273. Tillandsia, Tillandsie.

1. *T. lingulata.* Pers. l. c. 1. p. 345. Zungenblättrige Tillandsie. In Südamerica schmarotzend auf alten Bäumen. —. W. H. ♄.

274. Tradescantia, Tradescantie.

1. *Tr. virginica.* Pers. l. c. 1. p. 346. Virginische Tradescantie. In Virgin. u. Carol. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *Tr. discolor.* Pers. l. c. 1. p. 347. Violettblättrige Tradescantie. Am Mexicanisch. Meerbusen. Jun. Jul. W. H. 24.

3. *Tr. Zanonia.* Pers. l. c. Scheidenblüthige Tradescantie. In Jamaica u. Gujana. Jun. Jul. W. H. ♄.

275. Pontederia, Pontederie.

1. *P. cordata.* Pers. l. c. 1. p. 348. Herzblättrige Pontederie. In Wässern v. Virgin. Jun. Jul. K. H. 24.

276. Haemanthus, Blutblume.

1. *H. coccineus.* Pers. l. c. Scharlachrothe Blutblume. Am Cap sammt den folgenden. Jul. Aug. Ch. 24.

2. *H. coarctatus.* Pers. l. c. Gedrängtblüthige Blutblume. Aug. Ch. 24.

3. *H. hyalocarpus.* Jacq. hort schoenbr. 4. p. 5. t. 409. Glasfrüchtige Blutblume. Am Cap. Sept. Ch. 24.

4. *H. puniceus.* Pers. l. c. Dunkelrothe Blutblume. Jul. Aug. Ch. 24.

5. *H. tigrinus.* Pers. l. c. Getiegerte Blutblume. Jun. Jul. Ch. 24.

6. *H. quadrivalvis.* Pers. l. c. Vierklappige Blutblume. Jun. Jul. Ch. 24.

7. *H. albiflos.* Pers. l. c. Weifse Blutblume. Jun. — Aug. Ch. 24.

8. *H. moschatus.* Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 6. t. 410. Bisamduftende Blutblume. Jul. Aug. Ch. 24.

277. Mafsonia, Massonie.

1. *M. latifolia.* Pers. l. c. Breitblättrige Massonie. Am Cap, wie alle folgende. Aug. Sept. Ch. 24.

2. *M. pustulata.* Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 27. t. 454. Blasige Massonie. Aug. Sept. Ch. 24.

3. *M. angustifolia.* Pers. l. c. 1. p. 349. Schmalblättrige Massonie. Aug. Sept. Ch. 24.

4. *M. longifolia.* Pers. l. c. Langblättrige Massonie. Aug. Sept. Ch. 4.

278. Galanthus, Schneeglöckchen.

1. *G. nivalis.* Pers. l. c. Gemeines Schneeglöckchen. Auf Wiesen in Österr. Deutschl. u. Ital. Febr. März. Im F. 4.

279. Leucoium, Knotenblume.

1. *L. vernum.* Pers. l. c. Frühlings-Knotenblume. In Auen von Oesterr. Deutsl. der Schweiz u. Ital. Apr. May. Im F. 4.

2. *L. aestivum.* Pers. l. c. Sommer-Knotenblume. In Oesterreich. u. Südeur. auf Sumpfwiesen. May, Jun. Im F. 4.

280. Strumaria, Kropflilie.

1. *St. linguaefolia.* Pers. l. c. Zungenblättrige Kropflilie. Am Cap. Aug. — Oct. Ch. 4.

2. *St. filifolia.* Pers. l. c. Fadenblättrige Kropflilie. Am Cap. Sept. Oct. Ch. 4.

281. Tulbagia, Tulbagie.

1. *T. alliacea.* Pers. l. c. Knoblauchartige Tulbagie. Am Cap. Aug. Sept. Ch. 4.

282. Narcissus, Narzisse.

1. *N. poëticus.* Pers. l. c. Rothrandige Narzisse. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz Ital. u. Languedoc. May, Jun. Im F. 4.

2. *N. Pseudo-Narcissus.* Pers. l. c. 1. p. 350. Gemeine Narzisse. In Deutschl. Ital. Span. Engl. u. Frankr. May, Jun. Im F. 4.

3. *N. odorus.* Pers. l. c. Wohlriechende Narzisse. In Südeur. May, Jun. Im F. 24.

4. *N. Tazetta.* Pers. l. c. Tazetten-Narzisse. Am Meerstrande in Südeur. May, Jun. Im F. 24.

5. *N. Jonquilla.* Pers. l. c. Jonquillen-Narzisse. In Span. u. im Orient. May, Jun. Im F. 24.

283. Pancratium, Gilgen.

1. *P. caribaeum.* Pers. l. 1. p. 351. Caraibische Gilgen. In Jamaica u. den Caraibisch. Ins. May — Oct. W. H. 24.

2. *P. maritimum.* Pers. l. c. Meerstrands-Gilgen. Am Meerstr. in Span. u. Südfrankr. Jun. Jul. K. H. 24.

3. *P. littorale.* Pers. l. c. Ufer-Gilgen. Auf der Insel Terrabomba im wärmeren Amer. Jul. Aug. W. H. 24.

4. *P. declinatum.* Pers. l. c. Niedergebogene Gilgen. Auf den Antillen. —. W. H. 24.

5. *P. illyricum.* Pers. l. c. Illyrische Gilgen. Am Meerstrande in Frankr. Jun. Jul. K. H. 24.

6. *P. amboinense.* Pers. l. c. Amboinische Gilgen. Auf Amboina. —. W. H. 24.

284. Crinum, Hackenlilie.

1. *Cr. asiaticum.* Pers. l. c. 1. p. 352. Asiatische Hackenlilie. In Malabar, Zeylon u. Amer. Jul. Aug. W. H. 24.

2. *Cr. americanum.* Pers. l. c. Americanische Hackenlilie. Im wärmer Amer. Jun. Jul. W. H. 24.

β. latifolium. Mit breiteren Blättern.

3. *Cr. Commelini.* Jacq. hort. schönbr. 2. p. 40. t. 202. Commelinsche Hackenlilie. Im wärmer. Amer. May — Aug. W. H. 24.

4. *Cr. bracteatum.* Pers. l. c. Beblätterte Hackenlilie. —. Aug. Sept. W. H. 24.

285. Agapanthus, Schmucklilie.

1. *A. umbellatus.* Pers. l. c. Doldenblüthige Schmucklilie. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 24.

2. *A. praecox.* Willd. enum. 1. p. 353. Frühe Schmucklilie. Am Cap. Apr. May. Ch. 24.

286. Anigosanthos, Anigosanthos.

1. *A. flavida.* Redouté pl. liliac. 3. n. 176 Gelblicher Anigosanthos. In Neuholl. Jul. Aug. Ch. 24.

287. Cyrtanthus, Bogenlilie.

1. *C. ventricosus.* Pers. l. c. Bauchige Bogenlilie. Am Cap. Dec. — Febr. Ch. 24.
C. angustifolius. Jacq. hort schoenbr. 1. p. 40. t. 76.

2. *C. obliquus.* Pers. l. c. Grofsblüthige Bogenlilie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.

288. Amaryllis, Amaryllis.

1. *A. lutea.* Pers. l. c. Gelbe Amaryllis. In Span. Ital. u. der Tartarey. Sept. Oct. Im F. 24.

2. *A. formosissima.* Pers. l. c. 1. p. 353. Schönste Amaryllis. Im wärmer. Amer. Jun. — Aug. W. H. 24.

3. *A. reginae.* Pers. l. c. Königliche Amaryllis. Auf den Caraibisch. Ins. Apr. May W. H. 24.

4. *A. Belladonna.* Pers. l. c. Westindische Amaryllis. Auf den Caraibischen Ins. u. in Surinam. Aug. Sept. W. H. 4.

5. *A. vittata.* Pers. l. c. Gebänderte Amaryllis. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 4.

6. *A. ornata.* Pers. l. c. 1. p. 354. Zierliche Amaryllis. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 4.

7. *A. longifolia.* Pers. l. c. Langblättrige Amaryllis. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 4.

8. *A. aurea.* Pers. l. c. Goldne Amaryllis. In China. Jul. Aug. Ch. 4.

9. *A. orientalis.* Pers. l. c. Orientalische. Amaryllis. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 4.

10. *A. Josephinia.* Red. plant. liliac. 7. n. 370. Josephinische Amaryllis. In Mittelafrica. Jun. Jul. W. H. 4.

11. *A. sarniensis.* Pers. l. c. Japanische Amaryllis. In Japan u. auf der Ins. Guernsey. Jul. — Sept. Ch. 4.

β. flore pallido. Mit blafsrother Blüthe.

γ. capensis. Japanische Amaryllis vom Cap.

12. *A. curvifolia.* Pers. l. c. Krummblättrige Amaryllis. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 4.

13. *A. undulata.* Pers l. c. Wellenblättrige Amaryllis. Am Cap. Jul. — Oct. Ch. 4.

14. *A. humilis.* Pers. l. c. Niedrige Amaryllis. Am Cap. Jul. — Sept. Ch. 4.

15. *A. flexuosa.* Pers. l. c. Gebogene Amaryllis. Am Cap. Sept. — Decemb. Ch. 4.

16. *A. Radula.* Pers. l. c. Raspelblättrige Amaryllis. Am Cap. Novemb. Decemb. Ch. 4.

17. *A. crispa.* Pers. l. c. 1. p. 355. Krause Amaryllis. Am Cap. Novemb. Decemb. Ch. 4.

289. Allium, Lauch.

1. *A. flavum.* Pers. l. c. 1. p. 356. Gelbes Lauch. In Oesterr. u. zu Montpellier auf Kalkgebirge. Jun. Jul. Im F. 4.

2. *A. angulosum.* Pers. l. c. 1. p. 357. Eckiges Lauch. In Deutschl. u. Sibir. an feuchten Stellen. Jul. Aug. Im F. 4.

3. *A. striatum.* Pers. l. c. Gestreiftes Lauch. Am Cap. Blüht im Herbste u. Winter. Ch. 4.

4. *A. nigrum.* Pers. l. c. Schwarzes Lauch. Im Oesterreichischen Litorale, zu Algier u. in der Provence. Jun. Jul. Im F. 4.
A. multibulbosum. Jacq. fl. austr. 1. p. 9. t. 10.

5. *A. ursinum.* Pers. l. c. Bären-Lauch. In feuchten Hainen des nördlicher. Eur. May. Im F. 4.

6. *A. clusianum.* Pers. l. c. Clusisches Lauch. In Südeur. Istrien, Dalm. May, Jun. Im F. 4.

7. *A. fistulosum.* Pers. l. c. 1. p. 358. Röhrenstieliges Lauch. —. Jun. Jul. Im F. 4.

8. *A. sibiricum.* Pers. l. c. Sibirisches Lauch. Auf den Alpen Steyermarkts u. Schlesiens. Jul. Aug. Im F. 4.

290. Bonapartea, Bonapartea.

1. B. *juncea*. Ruiz et Pavon flora peruv. 3. p. 38. t. 262. Simsenartige Bonapartea. In Peru. —. W. H. ♄.

291. Lilium, Lilie.

1. *L. candidum*. Pers. l. c. Weifse Lilie. In Palästina, Syrien u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *L. bulbiferum*. Pers. l. c. Feuer-Lilie. Im südlicher. Eur. Oesterreich u. Sibirien auf Felsen. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *L. chalcedonicum*. Pers. l. c. 1. p. 359. Chalcedonische Lilie. In Persien u. Krain. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *L. Martagon*. Pers. l. c. Gelbwurzlige Lilie. In Wäldern v. Deutschl. der Schweiz, Ungarn u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *L. tigrinum*. Ait. hort. kew. ed. 2. p. 241. Getiegerte Lilie. In China u. Japan. Jun. Jul. Ch. 24.

292. Fritillaria, Schachblume.

1. *Fr. pyrenaica*. Pers. l. c. Pyrenäische Schachblume. Auf den Pyrenäen u. in Rufsland. Jun. Im F. 24.

2. *Fr. imperialis*. Pers. l. c. Buschige Schachblume. In Persien. May — Jul. Im F. 24.

β. lutea. Mit gelben Blüthen.

293. Eucomis, Schopflilie.

1. *E. nana*. Pers. l. c. 1. p. 360. Zwerg-Schopflilie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.

2. *E. regia.* Pers. l. c. Königliche Schopflilie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 4.

3. *E. punctata.* Pers. l. c. Punktirte Schopflilie. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 4.

294. Gloriosa, Prachtlilie.

1. *Gl. superba.* Pers. l. c. Rankenblättrige Prachtlilie. Auf Malabar. Jun. Jul. W. H. 4.

295. Tulipa, Tulpe.

1. *T. sylvestris.* Pers. l. c. Wilde Tulpe. In Südeur. Sibir. u. im Orient. May, Jun. Im F. 4.

2. *T. suaveolens.* Pers. l. c. Wohlriechende Tulpe. In Südeur. May, Jun. Im F. 4.

3. *T. Gesneriana.* Pers. l. c. 1. p. 361. Gemeine Tulpe. In der Krim, am Caspischen Meere u. im Orient. Apr. May. Im F. 4,

296. Albuca, Stiftblume.

1. *A. altissima.* Pers. l. c. Höchste Stiftblume. Am Cap wie alle folgende. Jul. Aug. Ch. 4.

2. *A. major.* Pers. l. c. Grofse Stiftblume. Apr. — Jun. Ch. 4.

3. *A. setosa.* Pers. l. c. Borstige Stiftblume. Apr. May. Ch. 4.

4. *A. aurea.* Pers. l. c. Goldfarbige Stiftblume. May, Jun. Ch. 4.

5. *A. fragrans.* Pers. l. c. Wohlriechende Stiftblume. May, Jun. Ch. 4.

6. *A. viscosa.* Pers. l. c. Klebrige Stiftblume May — Jul. Ch. 4.

7. *A. spiralis.* Pers. l. c. Spiralblättrige Stiftblume. May — Jul. Ch. 4.

297. Hypoxis, Härtling,

1. H. *sobolifera.* Pers. l. c. 1. p. 363. Wuchernder Härtling. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 4.

2. *H. obliqua.* Pers. l. c. Gedrehtblättriger Härtling. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 4.

3. *H. alba.* Pers. l. c. Weifser Härtling. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 4.

4. *H. verratrifolia.* Pers. l. c. Germerblättriger Härtling. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 4.
H. plicata. Jacq. ic. rar. 2. t. 367. Collect. suppl. 55.

298. Eriospermum, Wollensame.

1. *E. latifolium.* Pers. l. c. 1. p. 363. Breitblättriger Wollensame. Am Cap. Aug. Ch. 4.

2. *E. lanuginosum.* Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 7. t. 264. Wollblättriger Wollensame. Am Cap. Aug. Ch. 4.

3. *E. lanceaefolium.* Pers. l. c. Lanzenblättriger Wollensame. Am Cap. Aug. Ch. 4.

4. *E. parvifolium.* Pers. l. c. Kleinblättriger Wollensame. Am Cap. Aug. Ch. 4.

299. Ornithogalum, Vogelmilch.

1. *O. umbellatum.* Pers. l. c. 1. p. 364. Doldenblüthige Vogelmilch. In Deutschl. Frankr. u. im Orient. May. Im F. 4.

2. *O. lacteum.* Pers. l. c. Milchweifse Vogelmilch. Am Cap. Aug. Ch. 4.

3. *O. altissimum.* Pers. l. c. Höchste Vogelmilch. Am Cap. —. Ch. 24.
O. giganteum. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 45. t. 87.

4. *O. arabicum.* Pers. l. c. 1. p. 365. Arabische Vogelmilch. Bey Alexandrien in Aegypt. u. zu Madera. —. Ch. 24.

5. *O. thyrsoides.* Pers. l. c. Straufsartige Vogelmilch. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.

6. *O. aureum.* Pers. l. c. Goldne Vogelmilch. Am Cap. Apr. May. Ch. 24.

7. *O. caudatum.* Pers. l. c. Geschwänzte Vogelmilch. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24.

8. *O. nutans.* Pers. l. c. Hängendblüthige Vogelmilch. In Deutschl. Ital. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 24.

300. Scilla, Meerzwiebel.

1. *Sc. maritima.* Pers. l. c. Gemeine Meerzwiebel. In Span. Portug. Sicilien u. Syrien. May, Jun. K. H. 24.

2. *Sc. peruviana.* Pers. l. c. 1. p. 366. Peruvianische Meerzwiebel. In Portug. u. der Barbarey. Jän. Febr. K. H. 24.

3. *Sc. amoena.* Pers. l. c. Schöne Meerzwiebel. In Oester. Deutschl. u. Rufsland. May, Jun. Im F. 24.

4. *Sc. campanulata.* Pers. l. c. Glockenblüthige Meerzwiebel. In Span. u. Portug. May, Jun. K. H. 24.

5. *Sc. bifolia.* Pers. l. c. Zweyblättrige Meerzwiebel. In Auen v. Deutschl. u. Frankr. März. Apr. Im F. 24.

301. Asphodelus, Affodil.

1. *A. luteus.* Pers. l. c. 1. p. 367. Gelber Affodil. In Sicil. u. im Orient. Jun. Im F. 24.

2. *A. fistulosus.* Pers. l. c. Röhriger Affodil. In Span. der Provence u. in Candien. May, Jun. Im F. 24.

302. Anthericum, Zaunblume.

1. *A. revolutum.* Lin. sp. pl. p. 445. Zurückgebogene Zaunblume. Am Cap. May, Jun. Ch. 24.
Phalangium revolutum. Pers. l. c. 1. p. 368.
A. divaricatum. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 7. t. 414.

2. *A. ramosum.* Lin. l. c. Aestige Zaunblume. Auf Kalkhügeln in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.
Phalang. ramosum. Pers. l. c.

3. *A. pendulum.* Hornem. catalog. hort. hafniens p. 4. Hängende Zaunblume. In Neuholl. Jun. Ch. 24.

4. *A. Liliago.* Lin. l. c. Gemeine Zaunblume. In Deutschl. der Schweiz u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 24.
Phalang. Liliago. Pers. l. c. 1. p. 369.

5. *A. pusillum.* Jacq. ic. rar. 3. t. 417. Collect. suppl. 95. Kleinste Zaunblume. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24.
Phalang. pusillum. Pers. l. c.

303. Bulbine, Bulbine.

1. *B. frutescens.* Willd. enum. 1. p. 372. Strauchartige Bulbine. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.
Antheric. frutescens. Pers. l. c.

2. *B. rostrata.* Willd. l. c. Schnabelblättrige Bulbine. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♄.
Anthe ric. rostratum. Pers. l. c.

3. *B. alooides.* Willd. l. c. Aloeblättrige Bulbine. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 2|.
Antheric. Aloides. Pers. l. c.

4. *B. longiscapa.* Willd. l. c. Langschaftige Bulbine. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.
Antheric. longiscapum. Pers. l. c.

304. Asparagus, Spargel.

1. *A. officinalis.* Pers. l. c. 1. p. 370. Gemeiner Spargel. Auf sandigem Boden in Eur. Jun. Im F. 2|.

2. *A. decumbens.* Pers. l. c. Liegender Spargel. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 2|.

3. *A. flexuosus.* Pers. l. c. Bogiger Spargel Am Cap. —. Ch. 2|.

4. *A. scandens.* Pers. l. c. Kletternder Spargel. Am Cap. —. Ch. 2|.

5. *A. falcatus.* Pers. l. c. Sichelblättriger Spargel. In Ceylon. —. Ch. ♄.

6. *A. retrofractus.* Pers. l. c. 1. p. 371. Lerchenbaumblättriger Spargel. In Africa. —. Ch. ♄.

7. *A. aethiopicus.* Pers. l. c. Aethiopischer Spargel. Am Cap. —. Ch. 2|.

8. *A. asiaticus.* Pers. l. c. Asiatischer Spargel. In Asien. —. Ch. ♄.

9. *A. capensis.* Pers l. c. Capischer Spargel. Am Cap. —. Ch. ♄.

305. Dracaena, Drachenbaum.

1. *Dr. Draco.* Pers. l. c. Gemeiner Drachenbaum. In Ostind. u. den Canarisch. Ins. —. W. H. ♄.

2. *Dr. tessellata.* Willd. enum. 1. p. 374. Gewürfelter Drachenbaum. Auf Madagascar. —. W. H. ♄.
D. marginata. Pers. l. c.

3. *Dr. umbraculifera.* Pers. l. c. Schattenreicher Drachenbaum. Das eigentliche Vaterland dieser Pflanze ist unbekannt; cultivirt findet man sie aber auf der St. Moritzinsel. Jän. Febr. W. H. ♄.

4. *Dr. terminalis.* Pers. l. c. 1. p. 372. Gränzen-Drachenbaum. In Ostind. u. China. Jän. — März. W. H. ♄.

5. *D. reflexa.* Pers. l. c. Zurückgebogener Drachenbaum. Auf der St. Moritzinsel. W. H. ♄.

6. Eine noch unbeschriebene Art von der Insel Bourbon.

306. Dianella, Dianelle.

1. *D. nemorosa.* Pers. l. c. Hain-Dianelle. In Ostind. Apr. — Sept. W. H. 4.
Dracaena ensifolia. Lin. syst. veg. 275.

2. *D. coerulea.* Willd. enum. 1. p. 375. Blaublühende Dianelle. In Mexico. März, Apr. W. H. 4.

307. Sanseviera, Sanseviere.

1. *S. guinensis.* Pers. l. c. Guineensische Sanseviere. Zu Guinea. Jun. Jul. W. H. 24.

2. *S. zeylanica.* Pers. l. c. Zeyloniche Sanseviere. In Zeylon u. Ostind. Jun. Jul. W. H. 24.

3. *S. pumila.* Decand. catal. hort. bot. monspel. p. 58. Niedrige Sanseviere. —. — W. H. 24.

308. Convallaria, Mayblümchen.

1. *C. mayalis.* Pers. l. c. Gemeines Mayblümchen. Auf waldigen Bergen im nördlicher. Eur. Apr. — Jun. Im F. 24.

2. *C. japonica.* Pers. l. c. Japanisches Mayblümchen. Japan. Jul. Aug. Ch. 24.

3. *C. Polygonatum.* Pers. l. c. 1. p. 373. Weifswurzliges Mayblümchen. In Hainen des nördlicher Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *C. multiflora.* Pers. l. c. Vielblüthiges Mayblümchen. Auf waldigen Bergen im nördlicher. Eur. u. Amer. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *C. latifolia.* Pers. l. c. Breitblättriges Mayblümchen. In Wäldern v. Österr. u. Ungarn. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *C. bifolia.* Pers. l. c. Zweyblättriges Mayblümchen. In Wäldern v. Eur. u. Nordamer. Jun. Jul. Im F. 24.

309. Polyanthes, Tuberose.

1. *P. tuberosa.* Pers. l. c. 1. p. 374. Gemeine Tuberose. In Java u. Ceylon. Aug. Sept. W. H. 24.

2. *P. pygmaea.* Pers. l. c. Zwerg-Tuberose. Am Cap. Aug. Sept. Ch. 4.

310. Drimia, Giftlilie.

1. *Dr. ciliaris.* Pers. l. c. Gefranzte Giftlilie. Am Cap. Aug. Sept. Ch. 4.

2. *Dr pusilla.* Pers. l. c. Niedrige Giftlilie. Am Cap. Aug. Sept. Ch. 4.

3. *Dr. undulata.* Pers. l. c. Wellenblättrige Giftlilie. Am Cap. Aug. Sept. Ch. 4.

4. *Dr. media.* Pers. l. c. Mittlere Giftlilie. Am Cap. Aug. Sept. Ch. 4.

311. Hyacinthus, Hyacinthe.

1. *H. non scriptus.* Pers. l. c. Englische Hyacinthe. In Engl. Frankr. Span. u. Ital. Jun. Im F. 4.

2. *H. orientalis,* Pers. l. c. 1. p. 375. Gemeine Hyacinthe. In Asien u. Africa. May, Jun. Im F. 4.

3. *H. corymbosus.* Pers. l. c. Doldentraubige Hyacinthe. Am Cap. Aug. Sept. Ch. 4.

312. Muscari, Muscathyacinthe.

1. *M. moschatum.* Willd. enum. 1. p. 378. Bisamduftende Muscathyacinthe. In Asien jenseits des Bosphorus. May, Jun. Im F. 4. Hyacinth. Muscari. Pers. l. c.

2. *M. comosum.* Willd. l. c. Schopfblüthige Muscathyacinthe. In Frankr. dem östlich. Eur. u. Persien. Jun. Jul. Im F. 4. Hyacinth. comosus. Pers. l. c.

3. *M. racemosum.* Willd. l. c. Trauben-Muscathyacinthe. In Südeur. Jun. Jul. Im F. 24. Hyacinth. racemosus. Pers. l. c.

313. Phormium, Flachslilie.

1. *Ph. tenax.* Pers. l. c. Zähe Flachslilie. In Neuseeland. —. Ch. 24.

314. Zuccagnia, Zuccagnie.

1. *Z. viridis.* Thunb. prodr. 192. Grüne Zuccagnie. Am Cap. Jul. — Sept. Ch. 24. Hyacinth. viridis. Pers. l. c.
Lachenalia ——— Ait. hort. kew. 1. p. 462.

315. Lachenalia, Lachenalie.

1. *L. glaucina.* Pers. l. c. Graugrüne Lachenalie. Am Cap mit den folgenden Arten dieser Gattung. Jun. — Aug. Ch. 24.

2. *L. pallida.* Pers. l. c. 1. p. 376. Bleiche Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.

3. *L. angustifolia.* Pers. l. c. Schmalblättrige Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.

4. *L. pusilla.* Pers. l. c. Kleinste Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.

5. *L. lanceaefolia.* Pers. l. c. Lanzenblättrige Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.

6. *L. unifolia.* Pers. l. c. Einblättrige Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.

7. *L. tricolor.* Pers. l. c. 1. p. 377. Dreyfarbige Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.
β luteola. Mit gelblicher Blüthe.

8. *L. pendula.* Pers. l. c. Hängende Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 4.

9. *L. quadricolor.* Pers. l. c. Vierfarbige Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 4.

Nebst einigen anderen noch unbeschriebenen Arten.

316. Veltheimia, Veltheimie.

1. *V. viridifolia.* Pers. l. c. Grünblättrige Veltheimie. Am Cap. Jän. — März. Ch. 4.

2. *V. glauca.* Pers. l. c. Graugrüne Veltheimie. Am Cap. Dec. — Febr. Ch. 4.

3. *V. sarmentosa.* Pers. l. c. Wurzeltreibende Veltheimie. Am Cap. Febr. März. Ch. 4. Aletris sarmentosa. Andrew. bot. reposit. p. 54. t. 54.

4. *V. Uvaria.* Pers. l. c. Traubenblüthige Veltheimie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 4. Aletris Uvaria. Lin. syst. veg. 277.

317. Aletris, Aletris.

1. *A. fragrans.* Pers. l. c. Wohlriechende Aletris. In Africa. May — Aug. W. H. ♄.

2. A? virginica. Cuius?

318. Yucca, Yucce.

1. *Y. gloriosa.* Pers. l. c. 1. p. 378. Prächtige Yucce. In Carolina. Jul. — Sept. K. H. ♄.

2. *Y. aloifolia.* Pers. l. c. Aloeblättrige Yucce. In Carolina, Florida u. Mexico. Jul. Aug. W. H. ♄.

3. *Y. Draconis.* Pers. l. c. Drachenbaumartige Yucce. Im wärmer. Amer. —. W. H. ♄.

4. *Y. filamentosa.* Pers. l. c. Fadige Yucce. In Virgin. u. Carol. —. Ch. ♄.

319. Rhipidodendrum, Fächerbaum.

1. *Rh. distichum.* Willd. im Magaz. der Gesellsch. naturf. Fr. zu Berlin. 1811. p. 5. Zweyzeiliger Fächerbaum. In Africa. Jun. — Aug. Ch. ♄.
Aloë plicatilis. Pers. l. c. 1. p. 379.

2. Eine noch unbeschriebene Art.

320. Lomatophyllum, Saumblatt.

1. *L. borbonicum.* Willd. l. c. Bourbonisches Saumblatt. Auf Bourbon. —. W. H. ♄.
Aloë marginalis. Decand. pl. succ. p. 31. t. 31.

321. Apicra, Apicre,

1. *A. arachnoides.* Willd. l. c. Weichstachlige Apicre. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.
Aloë arachnoid. Pers. l. c.

2. *A. atrovirens.* Willd. l. c. 1. p. 8. Schwarzgrüne Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 24.
Aloë atrovir. Pers. l. c.

3. *A. mirabilis.* Willd. l. c. 1. p. 9. Wunderbare Apicre. Am Cap. Aug. Ch. 24.
Aloë mirabilis. Haworth act. soc. lin. lond. 7. p. 9.

4. *A. margaritifera* β major. Willd. l. c. Grofsperlige Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 24.
Aloë margaritif. Pers. l. c.

γ. minor. Mit kleineren Perlen.

5. *A. attenuata.* Willd. l. c. p. 10. Verdünnte Apicre. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 4.
Aloë attenuata. Haw. l. c. 7. p. 11.

6. *A. radula.* Willd. l. c. Raspelblättrige Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 4.
Aloë radula. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 11. t. 422.

7. *A. retusa.* Willd. l. c. p. 11. Abgestutzte Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 4.
Aloë retusa. Pers. l. c.

8. *A. cymbaeformis.* Willd. l. c. Kahnförmige Apicre. Am Cap. May — Jul. Ch. 4.
Aloë cymbaeform. Jacq. fragm. bot. p. 72. n. 228. t. 112. f. 1.

9. *A. pumilio.* Willd. l. c. Niedrige Apicre. Am Cap. Febr. März. Ch. 4.
Aloë pumilio. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 11. t. 421.

10. *A. expansa.* Willd. l. c. p. 12. Ausgespannte Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.
Aloë expansa β major. Haw. l. c. 7. p. 8.

β maior. Mit gröfserem Wuchse.

11. *A. rigida,* Willd. l. c. Steife Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.
Aloë rigida. Jacq. fragm. bot. p. 71. n. 224. t. 108.

12. *A. imbricata.* Willd. l. c. p. 13. Dachziegelblättrige Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.
Aloë imbricata. Haw. l. c. 7. p. 7.

13. *A. pentagona.* Willd. l. c. Fünfeckige Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.
Aloë pentagona. Haw. l. c.

14. *A. bullata.* Willd. l. c. Blasige Apicre. Am Cap. May, Jun. Ch. ♄.
Aloë bullulata. Jacq. fragm. bot. p. 72. n. 225. t. 109.

15. *A. viscosa.* Willd. l. c. p. 14. Klebrige Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.
Aloë viscosa. Pers. l. c. 1. p. 379.

β. major. Mit gröfserem Wuchse.

16. *A. tortuosa.* Willd. l. c. Gedrehte Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.
Aloë tortuosa. Haw. l. c.

17.)
18.) Noch unbeschriebene Arten.

319. Aloë, Aloe.

1. *A. obscura.* Willd. l. c. p. 15. Dunkelfleckige Aloe. Am Cap. — . Ch. ♄.

2. *A. angulata* β *unilateralis.* Willd. l. c. p. 16. Eckige Aloe mit einseitigen Blättern. Am Cap. — . Ch. ♄.

γ. truncata. Mit abgestutzten Blättern.

δ. striata. Mit gestreiften Blättern.

3. *A. excavata.* Willd. l. c. Ausgehöhlte Aloe. Am Cap. May — Jul. Ch. ♄.

4. *A. trigona.* Hort. bot. vindobon. Dreyeckige Aloe. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

5. *A. Lingua.* Thunb. difs. n. 11. Zungenblättrige Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.
Aloë linguaeformis. Pers. l. c.

β. verrucosa. Mit warzigen Blättern.

6. *A. bifaria.* Hort. bot. vindobon. Zweyseitige Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄. Aloë obliqua. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 9. t. 418.

7. *A. intermedia.* Willd. l. c. p. 17. Mittlere Aloe. Am Cap. —. Ch. ♄.

8. *A. verrucosa.* Ait. hort. kew. 1. p. 468. Warzige Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄. Aloë Serra β? verrucosa. Pers. l. c.

9. *A. pseudo-verrucosa.* Hort. dyckens. Unächtwarzige Aloe. Am Cap. —. Ch. ♄.

10. *A. conspurcata.* Hort. dyckens. Beschmutzte Aloe. Am Cap. —. Ch. ♄.

11. *A. carinata.* Pers. l. c. 1. p. 379. Hohlblättrige Aloe. Am Cap. —. Ch. ♄.
β. subglabra. Mit fast glatten Blättern.

12. *A. echinata.* Willd. enum. 1. p. 385. Weichstachlige Aloe. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♃. Aloë humilis. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 10. t. 420.
β. divaricata. Mit ausgesperrten Blättern.
γ. alia varietas. Eine andere Abart.

13. *A. obliqua.* Haw. l. c. 7. p. 14. Schiefblättrige Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄. Aloë maculata. Pers. l. c.

14. *A. pulchra.* Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 10. t. 419. Schöne Aloe. Am Cap. März — May. Ch. ♄.

15. *A. variegata.* Pers. l. c. Bunte Aloe. Am Cap. May, Jun. Ch. ♄.

16. *A. tenuifolia.* Willd. im Magaz. der Gesellsch. naturf. Freunde zu Berlin. 1811. p. 19. Dünnblättrige Aloe. Am Cap. —. Ch. ♄.

17. *A. virens.* Willd. l. c. Grüne Aloe. Am Cap. —. Ch. ♄.

18. *A. picta.* Pers. l. c. 1. p. 378. Bemahlte Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.
A. obscura. Haw. miscell.

19. *A. umbellata.* Decand. pl. succ. p. 98. Doldenblüthige Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.
A saponaria. Haw. miscell.
β. foliis variegatis. Mit bunten Blättern.

20. *A. saponaria* Hortulan. Seifen-Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.
A. latifolia. Haw. miscell.

21. *A. vulgaris.* Pers. l. c. Gemeine Aloe. Zu Barbados, Jamaica, am Cap u. in Ostindien. —. Ch. ♄.
A. barbadensis. Haw. l. c. 7. p. 19.

22. *A. glauca.* Willd. l. c. p. 20. Graugrüne Aloe. Am Cap. —. Ch. ♄.

23. *A. rhodacantha.* Pers. l. c. Rosendornige Aloe. Am Cap. —. Ch. ♄.

24. *A. paniculata.* Jacq. fragm. bot. p. 48. n. 162. t. 62. Rispenblüthige Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♃.
Aloë striata. Haw. l. c. 7. p. 18.

25. *A.* succotrina. Decand. pl. succ. p. et. t. 85. Offizinelle Aloe. Am Cap. —. Ch. ♄.
A. sinuata. Pers. l. c.

26. *A.* guttata. Hort. schoenbr. Betropfte Aloe. Am Cap. —. Ch. ♄.

27. *A. arborescens.* Decand. pl. succ. p. et t. 38. Baumartige Aloe. Am Cap. —. Ch. ♄. A. fruticosa. Pers. l. c.

β. foliis angustioribus. Mit schmäleren Blättern.

28. *A. Commelini.* Willd. l. c. p. 22. Commelinische Aloe. Am Cap. —. Ch. ♄. A. supralaevis. Haw. l. c. 2. p. 186.

29. *A. mitraeformis.* Willd. l. c. Mützenförmige Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.
β. spinosior. Mit mehreren Stacheln.

30. *A. albi-spina.* Haw. miscell. Weifsstachlige Aloe. Am Cap. —. Ch. ♄.

31. *A. Serra.* Pers. l. c. 1. p. 379. Sägeblättrige Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.

32. *A. africana.* Haw. miscell? Africanische Aloe. In Africa. —. Ch. ♄.

33. *A. brevifolia.* Pers. l. c. Kurzblättrige Aloe. Am Cap. —. Ch. ♄.

34. *A.* depresa. Haw. miscell? Niedergedrückte Aloe. Am Cap. —. Ch. ♄.

35. Eine noch unbeschriebene Art.

320. Agave, Agave.

1. *A. americana.* Pers. l. c. Americanische Agave. Im wärmer. Amer. nun auch an den südlichen Meeresküsten Europens. Jul. Aug. W. H. ♄.
β. foliorum margine luteo. Mit gelbgeränderten Blättern.
γ. foliis luteo striatis. Mit gelbgestreiften Blättern.

2. *A. vivipara.* Pers. l. c. 1. p. 130. Lebendiggebährende Agave. In Amer. —. W. H. ♄.

3. *A. lurida.* Pers. l. c. Dunkle Agave. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. ♄.

4. *A. foetida.* Pers. l. c. Stinkende Agave. Zu Curassao. —. W. H. ♄.

5. Eine noch unbeschriebene Art von St. Domingo.

6. Eine andere noch unbeschriebene Art v. Caracas.

321. Alstroemeria, Alströmerie.

1. *A. Pelegrina.* Lin. sp. pl. p. 461. Bunte Alströmerie. Auf Hügeln in Peru u. Lima. Jul. Ch. 2.
A. peregrina. Pers. l. c. 1. p. 380.

2. *A. Ligtu.* Pers. l. c. Rachenförmige Alströmerie. Zu Lima. Jul. Ch. 2.

322. Hemerocallis, Tagblume.

1. *H. flava.* Pers. l. c. 1. p. 381. Gelbblühende Tagblume. Auf Feldern der Schweiz, Ungarns u. Sibiriens. Jun. Jul. Im F. 2.

2. *H. fulva.* Pers. l. c. 1. p. 382. Braunrothe Tagblume. In China. Jun. Jul. Im F. 2.

3. *H. alba.* Pers. l. c. Weifsblühende Tagblume. In Japan. Jun. Jul. Ch. 2.
H. japonica. Thunb. act. societ. linn. lond. 2. p. 335.
Hosta japonica. Trattinnick observat. bot. fasc. 2. p. 55. n. 89.

4. *H. coerulea.* Pers. l. c. Blaublühende Tagblume. In China u. Japan. Jun. Jul. Ch. 2.
H. japonica β coerulea. Andrews repos. bot. t. 6.
Hosta coerulea. Tratt. l. c.

323. Acorus, Calmus.

1. *A. Calamus.* Pers. l. c. Gemeiner Calmus. In Teichen und Sümpfen von Eur. Aug. Im freyen Wasserbehälter. 4.

324. Orontium, Wasserähre.

1. *O. japonicum.* Pers. l. c. Japanische Wasserähre. In Japan. Aug. — Oct. Ch. 4.

325. Corypha, Schirmpalme.

1. *C. umbraculifera.* Pers. l. c. Grofsblättrige Schirmpalme. In Ostind. —. W. H. ♄.

326. Thrinax, Schilfpalme.

1. *Th. parviflora.* Pers. l. c. 1. p. 383. Kleinblüthige Schilfpalme. Am Meerstrande in Jamaica u. Hispaniola. —. W. H. ♄.

327. Berberis, Berberitze.

1. *B. vulgaris.* Pers. l. c. 1. p. 387. Gemeine Berberitze. In Europäisch. u. Nordamericanischen Wäldern. May, Jun. Im F. ♄.

β. canadensis. Gemeine Berberitze aus Nordamerica.

2. *B. sibirica.* Pers. l. c. Sibirische Berberitze. In Sibirien. May, Jun. Im F. ♄.

3. *B. sinensis.* Desfont. cat. hort. paris. p. 150. Chinesische Berberitze. In China. —. Ch. ♄.

328. Prinos, Winterbeere.

1. *Pr. verticillatus.* Pers. l. c. Virginische Winterbeere. In Sümpfen v. Virgin. u. Pensylv. May, Jun. K. H. ♄.

2. *Pr. glaber.* Pers. l. c. 1. p. 388. Canadische Winterbeere. In Canada u. Florida. May, Jun. K. H. ♄.

329. Cleome, Cleome.

1. *Cl. pentaphylla.* Pers. l. c. 1. p. 390. Fünfblättrige Cleome. In Ostind. Aug. Sept. W. H. ☉.

2. *Cl. dodecandra.* Pers. l. c. 1. p. 391. Zwölffädige Cleome. In beyden Ind. Aug. W. H. ☉.

3. *Cl. uniglandulosa.* Pers. l. c. Eindrüsige Cleome. In Mexico. Jul. — Sept. W. H. ♃.

4. *Cl. gigantea.* Pers. l. c. Riesenartige Cleome. In Guinea. Aug. W. H. ♄.

330. Stephania, Stephanie.

1. *St. Cleomoides.* Pers. l. c. Cleomeartige Stephanie. Zu Caracas. Jun. — Aug. W. H. ♄. Capparis paradoxa. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 58. t. 111.

331. Canarina, Canarina.

1. *C. Campanula.* Pers. l. c. 1. p. 392. Glockenblüthige Canarina. Auf den Canarischen Inseln. Decemb. — Febr. Ch. ♃.

332. Frankenia, Frankenie.

1. *Fr. laevis.* Pers. l. c. Glatte Frankenie. Am Meerstrande in Südeur. Jul. — Sept. K. H. 4.

2. *Fr. thymifolia.* Pers. l. c. 1. p. 393. Thymianblättrige Frankenie. In Span. u. der Barbarey. —. K. H. ♄.

333. Bambusa, Bambos.

1. *B. arundinacea.* Willd. sp. pl. 2. p. 245. Gemeiner Bambos. In beyden Ind. —. W. H. ♄. Bambos arundinacea. Pers. l. c.

β. latifolia. Mit breiteren, weichhaarigen Blättern.

334. Lomandra, Lomandra.

1. *L. latifolia.* Labillardiere. Breitblättrige Lomandra. In Neuholl. May, Jun. Ch. 4.

2. *L. angustifolia.* Labill. Schmalblättrige Lomandra. In Neuholl. May, Jun. Ch. 4.

DIGYNIA.

335. Oryza, Reis.

1. *O. sativa.* Pers. l. c. 1. p. 394. Gemeiner Reis. In Ostind. Jun. Im F. ☉.

β. mutica. Mit grannenlosen Spelzen.

336. Atraphaxis, Atraphaxis.

1. *A. spinosa.* Pers. l. c. Stachlige Atraphaxis. In Medien u. Sibirien. Jul. Aug. Im F. ♄.

2. *A. undulata.* Pers. l. c. Wellenblättrige Atraphaxis. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.

TRIGYNIA.

337. Rumex, Ampfer.

1. *R. Patientia.* Pers. l. c. Gemüse-Ampfer. In Deutschl. u. Ital. May, Jun. Im F. 24.

2. *R. sanguineus.* Pers. l. c. Blutadriger Ampfer. In Nordamer. May, Jun. Im F. 24.

3. *R. Lunaria.* Pers. l. c. 1. p. 395. Baumartiger Ampfer. Auf den Canarisch. Ins. Jun. — Aug. K. H. ♄.

4. *R. scutatus.* Pers. l. c. Grauer Ampfer. In Südeur. Jun. Im F. 24.

5. *R. cordatus.* Desfont. catal. hort. paris. p. 40. Herzblättriger Ampfer. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.

6. *R. Acetosa.* Pers. l. c. Gemeiner Ampfer. Auf sandigen Trieften in Eur. May, Jun. Im F. 24.

338. Veratrum, Germerkraut.

1. *V. nigrum.* Pers. l. c. 1. p. 397. Schwarzes Germerkraut. Auf trockenen Hügeln in Oesterr. Ungarn u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *V. album.* Pers. l. c. Weifses Germerkraut. An Bächen u. auf feuchten Waldwiesen in Eur. u. Nordamer. Jun. Jul. Im F. 24.

339. Myrsiphyllum, Myrtenblatt.

1. *M. asparagoides.* Willd. im Magaz. der Gesellsch. naturf. Fr. zu Berlin. 1808. p. 25. Spargelartiges Myrtenblatt. Am Cap u. in Aethiopien. Jun. Ch. ♄.
Medeola asparagoides. Pers. l. c. 1. p. 398.

340. Colchicum, Zeitlose.

1. *C. autumnale.* Pers. l. c. Herbst-Zeitlose. Auf Wiesen in Eur. Sept. Oct. Im F. 4.

β. flore pleno. Mit gefüllter Blüthe.

341. Chamaerops, Zwergpalme.

1. *Ch. humilis.* Pers. l. c. 1. p. 400. Niedrige Zwergpalme. In Dalmatien, Span. u. der Barbarey. Blüht zu verschiedenen Zeiten im Jahre. K. H. ♄.

β arborescens. Mit sehr hohem Stamme.

342. Aponogeton, Aponogeton.

1. *A. distachyon.* Pers. l. c. Zweyzeyliger Aponogeton. In Bächen am Cap. Jul. — Oct. Im freyen Wasserbehälter. 4.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

343. Disandra, Disandra.

1. *D prostrata.* Pers. l. c. 1. p. 402. Liegende Disandra. Im Orient u. zu Madera. Bl. den ganzen Sommer hindurch. W. H. 4.

344. Pisonia, Pisonie.

1. *P. aculeata.* Pers. l. c. Stachlige Pisonie. In Südamer. —. W. H. ♄.

2. *P. fragrans.* Desfont. catal. hort. paris. p. 46. Wohlriechende Pisonie. In Südamer. —. W. H. ♄.

3. *P. nitida,* Desfont. l. c. Glänzende Pisonie. In Südamer. —. W. H. ♄.

4. *P.* obtusata. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 35. t. 314. Stumpfblättrige Pisonie. Auf der Insel Providenz. May, Jun. W. H. ♄.

345. Petiveria, Petiverie.

1. *P. alliacea.* Pers. l. c. Knoblauchartige Petiverie. In Hainen v. Jamaica. May — Sept. W. H. ♄.

346. Aesculus, Roſskastanie.

1. *Ae. Hippocastanum.* Pers. l. c. 1. p. 403. Gemeine Roſskastanie. Im nördlicher. Asien. May. Im F. ♄.

2. *Ae. Pavia.* Pers. l. c. Rothe Roſskastanie. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. ♄.

3. *Ae. flava.* Ait. hort. kew. 1. p. 494. Gelbe Roſskastanie. In Nordcarolina. Jun. Jul. Im F. ♄. Ae. lutea. Pers. l. c.

4. *Ae. macrostachia.* Pers. l. c. Langährige Roſskastanie. In Georgien u. am Savannah. Jun. Jul. Im F. ♄.

347. Dracontium, Zehrwurz.

1. *Dr. lanceaefolium.* Jacq. ic. rar. 3. t. 612. Collect. 4 p. 118. Lanzenblättrige Zehrwurz. Zu Caracas auf Bäumen schmarozend. Jun. — Aug. W. H. 4.

2. *Dr. pertusum.* Mill. dict. n. 1. ic. t. 296. Durchlöcherte Zehrwurz. In Südamer. Jun. — Aug. W. H. ♄.

348. Calla, Schlangenkraut.

1. *C. aethiopica.* Lin. sp. pl. p. 1373. Capisches Schlangenkraut. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 4.

TETRAGYNIA.

349. Saururus, Eidechsenschwanz.

1. *S. cernuus.* Pers l. c. Hängender Eidechsenschwanz. In Virgin. Jul. Aug. K. H. 4.

2. *S. lucidus.* Donn catal. hort. cantabrig. p. 66. Glänzender Eidechenschwanz. In Nordamer. Jul. Aug. K. H. 4.

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

350. Tropaeolum, Kapuzinerkresse.

1. *Tr. minus.* Pers. l. c. 1. p. 405. Kleine Kapuzinerkresse. In Peru. Jun. — Aug. Im F. ☉.

2. *Tr. maius.* Pers. l. c. Grofse Kapuzinerkresse. In Peru. Iun. — Aug. Im F. ☉.

331. Oenothera, Nachtkerze.

1. *Oe. biennis.* Pers. l. c. 1. p. 407. Gemeine Nachtkerze. In Virgin. jetzt auch in Eur. an Flüssen u. Bächen. Jun. Jul. Im F. ♂.

2. *Oe. muricata.* Pers. l. c. 1. p. 408. Weichstachlige Nachtkerze. In Canada. Jun. Jul. Im F. ♂.

3. *Oe. molissima.* Pers. l. c. Weichblättrige Nachtkerze. Zu Buenos Ayres. Jul. Aug. Im F. ☉.

4. *Oe. odorata.* Pers. l. c. Wohlriechende Nachtkerze. In Patagonien. Aug. Im F. 4.

5. *Oe. rosea.* Pers. l. c. 1. p. 409. Rosenrothe Nachtkerze. In Peru. Jun. — Aug. K. H. 4.

332. Gaura, Prachtkerze.

1. *G. mutabilis.* Pers. l. c. Veränderliche Prachtkerze. In Mexico. May, Jun. Ch. ♄.

333. Epilobium, Weidenröslein.

1. *E. angustifolium.* Lin. sp. pl. p. 493. Schmalblättriges Weidenröslein. In Nordeur. Jun. Jul. Im F. 4.
E. spicatum. Pers. l. c.

2. *E. angustissimum.* Web. dec. pl. minus cognit. p. 3. Rosmarinblättriges Weidenröslein. In Gebirgsholzschlägen in Oesterreich, Grönland u. Südeur. Jun. Jul. Im F. 4.
E. angustifolium. Pers. l. c.

3. *E. hirsutum.* Pers. l. c. 1. p. 410. Grofsblüthiges Weidenröslein. An Bächen in Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

334. Fuchsia, Fuchsie.

1. *F. coccinea.* Pers. l. c. Scharlachrothe Fuchsie. In Chili bis zur Magellanischen Landenge. May — Aug. Ch. ♄.

335. Melicocca, Honigfrucht.

1. *M. bijuga.* Pers. l. c. 1. p. 413. Gefiederte Honigfrucht. In Südamer. — W. H. ♄.

2. Eine noch unbeschriebene Art von Caracas.

336. Koelreuteria, Kölreuterie.

1. *K. paniculata.* Pers. l. c. Rispenblüthige Kölreuterie. In China. Jul. Aug. Im F. ♄.

337. Amyris, Balsamstrauch.

1. *A. polygama.* Pers. l. c. 1. p. 414. Geschlechtändernder Balsamstrauch. In Chili. —. Ch. ♄.

2. *A. maritima.* Pers. l. c. Meerstands-Balsamstrauch. Auf Meeresfelsen in Amer. Jul. Aug. W. H. ♄.

858. Dodonaea, Dodonäa.

1. *D. triquetra.* Pers. l. c. 1. p. 415. Dreykantige Dodonäa. In Neuholl. Aug. Ca. ♄.

359. Acer, Ahorn.

1. *A. tataricum.* Pers. l. c. 1. p. 417. Tartarischer Ahorn. In der Tartarey. May, Jun. Im F. ♄.

2. *A. Pseudo-Platanus.* Pers. l. c. Weifser Ahorn. In Deutschl. der Schweiz, Engl. u. Frankr. May. Im F. ♄.

3. *A. obtusatum.* Waldstein et Kitaib. mscrp. Stumpfblättriger Ahorn. In Ungarn u. Croatien. May. Im F. ♄.

4. *A. platanoides.* Pers. l. c. Spitz-Ahorn. Im nördlichen Eur. u. auf Bergen in Steyerm. u. Savoyen. May, Jun. Im F. ♄.

β. laciniatum Hortulan. Mit zerschlitzten Blättern.

γ. palmatum Hortulan. Mit handförmigen Blättern.

5. *A. rubrum.* Pers. l. c. Rother Ahorn. In Pensylv. u. Carol. März, Apr. Im F. ♄.

β. floribus flavescentibus. Mit gelblichen Blüthen.

6. *A. dasycarpum.* Pers. l. c. Silberblättriger Ahorn. In Pensylv. u. Carol. May. Im F. ♄.

7. *A. saccharinum.* Pers. l. c. Zucker-Ahorn. Von der Hudsonsbay bis Carol. May. Im F. ♄.

8. *A. pensylvanicum.* Lin. sp. pl. p. 1496. Gestreifter Ahorn. In Canada, seltner in Carol. u. Florida. May. Im F. ♄.
A. striatum. Pers. l. c.

9. *A. montanum.* Ait. hort. kew. 3. p. 435. Berg-Ahorn. In Canada u. auf dem hohen Alleghanischen Gebirge bis gegen Florida. May. Im F. ♄.
A. spicatum. Pers. l. c.

10. *A. campestre.* Pers. l. c. Feld-Ahorn. Im südlicher Eur. May. Im F. ♄.

11. *A. Opalus.* Pers. l. c. Italienischer Ahorn. In der Schweiz, Frankr. u. Ital. — Im F. ♄.

12. *A. monspessulanum.* Pers. l. c. Französischer Ahorn. In Krain, Ital. u. Frankr. May. Im F. ♄.

13. *A. creticum.* Pers. l. c. Candischer Ahorn. Im Orient. May. Im F. ♄.

14. *A. Negundo.* Pers. l. c. 1. p. 418. Eschenblättriger Ahorn. In Pensylv. u. Carol. May. Im F. ♄.

360. Correa, Correa.

1. *C. alba.* Pers. l. c. 1. p. 419. Weifse Correa. In Neuholl. Jän. — Aug. Ch. ♄.

361. Erica, Heide.

1. *E. urceolaris.* Pers. l. c. 1. p. 420. Becherförmige Heide. Am Cap wie die meisten folgenden Arten dieser Gattung. —. Ch. ♄.

2. *E. aggregata.* Donn. cat. cantabrig. p. 110. Gehäuftblüthige Heide. —. Ch. ♄.

3. *E. arborea.* Pers. l. c. 1. p. 421. Baumartige Heide. In Südeur. May. Ch. ♄.

4. *E. stricta.* Pers. l. c. Steife Heide. May, Jun. Ch. ♄.

5. *E. Tetralix* β alba. Pers. l. c. 1. p. 422. Weifse Sumpf-Heide. In Sümpfen des nördlicheren Eur. —. Im F. ♄.

6. *E. mammosa.* Pers. l. c. Zitzenförmige Heide. May. Ch. ♄.

7. *E. vulgaris.* Pers. l. c. Gemeine Heide. Auf dürren Hügeln u. in Wäldern v. Eur. May, Jun. Im F. ♄.

8. *E. scoparia.* Pers. l. c. 1. p. 423. Besenförmige Heide. In Südeur. May, Jun. K. H. ♄. E. fucata. Thunb. diss. n. 9.

9. *E. australis.* Pers. l. c. Südliche Heide. In Spanien. —. K. H. ♄.
E. pistillaris. Salisb. linnaean. transact. 6. p. 368.

10. *E. pedunculata.* Donn. cat. cantabr. p. 111. Gestielte Heide. Jul. Aug. Ch. ♄.

11. *E. baccans.* Pers. l. c. Beerenförmige Heide. May, Jun. Ch. ♄.

12. *E. arbutiflora.* Donn. catal. cantabrig. p. 112. Sandbeerenblüthige Heide. —. Ch. ♄.

13. *E. hispida.* Andrew. Ericae 2. n. 100. Borstige Heide. —. Ch. ♄.

14. *E. versicolor.* Pers. l. c. 1. p. 426. Bunte Heide. —. Ch. ♄.

15. *E. grandiflora.* Pers. l. c. 1. p. 427. Grofsblüthige Heide. —. Ch. ♄.

16. *E. curviflora.* Pers. l. c. Krummblüthige Heide. Aug. Ch. ♄.

17. *E. simpliciflora.* Pers. l. c. Einfachblüthige Heide. Ch. ♄.

18. *E. mediterranea.* Pers. l. c. 1. p. 428. Mittelländische Heide. In Südeur. Apr. May. K. H. ♄.

19. *E. multiflora.* Pers. l. c. Vielblüthige Heide. In Engl. Südfrankr. u. im Orient. März — May. K. H. ♄.

20. *E. herbacea.* Pers. l. c. Krautartige Heide. Im südlicher. Eur. Apr. May. Im F. ♄.

21. *E. purpurascens.* Per. l. c. Italienische Heide. In Südeur. Apr. May. K. H. ♄.

22. *E. longiflora.* Pers. l. c. 1. p. 432. Langblüthige Heide. Jun. Jul. Ch. ♄.
E. elata Hortulan.

362. Daphne, Seidelbast.

1. *D. Mezereum.* Pers. l. c. 1. p. 434. Gemeiner Seidelbast. In Wäldern v. Eur. März. Apr. Im F. ♄.

2. *D. alpina.* Pers. l. c. Alpen-Seidelbast. Auf Alpen in Tyrol, der Schweiz u. Ital. Jun. Jul. K. H. ♄.

3. *D. Laureola.* Pers. l. c. 1. p. 435. Immergrüner Seidelbast. In Wäldern des südlicher. Eur. März, Apr. Im F. ♄.

4. *D. pontica.* Pers. l. c. Pontischer Seidelbast. Im Pontus. May, Jun. K. H. ♄.

5. *D. Gnidium.* Pers. l. c. Rispenblüthiger Seidelbast. In Span. Ital. u. Languedoc. May. K. H. ♄.

6. *D. odora.* Pers. l. c. Wohlriechender Seidelbast. In China u. Japan. Jän. — März. Ch. ♄.

7. *D. Cneorum.* Pers. l. c. Niedriger Seidelbast. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz u. Frankr. auf sonnigen Hügeln. May, Jun. Im F. ♄.

8. *D. oleoides.* Pers. l. c. Oelbaumblättriger Seidelbast. In Candien. Jun. — Aug. K. H. ♄.

9. *D. collina.* Pers. l. c. Stumpfblättriger Seidelbast. Auf Hügeln in Südital. u. Candien. März, Apr. K. H. ♄.

10. *D.*? Von Caracas.

364. Gnidia, Gnidie.

1. G. *simplex.* Pers. l. c. 1. p. 436. Einfache Gnidie. Am Cap. Apr. — Aug. Ch. ♄.

364. Passerina, Vogelkopf.

1. *P. filiformis.* Pers. l. c. Fadenförmiger Vogelkopf. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

365. Lachnaea, Lachnaea.

1. *L. conglomerata.* Pers. l. c. 1. p. 438. Knaulblüthige Lachnäa. Am Cap. —. Ch. ♄.

DIGYNIA.

366. Moehringia, Möhringie.

1. *M. muscosa.* Pers. l. c. Moosige Möhringie. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz, Ital. u. Montpellier an Bächen u. Quellen. Jun. Jul. Im F. 24.

TRIGYNIA.

367. Polygonum, Knöterig.

1. *P. Bistorta.* Pers. l. c. 1. p. 439. Wiesen-Knöterig. Auf Wiesen u. Bergen in Oesterr. Deutschl. der Schweiz u. Frankr. May, Jun. Im F. 24.

2. *P. viviparum.* Pers. l. c. Zwiebeltragender Knöterig. Auf Bergen u. trockenen Trieften in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *P. amphibium.* Pers. l. c. 1. p. 440. Wasser-Knöterig. In Wässern v. Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

4. *P. orientale.* Pers. l. c. Tabacksblättriger Knöterig. Im Orient. May — Jul. Im F. ☉.

5. *P. divaricatum.* Pers. l. c. 1. p. 441. Ausgebreiteter Knöterig. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

368. Coccoloba, Seetraube.

1. *C. uvifera.* Pers. l. c. 1. p. 442. Gemeine Seetraube. In Amer. —. W. H. ♄.

2. *C. excoriata.* Pers. l. c. Rindenlose Seetraube. In Westind. —. W. H. ♄.

3. *C. punctata.* Pers. l. c. Punctirte Seetraube. In Jamaica. März, Apr. W. H. ♄.

4. *C. laurifolia.* Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 9. t. 267. Lorbeerblättrige Seetraube. Zu Caracas. May — Jul. W. H. ♄.

5. *C. fagifolia.* Jacq. l. c. 3. p. 55. t. 352. Buchenblättrige Seetraube. Zu Caracas. Apr. May. W. H. ♄.

6. Eine noch unbeschriebene Art, welche in Caracas zu Hause ist.

369. Paullinia, Paullinie.

1. *P. cauliflora.* Pers. l. c. 1. p. 443. Stammblüthige Paullinie. Zu Caracas. Jun. — Aug. W. H. ♄.

2. *P. hispida.* Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 9. t. 268. Borstige Paullinie. Zu Caracas. Nov. Dec. W. H. ♄.

370. Seriana, Seriane.

1. *S. caracasana.* Pers. l. c. 1. p. 444. Weitzähnige Seriane. Zu Caracas. Jun. W. H. ♄. Paullin. caracasana. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 52 t. 99.

2. *S. mexicana.* Pers. l. c. Mexicanische Seriane. In Mexico. Jun. Jul. W. H. ♄. Paullin. mexicana. Lin. sp. pl. p. 525.

3. *S. triternata.* Pers. l. c. Dreymalgedreyte Seriane. In St. Domingo. — W. H. ♄. Paullin. triternata. Jacq. stirp. amer. 110. t. 180. f. 32.

371. Sapindus, Seifenbaum.

1. *S. rigidus.* Pers. l. c. 1. p. 445. Eschenblättriger Seifenbaum. Im wärmer. Amer. —. W. H. ♄.

2. *S. indicus.* Desfont. catal. hort. paris. p. 135. Indischer Seifenbaum. In Ostind. —. W. H. ♄.

TETRAGYNIA.

372. Calanchoë, Calanchoe.

1. *C. aegyptiaca.* Pers. l. c. 1. p. 446. Aegyptische Calanchoe. In Aegypten. —. K. H. ♄. Cotyledon nudicaulis. Murr. syst. veget. 14. p. 429.

2. *C. Verea.* Pers. l. c. Gekerbte Calanchoe. In Siera Leone. Jun. —. Aug. W. H. ♄. Verea crenata Andrew. bot. repos. p. et. t. 21.

373. Halloragis, Meerträublein.

1. *H. prostrata.* Pers. l. c. Liegendes Meerträublein. In Neuseeland u. der Botanybay. Jun. Jul. Ch. ♄.

CLASSIS. IX.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

374. Laurus, Lorbeer.

1. *L. Cassia.* Pers. l. c. 1. p. 448. Cassien-Lorbeer. In Malabar, Sumatra u. Java. —. W. H. ♄.

2. *L. Camphora.* Pers. l. c. Kampfer-Lorbeer. In Japan. Jun. Jul. Ch. ♄.

3. *L. nobilis.* Pers. l. c. Gemeiner Lorbeer. In Ital. u. Griechenl. May, Jun. K. H. ♄.

4. *L. indica.* Pers. l. c. Indischer Lorbeer. Zu Madera u. den Canarischen Ins. Jul. Aug. Ch. ♄.

5. *L. foetens.* Pers. l. c. Stinkender Lorbeer. Zu Madera u. den Canarisch. Ins. —. Ch. ♄.

6. *L. Borbonia.* Pers. l. c. 1. p. 449. Rother Lorbeer. In Carol. u. Virgin. —. K. H. ♄.

7. *L. caroliniensis.* Pers. l. c. Carolinischer Lorbeer. In Carol. —. Ch. ♄.

8. *L. Diospyrus.* Pers. l. c. 1. p. 450. Persimonenartiger Lorbeer. In Nordamer. —. K. H. ♄. L. melissaefolia. Walt. fl. carolin. p. 134.

9. *L. Benzoin.* Pers. l. c. Benzoin-Lorbeer. In Virgin. —. K. H. ♄.

10. *L. Sassafras.* Pers. l. c. Sassafras-Lorbeer. In Virgin. Carol. u. Florida. —. K. H. ♄.

375. Rheum. Rhabarber.

1. *Rh. Rhaponticum.* Pers. l. c. 1. p. 451. Stumpfblättrige Rhabarber. In Servien, Pohlen u. Rufsland. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *Rh. undulatum.* Pers. l. c. Wellenblättrige Rhabarber. In China u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *Rh. palmatum.* Pers. l. c. Schlitzblättrige Rhabarber. In China. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *Rh. compactum.* Pers. l. c. Dichte Rhabarber. In der Tartarey u. China. Jun. Jul. Im F. 4.

5. *Rh. hybridum.* Pers. l. c. Bastard-Rhabarber. In Nordasien. Jun. Jul. Im F. 4.

376. Butomus, Wasserlisch.

1. *B. umbellatus.* Pers. l. c. Doldenblüthiger Wasserlisch. In Pfützen u. Teichen v. Eur. Jun. Jul. Im freyen Wasserbehälter. 4.

CLASSIS X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

377. Sophora, Sophore.

1. *S. tetraptera.* Pers. l. c. 1. p. 442. Flügelfrüchtige Sophore. In Neuseeland. Apr. May. K. H. ♄.

2. *S. microphylla.* Pers. l. c. Kleinblättrige Sophore. In Neuseeland. Apr. May. K. H. ♄.

3. *S. alopecuroides.* Pers. l. c. Fuchsschwanzartige Sophore. Im Orient. Jun. Jul. Im F. 4.

4. *S. tomentosa.* Pers. l. c. Filzige Sophore. In Neuseeland. — . K. H. ♄.

5. *S. japonica.* Pers. l. c. Japanische Sophore. In Japan. Aug. Sept. Im F. ♄.

378. Podalyria, Podalyrie.

1. *P. australis.* Pers. l. c. 1. p. 453. Südliche Podalyrie. In Carolina. Jun. Jul. Im F. ♃.

2. *P. genistoides.* Willd. sp. pl. 2. p. 502. Ginsterartige Podalyrie. Am Cap. —. Ch. ♄.

3. *P. myrtillifolia.* Pers. l. c. Heidelbeerblättrige Podalyrie. Am Cap. —. Ch. ♄.

4. *P. biflora.* Pers. l. c. Zweyblüthige Podalyrie. Am Cap. —. Ch. ♄.

379. Anagyris, Anagyris.

1. *A. foetida.* Pers. l. c. 1. p. 454. Stinkende Anagyris. Auf Bergen in Span. Ital. u. Sicilien. May. K. H. ♄.

380. Cercis, Judasbaum.

1. *C. Siliquastrum.* Pers. l. c. Europäischer Judasbaum. In Südeur. May, Jun. Im F. ♄.

2. *C. canadensis.* Pers. l. c. Canadischer Judasbaum. In Pensylv. Virgin. u. Carolina. May, Jun. Im F. ♄.

381. Bauhinia, Bauhinie.

1. *B. aculeata.* Pers. l. c. Stachlige Bauhinie. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. ♄.

2. *B. porrecta.* Pers. l. c. Spitzblättrige Bauhinie. In Jamaica u. Hispaniola. —. W. H. ♄.

382. Hymenaea, Locustbaum.

1. *H. Courbaril.* Pers. l. c. 1. p. 455. Gemeiner Locustbaum. In Südamer. — . W. H. ♄.

383. Cassia, Cassie.

1. *C. Absus.* Pers. l. c. 1. p. 456. Aegyptische Cassie. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☉.

2. *C. bicapsularis.* Pers. l. c. Zweyfächrige Cassie. In Ostind. May, Jun. W. H. ♄.

3. *C. acuminata.* Pers. l. c. Langspitzige Cassie. In Wäldern von Gujana. —. W. H. ♄.

4. *C. corymbosa.* Pers. l. c. Doldentraubige Cassie. Zu Buenos Ayres. Jun. W. H. ♄.

5. *C. occidentalis.* Pers. l. c. 1. p. 457. Westindische Cassie. In Jamaica. May —Jul. W. H. ♄.

6. *C. atomaria.* Pers. l. c. Punktirte Cassie. In Amer. —. W. H. ♄.

7. *C. chinensis.* Pers. l. c. Chinesische Cassie. Bey Pecking in China. Apr. May. W. H. ♄.

8. *C. tomentosa.* Pers. l. c. 1. p. 458. Filzige Cassie. In Südamer. —. W. H. ♄.

9. *C. alata.* Pers. l. c. Geflügelte Cassie. Im wärmer. Amer. —. W. H. ♄.

10. *C. marilandica.* Pers. l. c. Marilandische Cassie. In Virgin. u. Mariland. Jul. Aug. Im F. 2.

384. Bactyrilobium, Rohrcassie.

1. *B. Fistula.* Willd. enum. 1. p. 439. Röhrenfrüchtige Rohrcassie. In Ostind. Jun. — Aug. W. H. ♄.
Cathartocarpus Fistula. Pers. l. c. 1. p. 459.
Cassia Fistula. Lin. sp. pl. p. 540.

385. Parkinsonia, Parkinsonie.

1. *P. aculeata.* Pers. l. c. Stachlige Parkinsonie. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. ♄.

386. Caesalpinia, Caesalpinie.

1. *C. vesicaria.* Pers. l. c. 1. p. 460. Ausgerandetblättrige Cäsalpinie. In Jamaica. —. W. H. ♄.
C. bijuga. Swarz observ. 166.

2. *C. Sappan.* Pers. l. c. Brasilienholz-Cäsalpinie. In b yden Ind. —. W. H. ♄.

3. *C. Crista.* Pers. l. c. Vielstachlige Cäsalpinie. In Jamaica. —. W. H. ♄.

387. Hoffmanseggia, Hoffmanseggie.

1. *H. falcaria.* Pers. l. c. Sichelfrüchtige Hoffmanseggie. Auf hohen Bergen in Südamer. —. W. H. ♄.

388. Moringa, Behennufs.

1. *M. zeylanica.* Pers. l. c. 1. p. 461. Zeylonische Behennufs. In Zeylon, Amer. u. Aegypt. auf sandigem Boden. Jun. W. H. ♄.
Hyperanthera Moringa. Vahl symbol. 1. p. 30.
Guilandina. Moringa. Lin. sp. pl. p. 546.

389. Adenanthera, Drüsenblume.

1. *A. pavonina.* Pers. l. c. Pfauenartige Drüsenblume. In Ostind. — . W. H. ♄.

390. Schotia, Schotie.

1. *Sch. speciosa.* Pers. l. c. 1. p. 462. Prächtige Schotie. In Senegall u. am Cap. Aug. Sept. W. H. ♄.

2. *Sch. latifolia.* Jacq. fragm. bot. p. 23. u. 80. t. 15. f. 4. Breitblättrige Schotie. Am Cap. Aug. W. H. ♄.

391. Guaiacum, Franzosenholz.

1. *G. officinale.* Pers. l. c. 1. p. 463. Vierblättriges Franzosenholz. In Hispaniola u. Jamaica. Jun. — Aug. W. H. ♄.

392. Zygophyllum, Doppelblatt.

1. *Z. Fabago* Pers. l. c. Gemeines Doppelblatt. In Syrien, Mauritanien u. am Caucasus. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *Z. foetidum.* Pers. l. c. Stinkendes Doppelblatt. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

3. *Z. Morgsana.* Pers. l. c. Kurzgestieltes Doppelblatt. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

4. *Z. sessilifolium.* Pers. l. c. Ungestieltes Doppelblatt. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

393. Dictamnus, Diptam.

1. *D. albus.* Lin. sp. pl. p. 548. Weifswurzlicher Diptam. In Süddeutschl. Ital. u. Frankr. auf Kalkgebirge. May, Jun. Im F. 2.
D. Fraxinella. Pers. l. c. 1. p. 464.
β. floribus albis. Mit weifsen Blüthen.

394. Ruta, Raute.

1. *R. graveolens.* Pers. l. c. Gemeine Raute. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ♄.

2. *R. montana.* Pers. l. c. Berg-Raute. Auf Hügeln in Südeur. Jun. Jul. K. H. ♄.
R. legitima. Jacq. ic. rar. 1. t. 76. Collect. 1. p. 74.

3. *R. chalepensis.* Pers. l. c. Aleppische Raute. In Natolien. Jun. Jul. K. H. ♄.

395. Limonia, Limonie.

1. *L. trifoliata.* Pers. l. c. 1. p. 466. Dreyblättrige Limonie. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♄.

396. Murraya, Murraye.

1. *M. exotica.* Pers. l. c. Indische Murraye. In Ostind. May, Jun. W. H. ♄.

397. Kookia, Kookie.

1. *K. punctata.* Pers. l. c. Punktirte Kookie. In China. Jun. Jul. W. H. ♄.

398. Trichilia, Trichilie.

1. *Tr. spondioides.* Pers. l. c. 1. p. 468. Mirobalanenartige Trichilie. Auf waldigen Bergen im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. ♄.

2. *Tr. capensis.* Pers. l. c. Capische Trichilie. Am Cap in Wäldern. Jun. W. H. ♄. Ekebergia capensis. Sparmann act. holm. 1779 p. 252. t. 9.

399. Melia, Zedrach.

1. *M. Azedarach.* Pers. l. c. 1. p. 469. Glatter Zedrach. In Syrien, Zeylon u. Südeur. Jun. Jul. K. H. ♄.

2. *M. sempervirens.* Pers. l. c. Immergrüner Zedrach. An Hecken in Jamaica. Jun. — Aug. W. H. ♄.

400. Melastoma, Schwarzschlund.

1. *M. cymosum,* Pers. l. c. 1. p. 471. Afterdoldiger Schwarzschlund. In Südamer. —. W. H. ♄.

401. Kalmia, Kalmie.

1. *K. latifolia.* Pers. l. c. 1. p. 477. Breitblättrige Kalmie. In Nordamer. May. K. H. ♄.

2. *K. angustifolia.* Pers. l. c. Schmalblättrige Kalmie. In Nordamer. May. K. H. ♄.

3. *K. glauca.* Pers. l. c. Graugrüne Kalmie. Zu Terra Nova. May. K. H. ♄.

402. Ledum, Porst.

1. *L. palustre.* Pers. l. c. Sumpf- Porst. In Sümpfen v. Nordeur. Apr. May. K. H. ♄.

2. *L. latifolium.* Pers. l. c. Breitblättriger Porst- In Sümpfen v. Grönland u. Amer. Apr. May. K. H. ♄.

403. Rhododendron, Alpbalsam.

1. *Rh. ferrugineum.* Pers. l. c. 1. p. 478. Rostfärbiger Alpbalsam. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz u. den Pyrenäen. Jun. — Aug. K. H. ♄.

2. *Rh. hirsutum.* Pers. l. c. Gefranzter Alpbalsam. Auf Alpen in Oesterr. Steyerm. Salzb. u. der Schweiz. Jun. — Aug. K. H. ♄.

3. *Rh. Chamaecistus.* Pers. l. c. Drüsiger Alpbalsam. Auf den Oesterr. Krainerschen u. Salzburgeralpen. Jun. Jul. K. H. ♄.

4. *Rh. ponticum.* Pers. l. c. Pontischer Alpbalsam. Im Orient u. bey Gibraltar. May — Jul. K. H. ♄.

β. foliis undulatis. Mit wellenförmigen Blättern.

γ. —— variegatis — gestreiften ——

δ. —— obtusis. — stumpfen ——

ε. —— angustis — schmalen ——

5. *Rh. maximum.* Pers. l. c. Grofser Alpbalsam. In Nordamer. Jun. Jul. K. H. ♄.

404. Vaccinium, Heidelbeere.

1. *V. Myrtillus.* Pers. l. c. Gemeine Heidelbeere. In schattigen Wäldern v. Eur. May, Jun. Im F. ♄.

2. *V. arboreum.* Pers. l. c. 1. p. 479. Baumartige Heidelbeere. In Nordamericanischen Wäldern. —. K. H. ♄.

3. *V. pensylvanicum.* Pers. l. c. Pensylvanische Heidelbeere. In Pensylv. May. K. H. ♄.

405. Andromeda, Andromede.

1. *A. polifolia.* Pers. l. c. 1. p. 481. Poleyblättrige Andromede. Auf Torfboden in Oesterr. Nordeur. u. Amer. Jan. Jul. K. H. ♄.

β. latifolia. Mit breiteren Blättern.

2. *A. repens.* Hort. paris. Kriechende Andromede. —. Jun. Jul. K. H. ♄.

3. *A. paniculata.* Pers. l. c. Rispenblüthige Andromede. In Virgin. —. K. H. ♄.

4. *A. axillaris.* Pers. l. c. Winkelblättrige Andromede. In Virgin. Carol. u. Georgien. — K. H. ♄.

5. *A. acuminata.* Pers. l. c. Zugespitzte Andromede. In Nordamer. —. K. H. ♄.
A. lucida. Jacq. ic. rar. 1. t. 79. Collect. 1. p. 95.

6. *A. serratifolia.* Catal. hort. carlsruh. 1. p. 18. Sägeblättrige Andromede. —. K. H. ♄.

7. *A. calyculata.* Pers. l. c. Gekelchte Andromede. In Eur. Asien u. Nordamer. —. K. H. ♄.

8. *A. crispa.* Hort. paris. Krause Andromede. —. —. K. H. ♄.

406. Arbutus, Sandbeere.

1. *A. Unedo.* Pers. l. c. 1. p. 482. Erdbeerartige Sandbeere. In Südeur. Croatien u. im Orient. Nov. — Jänn. K. H. ♄.

2. *A. Andrachne.* Pers. l. c. Candische Sandbeere. Im Orient. Nov. — Febr. K. H. ♄.

β. foliis serratis. Mit gesägten Blättern.

3. *A. Uva-ursi.* Pers. l. c. 1. p. 483. Gemeine Sandbeere. Im nördlichen u. auf Alpen in Südeur. Jun. Jul. K. H. ♄.

407. Clethra, Clethra.

1. *Cl. alnifolia.* Pers. l. c. Ellerblättrige Clethra. In Pensylv. Jun. Jul. Ch. ♄.

2. *Cl. pubescens.* Willd. enum. 1. p. 455. Weichhaarige Clethra. In Carolina. Jun. Jul. K. H. ♄.
Cl. incana. Pers. l. c.

3. *Cl. arborea.* Pers. l. c. Baumartige Clethra. Zu Madera. Jun. Jul. Ch. ♄.

408. Pyrola, Wintergrün.

1. *P. rotundifolia.* Pers. l. c. Rundblättriges Wintergrün. In Waldungen v. Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

2. *P. secunda.* Pers. l. c. Einseitiges Wintergrün. In Wäldern v. Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

409. Styrax, Storax.

1. *St. officinale.* Pers. l. c. Aechter Storax. In Syrien, Judäa u. Italien. —. K. H. ♄.

410. Terminalia, Catappenbaum.

1. *T. Benzoë.* Pers. l. c. 1. p. 485. Schmalblättriger Catappenbaum. In Ostind. Jun. W. H. ♄.
T. angustifolia. Jacq. hort. vind. 3. p. 51. t. 100.

DIGYNIA.

411. Royena, Royene.

1. *R. lucida.* Pers. l. c. 1. p. 486. Glänzende Royene. Am Cap. Jul. Ch. ♄.

2. *R. glabra.* Pers. l. c. Glatte Royene. Am Cap. —. Ch. ♄.

3. *R. pubescens.* Willd. enum. 1. p. 457. Weichhaarige Royene. Am Cap. —. Ch. ♄.
R. hirsuta. Pers. l. c.

4. *R. hirsuta.* Willd. l. c. Haarige Royene. Am Cap. —. Ch. ♄.

5. *R. polyandra.* Pers. l. c. Vielfädige Royene. Am Cap. —. Ch. ♄.

6. Eine noch unbeschriebene der vorhergehenden ähnliche Art, die ebenfalls am Cap zu Hause ist.

412. Hydrangea, Hydrangea.

1. *H. arborescens.* Lin. sp. pl. p. 568. Baumartige Hydrangea. Auf Bergen in Virginien u. Carol. May. K. H. ♄.
H. vulgaris. Pers. l. c.

2. *H. hortensis.* Smith ic. pict. 1. p. 12. t. 12. Garten-Hydrangea. in China u. Japan. Jun. — Aug. Ch. ♄.
Hortensia speciosa. Pers. l. c. 1. p. 505.
—— opuloides. Lam encycl. 3. p. 136.

3. *H. radiata.* Lam. illustr. gen. t. 370. f. 2. Herzblättrige Hydrangea. In Nordamer. Jul. Aug. K. H. ♄.
H. nivea. Pers. l. c.

4. H. *quercifolia.* Bartram itin. ed. germ. p. 366. t. 7. Eichenblättrige Hydrangea. In Florida. Jul. Aug. K. H. ♄.

413. Saxifraga, Steinbrech.

1. *S. intacta.* Willd. hort. berol. 2. p. 75. t. 75. Unversehrter Steinbrech. Auf Tyroleralpen. Jun. Jul. Im F. 2.

2. *S. crassifolia.* Pers. l. c. 1. p. 488. Dickblättriger Steinbrech. Auf Alpen in Sibirien. Apr. May. Im F. 2.

3. *S. sarmentosa.* Pers. l. c. Wuchernder Steinbrech. In China u. Japan. Jun. Jul. Im F. 2.

4. *S. umbrosa.* Pers. l. c. Schattenliebender Steinbrech. Auf Bergen in England. Jun. Jul. Im F. 2.

5. *S. cuneifolia.* Pers. l. c. Keilblättriger Steinbrech. Auf Alpen in Oesterr. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 2.

6. *S. oppositifolia.* Lin. sp. pl. p. 575. Paarblättriger Steinbrech. Auf Alpen in der Schweiz, Lappland, den Spitzbergen u. den Pyrenäen. Jun. Jul. Im F. 2.
S. coerulea Pers. l. c.

7. *S. Geum.* Pers. l. c. Nierenblättriger Steinbrech. Auf europ. Alpen Jun. Jul. Im F. 2.

8. *S. rotundifolia.* Pers. l. c. 1. p. 489. Rundblättriger Steinbrech. Auf Alpen in Oesterr. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 2.

9. *S. decipiens.* Pers. l. c. 1. p. 490. Trüglicher Steinbrech. Auf Niederalpen in Deutschland u. England. Jun. Jul. Im F. 2.

414. Gypsophila, Gypskraut.

1. *G. repens.* Pers. l. c. 1. p. 492. Kriechendes Gypskraut. Auf Bergen in Oesterr. der Schweiz u. den Pyrenäen. May, Jun. Im F. 24.

2. *G. paniculata.* Pers l. c. Rispenblüthiges Gypskraut. In Sibir. u. der Tartarey. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *G. Saxifraga.* Pers. l. c. Steinbrechartiges Gypskraut. In Oesterr. der Schweiz u. Frankr. Jun. — Aug. Im F. 24.

415. Saponaria, Seifenkraut.

1. *S. officinalis.* Pers. l. c. Gemeines Seifenkraut. In Mitteleur. an Bächen. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *S. Ocymoides.* Pers. l. c. Rundblättriges Seifenkraut. In der Schweiz, Ital. u. Montpellier. Jun. — Aug. K. H. 24.

416. Dianthus, Nelke.

1. *D. barbatus.* Pers. l. c. 1. p. 493. Bart-Nelke. In Deutschl. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *D. asper.* Willd. enum. 1. p. 466. Rauhe Nelke. In Tyrol u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *D. carthusianorum.* Pers. l. c. Feld-Nelke. Auf sonnigen Stellen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *D. Armeria.* Pers. l. c. Büschel-Nelke. Auf dürrem Boden in Eur. Jun. Jul. Im F. ⊙.

5. *D. prolifer.* Pers l. c. Sprossende Nelke. Auf Hügeln im südlicher. Eur. u. den Linienwällen Wiens. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *D. Caryophyllus.* Pers. l. c. Garten-Nelke. In Ital. Jul. Aug. K. H. 24.

7. *D. sylvestris.* Pers. l. c. Wilde Nelke. In der Schweiz, Krain u. Kärnthen. Jun Jul. Im F. 24.

8. *D. fruticosus.* Pers. l. c. Strauchartige Nelke. In Griechenl. Jul. — Sept. K. H. ♄.

9. *D. chinensis.* Pers. l. c. 1. p. 494. Chinesische Nelke. In China. Jun. — Aug. Im F. ☉.

10. *D. deltoides.* Pers. l. c. Deltafleckige Nelke. In Eur. Jul. Im F. 24.

11. *D. plumarius.* Pers. l. c. Feder-Nelke. In Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

12. D. *superbus.* Pers. l. c. 1. p. 495. Stolze Nelke. Auf feuchten Waldwiesen in Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

13. *D. alpinus.* Pers. l. c. Alpen-Nelke. In Oesterr. Steyerm. u. Sibir. Jun. Jul. K. H. 24.

TRIGYNIA.

417. Cucubalus, Taubenkropf.

1. *C. Behen.* Pers. l. c. Aufgeblasener Taubenkropf. Auf Wiesen im nördlichen Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *C. maritimus.* Pers. l. c. 1. p. 496. Meerstrands-Taubenkropf. In Südfrankr. am Meerstrande. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *C. italicus.* Jacq. obs. bot. 4. p. 12. t. 79. Italienischer Taubenkropf. In Italien. Jun. — Aug. Im F. 24.
Silene italica. Pers. l. c. 1. p. 498.

418. Silene, Silene.

1. *S. quinquevulnera.* Pers. l. c. Fünffleckige Silene. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ⊙.

2. *S. nutans.* Pers. l. c. Hängende Silene. In Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *S. fruticosa.* Pers. l. c. 1. p. 497. Strauchartige Silene. In Sicil. Jun. Jul. K. H. ♄.

4. *S. viridiflora.* Pers. l. c. Grünblüthige Silene. In Ungarn, Portugall. u. Spanien. Jun. Jul. Im F. ♂.

5. *S. gigantea.* Pers. l. c. Hohe Silene. In Africa. Jun. — Aug. K. H. ♂.

6. *S. ornata.* Pers. l. c. 1. p. 498. Dunkelfarbige Silene. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♂.

7. *S. bipartita.* Pers. l. c. 1. p. 499. Zweytheilige Silene. In Sibir. Jun. — Aug. K. H. ⊙.

8. *S. Armeria.* Pers. l. c. Garten-Silene. In Engl. u. Frankr. Jun. — Aug. Im F. ⊙.

9. *S. alpestris.* Pers. l. c. 1. p. 500. Alpen-Silene. Auf den Oesterr. Alpen. Jun. — Aug. K. H. 24.

10. *S. acaulis.* Pers. l. c. Stiellose Silene. Auf Europ. Alpen. Jun. — Aug. K. H. 24.

419. Stellaria, Sternmiere.

1. *St. graminea.* Pers. l. c. 1. p. 501. Grasartige Sternmiere. Auf trockenen Triften in Eur. May. Im F. 24.

420. Arenaria, Sandkraut.

1. *A. glandulosa.* Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 56. t. 355. Drüsiges Sandkraut. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 24.

2. *A. graminifolia.* Willd. enum. 1. p. 481. Grasblättriges Sandkraut. In Sibir. der Ukrain u. Tartarey. Jun. Jul. Im F. 24.

421. Malpighia, Malpighie.

1. *M. glabra.* Pers. l. c. 1. p. 505. Glatte Malpighie. In Jamaica, Curassao, Surinam u. Brasilien. May, Jun. W. H. ♄.

2. *M. glandulifera.* Jacq. collect. 4. p. 207. Ic. rar. 3. t. 469. Drüsentragende Malpighie. In Wäldern zu Caracas. Jun. Jul. W. H. ♄.
M. glandulosa β glandulifera. Pers. l. c.

3. *M. argentea.* Jacq. fragm. bot. p. 57. n. 186. t. 83. Silberne Malpighie. Zu Caracas. Jul. Aug. W. H. ♄.

4. *M. tuberculata.* Pers. l. c. Warzige Malpighie. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. ♄.

5. *M. urens.* Pers. l. c. 1. p. 506. Brennende Malpighie. Im wärmer. America. —. W. H. ♄.

6. *M. coccifera.* Pers. l. c. Stachelblättrige Malpighie. Im wärmer. Amer. —. W. H. ♄.

7. M.? Von der Insel Providenz.

422. Banisteria, Banisterie.

1. *B. angulosa.* Pers. l. c. Eckige Banisterie. Im wärmer. Amer. Jun. W. H. ♄.

2. *B. ciliata.* Pers. l. c. 1. p. 507. Gefranzte Banisterie. In Brasilien. Jun. Jul. W. H. ♄.

3. *B. chrysophylla.* Pers. l. c. Goldblättrige Banisterie. In Brasilien u. zu Caracas. Jun. — Aug. W. H. ♄.

4. *B. tomentosa.* Desfont. cat. hort. paris. p. 136. Filzige Banisterie. In Südamer. —. W. H. ♄.

5. *B. laurifolia.* Pers. l. c. Lorbeerblättrige Banisterie. In Hispaniola u. Jamaica. —. W. H. ♄.

6. Eine noch unbeschriebene Art v. Caracas.

PENTAGYNIA.

423. Cotyledon, Nabelkraut.

1. *C. orbiculata.* Pers. l. c. 1. p. 510. Kreisblättriges Nabelkraut. Am Cap. —. Ch. ♄.

2. *C. paniculata?* Pers. l. c. Rispenblüthiges Nabelkraut. Am Cap. —. Ch. ♄.

3. *C. fascicularis.* Pers. l. c. Büschelblättriges Nabelkraut. Am Cap. —. Ch. ♄.

4. *C. Umbilicus.* Pers. l. c. Gemeines Nabelkraut. In Portugall, Span. u. Engl. May, Jun. K. H. 2|.

5. *C. hemisphaerica.* Pers. l. c. Halbkugelförmiges Nabelkraut. In Aethiop. Jul. Aug. Ch. ♄.

6. *C. coccinea.* Pers. l. c. Scharlachrothes Nabelkraut. —. Febr. Ch. ♄.

7. *C. spuria.* Pers. l. c. Bastard-Nabelkraut. Am Cap. —. Ch. ♄.

8. *C. tuberculosa.* Pers. l. c. 1. p. 511. Höckeriges Nabelkraut. Am Cap. —. Ch. ♄.

9. *C. ungulata.* Pers. l. c. Hufförmiges Nabelkraut. In Africa. —. Ch. ♄.

424. Sedum, Mauerpfeffer.

1. *S. Telephium.* Pers. l. c. 1. p. 511. Knolliger Mauerpfeffer. Auf trockenen Hügeln v. Eur. Aug. Sept. Im F. 24.

2. *S. Anacampseros.* Pers. l. c. Rundblättriger Mauerpfeffer. Auf Felsen in der Provence u. Ital. May, Jun. Im F. 24.

3. *S. Cotyledon.* Jacq. eclog. fasc. 2. p. 27. t. 17. Nabelkraut-Mauerpfeffer. —. Jun. Jul. Ch. 24.

4. *S. Aizoon.* Pers. l. c. Gelber Mauerpfeffer. Sibir. May, Jun. Im F. 24.

5. *S. hybridum.* Pers. l. c. Gamanderblättriger Mauerpfeffer. In der Tartarey. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *S. populifolium.* Pers. l. c. Pappelblättriger Mauerpfeffer. Auf Alpen in Sibir. Jun. Jul. Im F. ♄.

7. *S. Rhodiola.* Decand. pl. succ. p. 143. t. 143. Rosenwurzartiger Mauerpfeffer. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz, Schlesien, Lappland u. England. Jun. Jul. Im F. 24.
Rhodiola rosea. Pers. l. c. 2. p. 625.

8. *S. spinosum.* Willd. enum. 1. p. 485. Stachliger Mauerpfeffer. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.
Crassula spinosa. Pers. l. c. 1. p. 339.

9. *S. dasyphyllum.* Pers. l. c. 1. p. 512. Bereifter Mauerpfeffer. Auf Felsen in Südeur. besonders der Schweiz. Jun. Jul. K. H. 24.

10. *S. reflexum.* Pers. l. c. Zurückgebogener Mauerpfeffer. Am Fufse der Berge in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

11. *S. rupestre.* Pers. l. c. Felsen-Mauerpfeffer. Auf Felsen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

425. Oxalis, Sauerklee.

1. *O. monophylla.* Pers. l. c. 1. p. 514. Einblättriger Sauerklee. Ist, wie alle folgende, bey welchen das Vaterland nicht angegeben ist, am Cap zu Hause. Nov. Dec. Ch. 24.

2. *O. lepida.* Pers. l. c. Niedlicher Sauerklee. Oct. — Dec. Ch. 24.

3. *O. rostrata.* Pers. l. c. Schnabelförmiger Sauerklee. Oct. — Dec. Ch. 24.

4. *O. asinina.* Pers. l. c. Eselsohrblättriger Sauerklee. Nov. Ch. 24.

5. *O. leporina.* Pers l. c. Hasenohrblättriger Sauerklee. Nov. Ch. 24.

6. *O. crispa.* Pers. l. c. Krauser Sauerklee. Oct. Nov. Ch. 24.

7. *O. fabaefolia.* Pers. l. Bohnenblättriger Sauerklee. Oct. Ch. 24.

8. *O. undulata.* Pers. l. c. Wellenblättriger Sauerklee. Oct. Nov. Ch. 4.

9. *O. virginea.* Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 13. t. 275. Blafser Sauerklee. Sept. Oct. Ch. 4.

10. *O. fuscata.* Pers. l. c. Braunfleckiger Sauerklee. Sept. Oct. Ch. 4.

11. *O. exaltata.* Pers. l. c. Steifschaftiger Sauerklee. Dec. Ch. 4.

12. *O. grandiflora.* Pers. l. c. 1. p. 515. Grofsblüthiger Sauerklee. Nov. Dec. Ch. 4.

13. *O. purpurea.* Pers. l. c. Purpurblüthiger Sauerklee Sept. Oct. Ch. 4.

14. *O. laxula.* Pers. l. c. Schlaffer Sauerklee. Oct. — Dec. Ch. 4.

β. floribus rubris. Mit rothen Blüthen.

15. *O. speciosa.* Pers. l. c. Schönster Sauerklee. Sept. Oct. Ch. 4.

β. suggillata. Mit blaurothen Blattstielen.
γ. rigidula. Mit steifen Blattstielen.

16. *O. Acetosella.* Pers. l. c. Gemeiner Sauerklee. In schattigen Hainen v. ganz Eur. u. Japan. Apr. — Jun. Im F. 4.

17. *O. marginata.* Pers. l. c. Randblättriger Sauerklee. Oct. Ch. 4.

18. *O. pulchella.* Pers. l. c. Schöner Sauerklee. Oct. Ch. 4.

19. *O. punctata.* Pers. l. c. Punktirter Sauerklee. Oct. Ch. 4.

20. *O. pusilla.* Pers. l. c. 1. p. 516. Niedriger Sauerklee. Dec. Ch. 4.

21. *O. cruentata.* Jacq. eclog. fasc. 5. p. 66. t. 45. Blutfleckiger Sauerklee. Apr. May. Ch. 24.

22. *O. compressa.* Pers. l. c. Flachstieliger Sauerklee. Jän. Febr. Ch. 24.

23. *O. tetraphylla.* Pers. l. c. Vierblättriger Sauerklee In Mexico. Jun. Jul. Ch. 24.

24. *O. violacea.* Pers. l. c. Violeter Sauerklee. In Virgin. u. Canada. Bl. den ganzen Sommer hindurch. Ch. 24.

25. *O. cernua.* Pers. l. c. Hängender Sauerklee. Oct. — Febr. Ch. 24.

26. *O. dentata.* Pers. l. c. Gezähnter Sauerklee. Nov. Ch. 24.

27. *O. livida.* Pers. l. c. Blaublättriger Sauerklee. Nov. Dec. Ch. 24.

28. *O. purpurata.* Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 57. t. 356. Purpurblättriger Sauerklee. Nov. Dec. Ch. 24.

29. *O. convexula.* Pers. l. c. 1. p. 517. Bogigblättriger Sauerklee. Nov. Dec. Ch. 24.

30. *O. versicolor.* Pers. l. c. Bunter Sauerklee. Sept. Oct. Ch. 24.

31. *O. elongata.* Pers. l. c. Langstieliger Sauerklee. Sept. Oct. Ch 24.

32. *O. polyphylla.* Pers. l. c. Vielblättriger Sauerklee. Oct. — Dec. Ch. 24.

33. *O. hirta.* Pers. l. c. Rauher Sauerklee. Sept. Oct. Ch. 24.

34. *O. multiflora.* Pers. l. c. 1. p. 518. Vielblüthiger Sauerklee. Oct. Nov. Ch. 24.

35. *O. rubella.* Pers. l. c. Röthlicher Sauerklee. Oct. — Dec. Ch. 4.

36. *O. reptatrix.* Pers. l. c. Wuchernder Sauerklee. Nov. Dec. Ch. 4.

37. *O. incarnata.* Pers. l. c. Fleischfarbigblättriger Sauerklee. Nov. Dec. Ch. 4.

38. *O. stricta.* Pers. l. c. Steifer Sauerklee. In Virgin. u. Jamaica. May — Aug. Im F. 4.

39. *O. pectinata.* Pers. l. c. 1. p. 519. Langblättriger Sauerklee. Sept. Oct. Ch. 4.

β. floribus plenis. Mit gefüllten Blüthen.

40. *O. flabellifolia.* Pers. l. c. Fächerblättriger Sauerklee. Sept. Oct. Ch. 4.

41. *O. flava.* Pers. l. c. Gelber Sauerklee. Sept. Ch. 4.

42. *O. corniculata.* Pers. l. c. Gehörnter Sauerklee. In Südeur. u. Japan. Jun. — Aug. Im F. 4.

43.)
44.)
45.) Noch unbeschriebene Capische Arten.
46.)
47.)

426. Agrostemma, Raden.

1. *A. Coronaria.* Pers. l. c. Garten-Raden. In Ungarn, Ital. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. ♂.

β. floribus plenis. Mit gefüllten Blüthen.

2. *A. Flos jovis.* Pers. l. c. 1. p. 520. Doldentraubiger Raden. In der Schweiz, der Pfalz u. Südfrankr. Jun. Jul. Im F. 4.

3. *A. Coeli rosa.* Pers. l. c. Glattblättriger Raden. In Sicilien u. im Orient. Jun. Jul. Im F. ⊙.

427. Lychnis, Lichtröslein.

1. *L. chalcedonica.* Pers. l. c. Scharlachrothes Lichtröslein. In ganz Russland. Jun. Im F. 4.

2. *L. Flos cuculi.* Pers. l. c. Kuckucks-Lichtröslein. Auf feuchten Wiesen in Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

3. *L. coronata.* Pers. l. c. Grofsblüthiges Lichtröslein. In China u. Japan. Jul. Ch. 4.
L. grandiflora. Jacq. ic. rar. 1. t. 84. Collect. 1. p. 149.

4. *L. Viscaria.* Pers. l. c. Klebriges Lichtröslein. Auf trockenen Wiesen in Eur. Jun. Jul. Im F. ♂.

5. *L. dioica.* Pers. l. c. Gemeines Lichtröslein. Zwischen den Saaten in Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

6. *L. laeta.* Pers. l. c. Angenehmes Lichtröslein. In Portugall. Jun. Jul. Im F. ⊙.

DECAGYNIA.

428. Phytolacca, Kermesbeere.

1. *Ph. octandra.* Pers. l. c. 1. p. 522. Achtfädige Kermesbeere. In Mexico. Jun. Jul. Ch. 4.

2. *Ph. abyssinica.* Pers. l. c. 1. p. 523. Abyssinische Kermesbeere. In Abyssinien. —. W. H. ♄.

3. *Ph. decandra.* Pers. l. c. Zehnfädige Kermesbeere. In Virgin. Jun. Jul. Im F. ♃.

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

429. Asarum, Haselwurz.

1. *A. europaeum.* Pers. l. c. 2. p. 1. Europäische Haselwurz. In Hainen v. Eur. Apr. Im F. ♃.

430. Bocconia, Bocconie.

1. *B. frutescens.* Pers. l. c. Strauchartige Bocconie. In Westind. Dec. — Febr. W. H. ♄.

2. *B. cordata.* Pers. l. c. Herzblättrige Bocconie. In China. Jul. Aug. K. H. ♃.

431. Halesia, Halesie.

1. *H. tetraptera.* Pers. l. c. 2. p. 4. Vierflügliche Halesie. In schattigen Wäldern zu Carolina. Jun. K. H. ♄.

432. Decumaria, Decumarie.

1. *D. barbara.* Pers. l. c. Gemeine Decumarie. In Carol. Jun. K. H. ♄.

433. Canella, Canellbaum.

1. *C. alba.* Pers. l. c. Weifser Canellbaum. In den innern Wäldern v. Ostind. Jun. Jul. W. H. ♄.

434. Triumfetta, Triumfette.

1. *Tr. Lappula.* Pers. l. c. 2. p. 5. Kelchlose Triumfette. In Jamaica, Brasilien u. den Bermudischen Inseln. Jun. Jul. W. H. ♄.

2. *Tr. semitriloba.* Pers. l. c. Dreylappige Triumfette. Im wärmer. Amer. Dec. — März. W. H. ♄.

435. Portulaca, Portulak.

1. *P. pilosa.* Pers. l. c. 2. p. 6. Haariger Portulak. In Südamer. Jun. Jul. Ch. ☉.

436. Talinum, Talinum.

1. *T. Anacampseros.* Pers. l. c. Nabelkrautartiges Talinum. Am Cap. —. Ch. ♄.

2. *T. filamentosum.* Curt. bot. mag. t. 1367. Vielfädiges Talinum. Am Cap. —. Ch. ♄.

437. Lythrum, Weiderich.

1. *L. Salicaria.* Pers. l. c. 2. p. 7. Gemeiner Weiderich. An Bächen in Eur. Jun. Jul. Im F. 2.

2. *L virgatum.* Pers. l. c. Ruthenförmiger Weiderich. In Oesterr. Sibirien u. der Tartarey auf trockenen Heiden. Jun. Jul. Im F. 2.

DIGYNIA.

438. Heliocarpus, Sonnenfrucht.

1. *H. americana.* Pers. l. c. 2. p. 9. Americanische Sonnenfrucht. Auf Veracrux. Febr. März. W. H. ♄.

2. *H*? Von Caracas.
Heliocarpus americana. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 26. t. 453.

439. Agrimonia, Odermennig.

1. *A. Eupatoria.* Pers. l. c. Gemeiner Odermennig. In Europ. Wäldern. Jul. Aug. Im F. 4.

2. *A. odorata.* Pers. l. c. Wohlriechender Odermennig. In Ital. Jun. Jul. Im F. 4.

TRIGYNIA.

440. Reseda, Resede.

1. *R. lutea.* Pers. l. c. 2. p. 10. Gelbe Resede. (Wau). In Deutschl. Ital. u. Frankr. Jun. — Aug. Im F. ⊙.

2. *R. odorata.* Pers. l. c. Wohlriechende Resede. In Aegypten. Blüht den ganzen Sommer hindurch. K. H. ♂.

441. Aristotelia, Aristotelie.

1. *A. Macqui.* Pers. l. c. Chilische Aristotelie. In Chili. May, Jun. Ch. ♄.

442. Euphorbia, Wolfsmilch.

1. *E. antiquorum.* Pers. l. c. Wahre Wolfsmilch. In Ind. u. Aegypt. —. W. H. ♄.

2. *E. trigona.* Mill. dict. n. 2. Dreyeckige Wolfsmilch. In Westind. —. W. H. ♄.

3. *E. canariensis.* Pers. l. c. Canarische Wolfsmilch. Auf den Canarisch. Inseln. —. Ch. ♄.

4. *E. cereiformis.* Pers. l. c. Fackeldistelartige Wolfsmilch. In Aethiop. —. Ch. ♄.

5. *E. officinarum.* Pers. l. c. Harzbringende Wolfsmilch. Im wärmer. Africa. —. W. H. ♄.

6. *E. nereifolia.* Pers. l. c. 2. p. 11. Oleanderblättrige Wolfsmilch. In Ostind. —. W. H. ♄.

7. *E. loricata.* Pers. l. c. Vieldornige Wolfsmilch. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.
E. Histrix. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 43. t. 207.

8. *E. Caput medusae.* Pers. l. c. Medusenhaupt-Wolfsmilch. Am Cap u. in Aethiop. —. Ch. ♄.

9. *E. Ornithopus.* Jacq. fragm. bot. p. 76. n. 238. t. 120. f. 2. Vogelfußartige Wolfsmilch. Am Cap? Jun. Jul. Ch. ♄.

10. *E. bupleurifolia.* Pers. l. c. Hasenöhrlein-Wolfsmilch. Am Cap. März, Apr. Ch. ♄.

11. *E. mauritanica.* Pers. l. c. Mauritanische Wolfsmilch. In Africa. Jul. Aug. W. H. ♄.

12. *E. bracteata.* Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 14. t. 276. Beblätterte Wolfsmilch. —. Apr. — Aug. W. H. ♄.

13. *E. atropurpurea.* Willd. enum. 1. p. 501. Dunkelrothe Wolfsmilch. Zu Teneriffa. —. W. H. ♄.

14. *E. piscatoria.* Pers. l. c. Fischer-Wolfsmilch. Auf Madera u. den Canarischen Inseln. —. Ch. ♄.

15. *E. biglandulosa.* Willd. enum. suppl. p. 27. Zweydrüsige Wolfsmilch. —. —. W. H. ♄.

16. *E. Tithymaloides.* Pers. l. c. Saftige Wolfsmilch. Im wärmer Amer. —. W. H. ♄.

17. *E. cyatophora.* Pers. l. c. 2. p. 12. Geigenblättrige Wolfsmilch. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. W. H. ♄.

18. *E. nudiflora.* Pers. l. c. Nacktblüthige Wolfsmilch. —. Jun. Jul. W. H. ♄.

19. *E. mellifera.* Pers. l. c. Honigbringende Wolfsmilch. Auf Madera. Jun. Jul. Ch. ♄.

20. *E. linariifolia.* Pers. l. c. Löwenmaulblättrige Wolfsmilch. —. Aug. — Oct. Ch. ♄.

21. *E. picta.* Pers. l. c. 2. p. 13. Bemahlte Wolfsmilch. Auf Venezuela. —. W. H. 4.

22. *E. spartioides.* Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 44. t. 486. Pfriemenartige Wolfsmilch. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

23. *E. Lathyris.* Pers. l. c. 2. p. 15. Kreuzblättrige Wolfsmilch. In Deutschl. Ital. Frankr. u. der Schweiz. Aug. Im F. ♂.

24. *E. laeta.* Pers. l. c. Seidelbastblättrige Wolfsmilch. —. Jun. Jul. Ch. ♄.
E. divaricata. Jacq. ic. rar. t. 87. Collect. 1. p. 58.

25. *E. nummulariaefolia.* Willd. enum. 1. p. 503. Pfennigkrautblättrige Wolfsmilch. —. —. Ch. ♄.

26. *E. dulcis.* Lin. sp. pl. p. 656. Süsse Wolfsmilch. In Waldungen v. Oesterr. Deutschl. Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. ☉.
E. purpurata. Pers. l. c. 2. p. 16.

27. *E. portlandica.* Pers. l. c. Englische Wolfsmilch. In England. Jun. Jul. K. H. ♄.

28. *E. palustris.* Pers. l. c. 2. p. 18. Sumpf-Wolfsmilch. In Deutschl. Niederland. u. Südschweden. Jul. Aug. Im F. 4.

29. *E. Characias.* Pers. l. c. 2. p. 19. Thal-Wolfsmilch. In Frankr. Span. u. Ital. Jun. — Dec. K. H. ♄.

30. *E. veneta.* Willd. enum. 1. p. 507. Venetianische Wolfsmilch. Im Venetianischen am Meeresstrande. Jul. Aug. K. H. ♄.

31. Eine noch unbeschriebene Art.

443. Visnea, Visnea.

1. *V. Mocanera.* Pers. l. c. Canarische Visnea. Auf waldigen Bergen der Canarisch. Inseln. —. Ch. ♄.

DODECAGYNIA.

444. Sempervivum, Hauswurz.

1. *S. arboreum.* Pers. l. c. 2. p. 20. Baumartige Hauswurz. In Portugal, Candien, Corfu u. Zante. May, Jun. K. H. ♄.

β. foliis luteo-marginatis. Mit gelbgeränderten Blättern.

2. *S. canariense.* Pers. l. c. Canarische Hauswurz. Auf den Canarischen Inseln. May, Jun. K. H. ♄.

3. *S. glutinosum.* Pers. l. c. Klebrige Hauswurz. Zu Madera. Febr. — May. Ch. ♄.

4. *S. globiferum.* Pers. l. c. Kugelknospige Hauswurz. Auf Alpen in Oesterr. Deutschl. u. Rufsland. Jun. Jul. Im. F. 4.

5. *S. tortuosum.* Pers. l. c. Gedrehte Hauswurz. Auf den Canarischen Inseln. —. K. H. ♄.

6. *S. stellatum.* Pers. l. c. Sternförmige Hauswurz. Auf dem Monte Baldo. Jun. Jul. K. H. ☉.

7. *S. arachnoideum.* Pers. l. c. Spinnenwebenartige Hauswurz. Auf Alpen in Tyrol, Ital. der Schweiz u. den Pyrenäen. Jul. Aug. K. H. 4.

8. *S. sediforme.* Jacq. hort. vindob. 1. p. 35. t. 81. Mauerpfefferartige Hauswurz. In Südeur. Jun. Jul. Im F. 4.
Sedum altissimum. Pers. l. c. 1. p. 512.

9. *S. monanthos.* Pers. l. c. Einblüthige Hauswurz. Auf den Canarischen Inseln. Jun. Jul. K. H. 4.

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

445. Cactus, Fackeldistel.

1. *C. mamillaris.* Pers. l. c. 2. p. 22. Warzentragende Fackeldistel. Auf Felsen im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. ♄.

2. *C. coronatus.* Willd. enum. suppl. p. 30. Gekrönte Fackeldistel. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. ♄.

3. *C. stellatus.* Willd. l. c. Gesternte Fackeldistel. Im wärmer. Amer. März, Jul. W. H. ♄.

4. *C. abnormis.* Willd. l. c. p. 31. Abweichende Fackeldistel. Im wärmer. Amer. —. W. H. ♄.
C. monstrosus. Hort. paris.

5. *C. cylindricus.* Pers. l. c. Walzenförmige Fackeldistel. In Peru. —. W. H. ♄.

6. *C. serpentinus.* Willd. l. c. Schlangenförmige Fackeldistel. —. —. W. H. ♄.

7. *C. speciosus.* Willd. l. c. Schöne Fackeldistel. —. Jun. Jul. W. H. ♄.

8. *C. tetragonus.* Pers. l. c. Viereckige Fackeldistel. Zu Curassao. —. W. H. ♄.

9. *C. pentagonus.* Pers. l. c. Fünfeckige Fackeldistel. In Südamer. —. W. H. ♄.

10. *C. hexagonus.* Pers. l. c. Sechseckige Fackeldistel. Zu Surinam. Jul. W. H. ♄.

11. *C. peruvianus.* Pers. l. c. Peruvianische Fackeldistel. In Peru. —. W. H. ♄.

12. *C. repandus.* Pers. l. c. Ausgeschweifte Fackeldistel. Im wärmer Amer. Jun. —. Aug. W. H. ♄.

13. *C. niger.* Hort. dyckensis. Schwarze Fackeldistel. In Südamer. —. W. H. ♄.

14. *C. flavispinus.* Hort. dyck. Gelbstachlige Fackeldistel. In Südamer. —. W. H. ♄.

15. *C. Royeni.* Pers. l. c. 2. p. 23. Royensche Fackeldistel. Im wärmer. Amer. —. W. H. ♄. C. crenulatus. Hort. dyck.

16. *C. eburneus.* Hort. dyck. Elfenbeinstachlige Fackeldistel. In Curassao. —. W. H. ♄.

17. *C. multangularis.* Willd. l. c. p. 33. Vieleckige Fackeldistel. —. —. W. H. ♄.

18. *C. grandiflorus.* Pers. l. c. Grofsblumige Fackeldistel. In Jamaica u. Veracrux. Jun. Jul. W. H. ♄.

19. *C. reptans.* Willd. l. c. Kriechende Fackeldistel. In Südamer. —. W. H. ♄.

20. *C. flagelliformis.* Pers. l. c. Peitschenförmige Fackeldistel. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. ♄.

21. *C. pendulus.* Pers. l. c. Hängende Fackeldistel. Zu Jamaica u. Hispaniola. Bl. den ganzen Sommer hindurch. W. H. ♄.
Rhipsalis Cassuta. Gaertn. de sem. 1. p. 137. t. 28. f. 1.

22. *C. parasiticus.* Pers. l. c. Schmarozende Fackeldistel. In Westind. u. Südamer. —. W. H ♄.

23. *C. triangularis.* Pers. l. c. Dreyeckige Fackeldistel. In Brasilien, Jamaica u. Martinique. —. W. H. ♄.

24. *C. triqueter.* Willd. l. c. Dreyseitige Fackeldistel. In Westind. u. Südamer. —. W. H. ♄.

25. *C. brasiliensis.* Willd. l. c. Brasilianische Fackeldistel. In Brasilien. —. W. H. ♄.

26. *C. monacanthos.* Willd. l. c. Einstachlige Fackeldistel. In Südamer. —. W. H. ♄.

27. *C. Opuntia.* Pers. l. c. Gemeine Fackeldistel. In Peru. u. Virgin. jetzt auch in Südtyrol, der Südschweiz, Ital. Minorca, Spanien u. Portugall. May, Jun. K. H. ♄.

28. *C. polyanthos.* Decand. pl. succul. fasc. 24. n. 138. Vielblumige Fackeldistel. In Südamer. —. W. H. ♄.
C. Opuntia β polyanthos. Pers. l. c.

29. *C. setaceus.* Hort. dyck. Borstige Fackeldistel. In Südamer. —. W. H. ♄.

30. *C. Ficus indica.* Pers. l. c. Indische Fackeldistel. Im wärmer. Amer. —. W. H. ♄.

31. *C. decumanus.* Willd. l. c. p. 34. Grofse Fackeldistel. —. —. W. H. ♄.

32. *C. elongatus.* Willd. l. c. Verlängerte Fackeldistel. —. —. W. H. ♄.

33. *C. Tuna.* Pers. l. c. Breite Fackeldistel. Im wärmer. Amer. u. Jamaica. —. W. H. ♄.

34. *C. elatior.* Willd. l. c. Hohe Facke distel. Auf der Insel St. Eustach. —. W. H. ♄. C. Tuna β elatior. Pers. l. c.

35. *C. triacanthos.* Willd. l. c. Dreystachlige Fackeldistel. In Westind. —. W. H. ♄.

36. *C. inermis.* Hort. dyck. Wehrlose Fakeldistel. In Südamer. —. W. H. ♄.

37. *C. curassavicus.* Pers. l. c. Curassavische Fackeldistel. In Curassao. —. W. H. ♄.

38. *C. spinosissimus.* Pers. l. c. Vielstachlige Fackeldistel. In Jamaica. —. W. H. ♄.

39. *C. foliosus.* Willd. l. c. p. 35. Beblätterte Fackeldistel. —. —. W. H. ♄.

40. *C. pusillus.* Hort. dyck. Kleine Fackeldistel. In Südamer. —. W. H. ♄.

41. *C. alatus.* Pers. l. c. Geflügelte Fackeldistel. In Jamaica. —. W. H. ♄.

42. *C. Phyllanthus.* Pers. l. c. Dünngliedrige Fackeldistel. In Brasilien u. Surinam. Jun. — Aug. W. H. ♄.

43. *C. Pereskia.* Pers. l. c. Grofsblättrige Fackeldistel. Im wärmer. Amer. —. W. H. ♄.

44.) Eine noch unbeschriebene Art.

446. Philadelphus, Pfeifenstrauch.

1. *Ph. coronarius.* Pers. l. c. 2. p. 24. Wohlriechender Pfeifenstrauch. In Südeur. May, Jun. Im F. ♄.
β. nanus. Mit zwergartigem Wuchse.

2. *Ph. grandiflorus.* Willd. enum. 1. p. 511. Grofsblüthiger Pfeifenstrauch. In Nordamer. Jun. Im F. ♄.
Ph. inodorus. Hortulan.

447. Leptospermum, Südseemyrthe.

1. *L. scoparium.* Pers. l. c. Besenartige Südseemyrthe. Wächst wie die folgenden in Australien. —. Ch. ♄.
L. squarrosum. Gaert. de sem. 1. p. 174. t. 35.

2. *L. lanigerum.* Pers. l. c. Wollige Südseemyrthe. —. Ch. ♄.

3. *L. pubescens.* Pers. l. c. Weichbehaarte Südseemyrthe. Jul. Aug. Ch. ♄.

4. *L. juniperinum.* Pers. l. c. Wachholderblättrige Südseemyrthe. —. Ch. ♄.

5. *L. ambiguum.* Pers. l. c. Zweifelhafte Südseemyrthe. —. Ch. ♄.
Metrosideros corifolia. Vent. hort. malmais. p. 46. t. 46.

6. *L.? rubricaule.* Hort. paris. Rothstielige Südseemyrthe. —. Ch. ♄.

448. Fabricia, Fabricie.

1. *F. laevigata.* Pers. l. c. 2. p. 25. Glatte Fabricie. In Neuholl. —. Ch. ♄.

449. Metrosideros, Eisenmass.

1. *M. angustifolia.* Pers. l. c. Schmalblättriges Eisenmafs. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

2. *M. laurifolia.* Desfont. catalog. hort. paris. p. 171. In Neuholl. —. Ch. ♄.

3. *M. marginata.* Pers. l. c. Geändertes Eisenmafs. In Neuholl. Jun. Jul. Ch. ♄.

4. *M. linearis.* Pers. l. c. 2. p. 26. Linienblättriges Eisenmafs. In Neuholl. Jun. Jul. Ch. ♄.

5. *M. lanceolata.* Pers. l. c. Lanzenblättriges Eisenmafs. In Neuholl. Jun. Jul. Ch. ♄.
M. lophantha. Vent. hort. cels. p. 69. t. 69.
— citrina. Curt. bot. mag. t. 260.

6. *M. saligna.* Pers. l. c. Weidenartiges Eisenmafs. In Neuholl. —. Ch. ♄.

7. *M. pubescens.* Donn catalog. hort. cantabr. p. 145. Weichhaariges Eisenmafs. In Neuholl. —. Ch. ♄.

8. *M. myrtifolia.* Hort. paris. Myrthenblättriges Eisenmafs. In Neuholl. —. Ch. ♄.

9. *M. rigida.* Donn catalog. hort. cantabr. p. 145. Steifes Eisenmafs. In Neuholl. — Ch. ♄.

10. Eine noch unbeschriebene Art.

450. Melaleuca, Melaleuca.

1. *M. squarrosa.* Pers. l. c. Sparrige Melaleuca. Ist sammt den folgenden in Neuholland zu Hause. — Ch. ♄.
M. myrtifolia. Vent. hort. malmais. p. et t. 47.

2. *M. styphelioides.* Pers. l. c. Styphelienartige Melaleuca. —. Ch. ♄.
M. obliqua. Hortulan.

3. *M. ericaefolia.* Pers. l. c. Heidenartige Melaleuca. Jun. Jul. Ch. ♄.
M. alba. Hortulan.

4. *M. nodosa.* Pers. l. c. Knotige Melaleuca. —. Ch. ♄.

5. *M. thymifolia.* Pers. l. c. Quendelblättrige Melaleuca. —. Ch. ♄.

6. *M. hypericifolia.* Pers. l. c. 2. p. 27. Johanniskrautartige Melaleuca. —. Ch. ♄.

551. Psidium, Gujavabaum.

1. *Ps. pomiferum.* Pers. l. c. Aepfeltragender Gujavabaum. In beyden Ind. Jun. VV. H. ♄.

2. *Ps. guineense.* Pers. l. c. Africanischer Gujavabaum. Auf der Prinzeninsel bey Guinea. —. VV. H. ♄.

3. *Ps. montanum.* Pers. l. c. Berg-Gujavabaum. Auf Bergen in Jamaica. —. VV. H. ♄.

452. Eugenia, Jambusenbaum.

1. *E. Jambos.* Pers. l. c. Gemeiner Jambusenbaum. In Ostind. Jul. Aug. VV. H. ♄.

2. *E. baruensis.* Pers. l. c. Baruscher Jambusenbaum. Auf der Insel Baru bey Carthagena in Amer. Jul. Aug. VV. H. ♄.

3. *E. balsamica.* Jacq. fragm. bot. p. 41. n. 138. t. 45. f. 2. Balsamischer Jambusenbaum. In Jamaica. May, Jun. VV. H. ♄.

4. *E. uniflora.* Pers. l. c. 2. p. 29. Einblüthiger Jambusenbaum. In Brasil. Apr. — Jun. W. H. ♄.
Plinia pedunculata. Lin. suppl. 253.

453. Myrtus, Myrthe.

1. *M. communis.* Pers. l. c. 2. p. 30. Gemeine Myrthe. In Südeur. Asien u. Africa. Jun. — Aug. K. H. ♄.

β. tarentina. Mit Buchsblättern.

γ. italica. —— scharfgespitzten Blättern u. aufrechten Zweigen.

δ. baetica. Mit Pomeranzenblättern.

2. *M. Pimenta.* Pers. l. c. 2. p. 31. Pfefferartige Myrthe. In Westind. —. W. H. ♄.

454. Eucalyptus, Schönmütze.

1. *E. resinifera.* Pers. l. c. 2. p. 32. Harzbringende Schönmütze. In Neuholl. wie alle folgende. —. Ch. ♄.

2. *E. saligna.* Pers. l. c. Weidenblättrige Schönmütze. —. Ch. ♄.

3. *E. obliqua.* Pers. l. c. Schiefblättrige Schönmütze. —. Ch. ♄.

4. *E. glauca.* Donn cat. hort. cantabr. p. 146. Graugrüne Schönmütze. —. Ch. ♄.

5. *E. hypericifolia.* Hort. paris. Hartheublättrige Schönmütze. —. Ch. ♄.

455. Punica, Granate.

1. *P. granatum.* Pers. l. c. 2. p. 33. Gemeine Granate. In Südeur. u. Persien. Jul. Aug. K. H. ♄.

β. floribus plenis rubris. Mit rothgefüllten Blüthen.

γ. floribus plenis albis. — Weifsgefüllten Blüthen.

456. Amygdalus, Mandel.

1. *A. Persica.* Pers. l. c. Persische Mandel. (Pfirschig). In Persien. Apr. Im F. ♄.

2. *A. communis.* Pers. l. c. 2. p. 34. Gemeine Mandel. In Mauritanien u. der Schweiz. Apr. Im F. ♄.

β. amara. Mit bittern Früchten.

3. *A. pumila.* Willd. 1. p. 516. Niedrige Mandel. In Africa. Apr. Im F. ♄.

4. *A. nana.* Pers. l. c. Zwerg-Mandel. In Ungarn, Croatien, Sibirien u. der Tartarey. Apr. Im F. ♄.

5. *A. orientalis.* Pers. l. c. Silberblättrige Mandel. Im Orient. May. Im F. ♄.
A. argentea. Lam. encycl. 1. p. 103.

457. Prunus, Pflaume.

1. *Pr. Padus.* Pers. l. c. Vogel-Pflaume. (Elexe). In Eur. Apr. Im F. ♄.

2. *Pr. rubra.* Willd. arb. berol. p. 299. Rothfrüchtige Pflaume. —. May. Im F. ♄.
P. Padus β rubra. Pers. l. c.

3. *Pr. virginiana.* Pers. l. c. Virginische Pflaume. In Virgin. May, Jun. Im F. ♄.

4. *Pr. serotina.* Pers. l. c. Späthblühende Pflaume. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. ♄.

5. *Pr. canadensis.* Pers. l. c. Canadische Pflaume. In Nordamer. Apr. Im F. ♄.

6. *Pr. lusitanica.* Pers. l. c. Portugisische Pflaume. In Portug. u. Pensylvan. Jun. Im F. ♄.

7. *Pr. caroliniana.* Pers. l. c. Carolinische Pflaume. In Südcarolina. Apr. May. K. H. ♄.

8. *Pr. Lauro-Cerasus.* Pers. l. c. Lorbeerblättrige Pflaume. (Kirschlorbeer). Zu Trapezunt. May. K. H. ♄.

9. *Pr. Mahaleb.* Pers. l. c. Mahaleb-Pflaume. In Deutschl. u. der Schweiz. Apr. Im F. ♄.

10. *Pr. Armeniaca.* Lin. sp. pl. p. 679. Aprikosen-Pflaume. (Apricose). Im Orient. Apr. Im F. ♄. Armeniaca vulgaris. Pers. l. c. 2. p. 36.

β. praecox. Mit kleinen gelben Früchten.

γ. persicoides. Mit etwas zusammengedrückten grofsen Früchten.

11. *Pr. dasycarpa.* Ehrh. Beytr. 6. p. 90. Rauhe Pflaume. (Schwarze Apricose). Im Orient? Apr. Im F. ♄.
Armeniaca sibirica β dasycarpa. Pers. l. c.

12. *Pr. pumila.* Pers. l. c. 2. p. 34. Zwerg-Pflaume. In Canada. May. Im F. ♄.

13. *Pr. Chamaecerasus.* Pers. l. c. Strauchartige Pflaume Auf Oesterr. Alpen. May. Im F. ♄.

14. *Pr. Cerasus.* Pers. l. c. Saure Pflaume. (Weichsel). In Eur. May. Im F. ♄.

15. *Pr. avium.* Pers. l. c. 2. p. 35. Süsse Pflaume. (Kirsche). Im nördlicher. Eur. Apr. May. Im F. ♄.

16. *Pr. semperflorens.* Pers. l. c. Immerblühende Pflaume. —. Bl. den ganzen Sommer hindurch. Im F. ♄.

17. *Pr. pensylvanica.* Pers. l. c. Pensylvanische Pflaume. In Nordamer. May. Im F. ♄.

18. *Pr. nigra.* Pers. l. c. Schwarze Pflaume. In Nordamer. May. Im F. ♄.

19. *Pr. domestica.* Pers. l. c. Gemeine Pflaume. Auf Höhen in Eur. May, Jun. Im F. ♄.

20. *Pr. cerasifera.* Pers. l. c. Runde Pflaume. In Nordamer. May. Im F. ♄.

21. *Pr. insiticia.* Pers. l. c. Krichen-Pflaume. In Deutschl. der Schweiz u. England. May, Jun. Im F. ♄.

22. *Pr. spinosa.* Pers. l. c. Schlehen-Pflaume. Auf sonnigen Hügeln in Eur. May, Jun. Im F. ♄.

23. Eine noch unbeschriebene Art, mit ausgerandeten Kelchblättern.

DIGYNIA.

458. Waldsteinia, Waldsteinie.

1. *W. geoides.* Pers. l. c. 2. p. 36. Geumartige Waldsteinie. In Ungarns schattigen Wäldern. Apr. Im F. 2.

459. Sorbus, Eberesche.

1. *S. aucuparia.* Pers. l. c. 2. p. 38. Gemeine Eberesche. (Vogelbeere). In kalten Gegenden v. Eur. Jun. Jul. Im F. ♄.

2. *S. hybrida.* Pers. l. c. Bastard-Eberesche. In Gothland u. Thüringen. Jun. Im F. ♄.

3. *S. domestica.* Pers. l. c. 2. p. 39. Zahme Eberesche. (Speyerling). Im wärmer. Eur. Jun. Im F. ♄.

PENTAGYNIA.

460. Mespilus, Mispel.

1. *M. germanica.* Pers. l. c. Gemeine Mispel. In Wäldern v. Eur. Jul. Im F. ♄.

2. *M. japonica.* Pers. l. c. Japanische Mispel. In Japan. Nov. Ch. ♄.

3. *M. Pyracantha.* Lin. sp. pl. p. 685. Immergrüne Mispel. In Südfrankr. u. Italien. Jun. Im F. ♄.
Crataegus pyracantha. Pers. l. c. 2. p. 37.

4. *M. Cotoneaster.* Pers. l. c. Quitten-Mispel. Auf sonnigen Berghügeln im kälter. Eur. May, Jun. Im F. ♄.

5. *M. Chamae-Mespilus.* Lin. l. c. Niedrige Mispel. Auf Alpen in Oesterr. u. den Pyrenäen. Jun. Im F. ♄.
Aronia Chamae-Mespilus. Pers. l. c. 2. p. 39.

6. *M. Crus galli.* Willd. enum. 1. p. 522. Glänzende Mispel. In Nordamer. May, Jun. Im F. ♄.
Crataeg. Crus galli. Pers. l. c. 2. p. 37.

7. *M. coccinea.* Willd. l. c. 1. p. 523. Scharlachrothe Mispel. In Virgin. Pensylvan. u. Canada. Apr. May. Im F. ♄.
Crataeg. coccinea. Pers. l. c. 2. p. 36.

8. *M. cordata.* Willd. l. c. Ahornblättrige Mispel. In Nordamer. May, Jun. Im F. ♄.
Crataeg. cordata. Pers. l. c.

9. *M. pyrifolia.* Willd. l. c. Birnenblättrige Mispel. In Nordamer. May. Im F. ♄.
Crataeg. pyrifolia. Pers. l. c.

10. *M. glandulosa.* Willd. l. c. Drüsige Mispel. In Nordamer. Jun. Im F. ♄.
Crataeg. glandulosa. Pers. l. c. 2. p. 37.

11. *M. punctata.* Willd. l. c. 1. p. 524. Punktirte Mispel. In Nordamer. Jun. Im F. ♄.
Crataegus punctata. Pers. l. c.
—— cuneifolia. Ehrh. Beytr. 3. p. 21.

12. *M. nigra.* Willd. l. c. Schwarze Mispel. In Ungarn. Jun. Im F. ♄.
Crataegus nigra. Waldst. et Kitaib. pl. rar. hung. 1. p. 62. t. 61.

13. *M. Oxyacantha.* Willd. l. c. Weifsdorn-Mispel. Auf trockenen Hügeln in Eur. Jun. Jul. Im F. ♄.
Crataeg. Oxyacantha. Pers. l. c. 2. p. 38.

14. *M. monogyna.* Willd. l. c. Einsamige Mispel. An Hecken in Eur. Jun. Jul. Im F. ♄.
Crataeg. monogyna. Pers. l. c.

β. floribus rubris. Mit rothen Blüthen.

γ. — — plenis. Mit rothgefüllten Blüthen.

15. *M. Azarolus.* Willd. l. c. 1. p. 525. Azarol-Mispel. In Krain, bey Florenz, u. Montpellier. May. Im F. ♄.
Crataeg. Azarolus. Pers. l. c.

16. *M. pentagyna.* Willd. l. c. Fünfsamige Mispel. In der Syrmier Gespannschaft in Sclavonien u. im Banat. Jun. Im F. ♄.
Crataeg. pentagyna. Pers. l. c.

461. Pyrus, Birne.

1. *P. arbutifolia.* Lin. suppl. 256. Sandbeerblättrige Birne. In Virgin. Jun. Im F. ♄.
Aronia arbutifolia. Pers. l. c. 2. p. 39.
Mespilus arbutifolia. Lin. sp. pl. p. 685.

2. *P. Botryapium.* Lin. suppl. 255. Trauben-Birne. In Virgin. u. Canada. Jun. Im F. ♄.
Aronia Botryapium. Pers. l. c.
Mespil. canadensis. Lin. sp. pl. l. c.

3. *P. Amelanchier.* Lin. suppl. 256. Felsen-Birne. Auf Felsen in Oesterr. Deutschl. u. Frankr. May, Jun. Im F. ♄.
Aronia rotundifolia. Pers. l. c.
Mespil. Amelanchier. Lin. sp. pl. l. c.

4. *P. communis.* Pers. l. c. 2. p. 40. Gemeine Birne. In Eur. Jun. Im F. ♄.

5. *P. Pollveria.* Pers. l. c. Hanbutten-Birne. In Deutschl. Jun. Im F. ♄.

6. *P. salicifolia.* Pers. l. c. Weidenblättrige Birne. In Sibirien u. Armenien. Jun. Im F. ♄.

7. *P. nivalis.* Pers. l. c. Schnee-Birne. Auf Oesterreichischen Alpen. Apr. May. Im F. ♄.

8. *P. Malus.* Pers. l. c. Aepfel-Birne. (Apfel). In Eur. Jun. Im F. ♄.

9. *P. spectabilis.* Pers. l. c. Prächtige Birne. In China. Jun. Im F. ♄.

10. *P. prunifolia.* Pers. l. c. Pflaumenblättrige Birne. In Sibirien. Jun. Im F. ♄.

11. *P. coronaria.* Pers. l. c. Wohlriechende Birne. In Virgin. Jun. Im F. ♄.

12. *P. angustifolia.* Pers. l. c. Schmalblättrige Birne. In Nordamer. —. Im F. ♄.
P. sempervirens. Hortulan.

13. *P. alpina.* Willd. enum. 1. p. 527. Alpen-Birne. —. Jun. Im F. ♄.
Crataeg. alpina. Hortulan.

14. *P. Aria.* Ehrh. Beitr. 4. p. 20. Mehl-Birne In Europ. Wäldern. Jun. Im F. ♄.
Sorbus Aria. Pers. l. c. 2. p. 38.
Crataeg. Aria. Lin. sp. pl. p. 681.

15. *P. intermedia.* Ehrh. Beitr. 4. p. 20. Oxel-Birne. In Schweden u. Rufsland. Jun. Im F. ♄.
Sorbus intermedia. Pers. l. c.
Crataeg. Aria β suecica. Lin. sp. pl. p. 681.

16. *P. torminalis.* Ehrh. Beitr. 6. p. 92. Elzbeer-Birne. In Oesterr. Ungarn, Deutschl. u. im Orient in Wäldern. Jun. Im F. ♄.
Sorbus torminalis. Pers. l. c.
Crataeg. — — Lin. l. c.

462. Cydonia, Quitte.

1. *C. vulgaris.* Willd. enum. 1. p. 528. Gemeine Quitte. In Deutschl. an steinigen Ufern. Jun. Im F. ♄.
Cydonia Cydonia. Pers. l. c.
Pyrus Cydonia. Lin. l. c. p. 687.

463. Tetragonia, Viereckfrucht.

1. *T. fruticosa.* Pers. l. c. 2. p. 41. Strauchartige Viereckfrucht. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♄.

2. *T. decumbens.* Pers. l. c. Liegende Viereckfrucht. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

3. *T. expansa.* Pers. l. c. Ausgebreitete Viereckfrucht. In Neuseeland u. Japan. Jul. Aug. Im F. ☉.

464. Mesembrianthemum, Zaserblume. (Mittagsblume).

1. *M. fissum.* Haworth dissert. Messembrianth. ed. 2. n. 11. Spaltblättrige Zaserblume. Wächst, wie alle folgende, bey denen das Vaterland nicht angegeben ist, am Cap. —. Ch 4.

2. *M. scalpratum.* Haw. l. c. n. 34. Messerförmige Zaserblume. Jul. — Oct. Ch. 4.
M. linguiforme α scalpratum. Pers. l. c.
M. linguiforme Lin. sp. pl. p. 699.

3. *M. linguiforme.* Haw. l. c. n. 38. Zungenblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 4.
M. obliquum. Pers. l. c.

4. *M. latum.* Pers. l. c. Breitblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 4.

5. *M. longum.* Pers. l. c. Langblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 24.

6. *M. cruciatum.* Haw. l. c. n. 41. Kreuzblättrige Zaserblume. —. Ch. 24.

7. *M. rostratum.* Pers. l. c. Schnabelförmige Zaserblume. Jul. Aug. Ch. 24.

8. *M. ramulosum.* Haw. l. c. n. 27. Aestige Zaserblume. —. Ch. 24.
M. rostratoides. Haw. Mesembr. ed. 1. n. 30.
M. subrostratum. Willd. enum. 1. p. 529.

9. *M. caninum.* Pers. l. c. Hunderachenartige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 24.

10. *M. felinum.* Pers. l. c. Katzenrachenartige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 24.

11. *M. tigrinum.* Pers. l. c. 2. p. 42. Tigerrachenartige Zaserblume. —. Ch. 24.

12. *M. murinum.* Pers. l. c. Mäuserachenartige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 24.

13. *M. obcordellum.* Haw. diss. ed. 2. n. 3. Verkehrtherzförmige Zaserblume. —. Ch. 24.

14. *M. albidum.* Pers. l. c. Weifsblättrige Zaserblume. —. Ch. 24.

15. *M. bellidiflorum.* Pers. l. c. Mafsliebenartige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 24.

β. caulescens. Mit einem Stengel versehen.

16. *M. acutum.* Haw. l. c. n. 16. Spitzige Zaserblume. —. Ch. 24.

17. *M. articulatum.* Thunb. prod. p. 88. Gegliederte Zaserblume. —. Ch. ♄.

18. *M. dolabriforme.* Pers. l. c. Hobelblättrige Zaserblume. May — Aug. Ch. ♄.

19. *M. difforme.* Pers. l. c. Ungestaltete Zaserblume. Aug. Sept. Ch. ♄.

20. *M. calamiforme.* Pers. l. c. Federkielartige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

21. *M. canum.* Haw. l. c. n. 14. Graue Zaserblume. —. Ch. ♄.

22. *M. minimum.* Pers. l. c. Kleinste Zaserblume. Am Cap ? —. Ch. ♄.

23. *M. pinnatifidum.* Pers. l. c. Gefiederte Zaserblume. Jun. Jul. Ch. ☉.

24. *M. cordifolium.* Pers. l. c. Herzblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

25. *M. crystallinum.* Pers. l. c. Beeiste Zaserblume. In Griechenland bey Athen. Jun. — Sept. Im F. ☉.

26. *M. pallens.* Pers. l. c. 2. p. 43. Blasse Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

27. *M. expansum.* Pers. l. c. Ausgebreitete Zaserblume Jun. — Aug. Ch. ♄

28. *M. tortuosum.* Pers. l. c. Gedrehte Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

29. *M. canaliculatum.* Haw. l. c. n. 60. Rinnenblättrige Zaserblume. —. Ch. 4.

30. *M. geniculiflorum.* Pers. l. c. Winkelblüthige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

31 *M. junceum.* Haw. l. c. n. 103. Binsenartige Zaserblume. —. Ch. ♄.

32. *M. clavatum.* Pers. l. c. Keulenblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

33. *M. noctiflorum.* Pers. l. c. Nächtliche Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

34. *M. umbellatum.* Pers. l. c. Doldentragende Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. ♄.

35. *M. tuberosum.* Pers. l. c. Knollige Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. ♄.

36. *M. bicolorum.* Pers. l. c. Zweyfarbige Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. ♄.

37. *M. tenuifolium.* Pers. l. c. Dünnblättrige Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. ♄.

38. *M. aduncum.* Haw. l. c. n. 177. Krummblättrige Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. ♄.

39. *M. filicaule.* Haw. l. c. n. 176. Fadenstielige Zaserblume. —. Ch. ♄.

40. *M. stipulaceum.* Pers. l. c. Steifstielige Zaserblume. —. Ch. ♄.

41. *M. corniculatum.* Pers. l. c. Hornförmige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

42. *M. loreum.* Pers. l. c. 2. p. 44. Riemenartige Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. ♃.

43. *M. veruculatum.* Pers. l. c. Bogigblättrige Zaserblume. May — Jul. Ch. ♄.

44. *M. croceum* Jacq. fragm. bot. p. 17. t. 11. f. 2. Safranfarbige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.
M. insititium. Willd. enum. 1. p. 536.

45. *M. echinatum.* Pers. l. c. Weichstachlige Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. ♄.

β. floribus luteis. Mit gelben Blüthen.

46. *M. viridiflorum.* Pers. l. c. Grünblüthige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

47. *M. spinuliferum.* Haw. l. c. n. 97. Stacheltragende Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

48. *M. splendens.* Pers. l. c. Glänzende Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

49. *M. villosum.* Pers. l. c. Zottige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

50. *M. micans.* Pers. l. c. Schimmernde Zaserblume May — Aug. Ch. ♄.

51. *M. speciosum.* Haw. l. c. n. 199. Prächtige Zaserblume. —. Ch. ♄.

52. *M. pulverulentum.* Haw. l. c. n. 201. Bestäubte Zaserblume. —. Ch. ♄.

53. *M. Haworthi* Donn. cat. horti. cantabr. p. 66. Haworthische Zaserblume. —. Ch. ♄.

54. *M. tricolorum.* Haw. l. c. n. 53. Dreyfarbige Zaserblume. Jun. Jul. Ch. ♄.
M. stramineum. Willd. enum. 1. p. 533.

55. *M. grossum.* Pers. l. c. Dickstielige Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. ♄.

56. *M. brachiatum.* Pers. l. c. Weitästige Zaserblume. Jul. Aug. Ch. ♄.

57. *M. brevifolium.* Pers. l. c. Kurzblättrige Zaserblume. —. Ch. ♄.

58. *M. erigeriflorum.* Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 39. t. 477. Berufungskrautartige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

β. floribus pallidioribus. Mit blafsrothen Blüthen.

59. *M. hispidum.* Pers. l. c. Borstige Zaserblume. Jun. — Oct. Ch. ♄.

60. *M. striatum.* Haw. l. c. n. 89. Gestreifte Zaserblume. — . Ch. ♄.

61. *M. barbatum.* Pers. l. c. Bartige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

62. *M. hirsutum.* Haw. l. c. n. 93. Rauhe Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.
M. barbatum β hirsutum. Pers. l. c.
M. stellatum. Decand. pl. succ. fasc. 5.

63. *M. densum.* Haw. l. c. n. 94. Dichte Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.
M. barbatum γ densum. Pers. l. c.

64. *M. falcatum.* Pers. l. c. Sichelblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

65. *M. glomeratum.* Pers. l. c. Knaulblättrige Zaserblume. Jul. Aug. Ch. ♄.

66. *M. roseum* Willd. enum. 1. p. 535. Rosenrothe Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

67. *M. carneum.* Haw. Mesembr. ed. 1. n. 55. Fleischfarbige Zaserblume. —. Ch. ♄.

68. *M. pulchellum.* Haw. difs. ed. 2. n. 138. Hübsche Zaserblume. —. Ch. ♄.

69. *M. reptans.* Pers. l. c. Kriechende Zaserblume. Jul. Aug. Ch. ♄.

70. *M. elegans.* Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 1[illegible] t. 436. Schöne Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

71. *M. australe.* Pers. l. c. Südliche Zaserblume. —. Ch. ♄.

72. *M. laxum.* Willd. enum. 1. p. 536. Schlaffe Zaserblume. —. Ch. ♄.

73. *M. spinosum.* Pers. l. c. 2. p. 45. Stachlige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

74. *M. crassifolium.* Pers. l. c. Dickblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

75. *M. heteropetalum.* Haw. l. c. n. 123. Verschiedenblumenblättrige Zaserblume. —. Ch. ♄.

76. *M. molle.* Pers. l. c. Weiche Zaserblume. Jun. Jul. Ch. ♄.

77. *M. Schollii.* Hort. bot. vindob. Schollische Zaserblume. [illegible]. — Aug. Ch. ♄.
M. aduncum. Jacq. fragm. bot. p. 43. n. 148. t. 51. f. 2.

78. *M. glaucum.* Pers. l. c. Graugrüne Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

79. *M. spectabile.* Pers. l. c. Ansehnliche Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

80. *M. emarginatum.* Pers. l. c. Ausgerandete Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

81. *M. virgatum.* Haw. l. c. n. 180. Ruthenförmige Zaserblume. —. Ch. ♄.

82. *M. aureum.* Pers. l. c. Goldfarbige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

83. *M. aurantium.* Haw. l. c. n. 169. Orangenfarbige Zaserblume. —. Ch. ♄.

84. *M. scabrum.* Pers. l. c. Scharfblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

85. *M. bracteatum.* Pers. l. c. Dickblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

86. *M. uncinatum.* Pers. l. c. Hackenblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

87. *M. perfoliatum.* Haw. l. c. n. 187. Durchwachsene Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄. M. uncinatum β perfoliat. Pers. l. c.

88. *M. capitatum.* Haw. l. c. n. 56. Kopfförmige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄. M. pugioniforme. Pers. l. c.

89. *M. pugioniforme.* Haw. l. c. n. 57. Dolchförmige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

90. *M. viride.* Haw. l. c. n. 189. Grüne Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

β. foliis dentatis. Mit gezähnten Blättern.

91. *M. tenellum.* Haw. l. c. n. 190. Zarte Zaserblume. —. Ch. ♄.

92. *M. aequilaterale.* Pers. l. c. Gleichseitige Zaserblume. —. Ch. ♄.

93. *M. filamentosum.* Pers. l. c. Fädige Zaserblume. —. Ch. ♄.

94. *M. acinaciforme.* Pers. l. c. Säbelförmige Zaserblume. —. Ch. ♄.

95. *M. lacerum.* Haw. l. c. n. 122. Zerrissenblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄. M. gladiatum. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 19. t. 438.

96. *M. rubricaule.* Haw. l. c. n. 152. Rothstielige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.
β. foliis. angustioribus. Mit schmäleren Blättern.

97. *M. maximum.* Haw. l. c. n. 121. Gröfste Zaserblume. —. Ch. ♄.

98. *M. forficatum.* Pers. l. c. Scheerenförmige Zaserblume. —. Ch. ♄.

99. *M. edule.* Pers. l. c. Geniefsbare Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

100. *M. subalatum.* Haw. l. c. n. 148. Fliegelstielige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

101. *M. laevigatum.* Haw. l. c. n. 147. Glatte Zaserblume. —. Ch. ♄.

102. *M. includens.* Andrews bot. reposit. t. 388. Offenblüthige Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. ♄.

103. *M. mutabile.* Haw. l. c. n. 142. Veränderliche Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.
M. tricolor. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 20. t. 40.

104. *M. lunatum.* Willd. enum. 1. p. 538. Mondblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♄.

105. *M. deltoides.* Pers. l. c. Deltablättrige Zaserblume. May — Sept. Ch. ♄.

106. *M. caulescens.* Haw. l. c. n. 121. Hohe Zaserblume. —. Ch. ♄.
M. deltoides β caulescens. Pers. l. c.

107.)
108.) Noch unbeschriebene Arten.
109.)

465. Spiraea, Spierstaude.

1. *Sp. laevigata.* Pers. l. c. 2. p. 46. Glatte Spierstaude. Auf den Altaischen Alpen in Sibirien. Jun. Im F. ♄.

2. *Sp. salicifolia.* Pers. l. c. Weidenblättrige Spierstaude. In Oesterr. Böhmen, Sibir. u. Nordamer. an Bächen. Jun. Im F. ♄.

3. *Sp. hypericifolia.* Pers. l. c. Hartheublättrige Spierstaude. In Canada u. Pensylvanien. Jun. Im F. ♄.

4. *Sp. chamaedrifolia.* Pers. l. c. Gamanderblättrige Spierstaude. In Ungarn u. Sibirien. Jun. Im F. ♄.

5. *Sp. ulmifolia.* Pers. l. c. Rüsterblättrige Spierstaude. In Krain. u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. ♄.
Sp. chamaedrifolia. Jacq. hort. vind. 2. p. 66. t. 140.

6. *Sp. crenata.* Pers. l. c. Gekerbte Spierstaude. In Ungarn u. Sibirien. Jun. Im F. ♄.

7. *Sp. obovata.* Waldst. et Kitaib. mscrpt. Verkehrteyförmige Spierstaude. In Ungarn. Jun. Im F. ♄.

8. *Sp. triloba.* Pers. l. c. Dreylappige Spierstaude. Auf den Altaischen Alpen in Sibirien. Jun. Im F. ♄.

9. *Sp. opulifolia.* Pers. l. c. Schneeballblättrige Spierstaude. In Nordamer. Jun. Im F. ♄.

10. *Sp. sorbifolia.* Pers. l. c. Ebereschenblättrige Spierstaude. In Sümpfen v. Sibirien u. Kamtschatka. Jun. Jul. Im F. ♄.

11. *Sp. Aruncus.* Pers. l. c. Geifsbart-Spierstaude. In Oesterr. Deutschl. u. den Pyrenäen. Jun. Im F. 24.

12. *Sp. Filipendula.* Pers. l. c. Knollige Spierstaude. Auf Wiesen in Eur. Jun. Im F. 24.

13. *Sp. Ulmaria.* Pers. l. c. 2. p. 47. Sumpf. Spierstaude. Auf feuchten Wiesen in Eur. May — Jul. Im F. 24.

14. *Sp. lobata.* Pers. l. c. Lappige Spierstaude. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 24.

15. *Sp. trifoliata.* Pers. l. c. Dreyblättrige Spierstaude. In Virgin. u. Canada. Jun. Jul. Im F. 24.

POLYGYNIA.

466. Rosa, Rose.

1. *R. lutea.* Ait. hort. kew. 2. p. 200. Gelbe Rose. In Deutschl. u. Engl. May, Jun. Im F. ♄. R. eglanteria. Pers. l. c.

β. bicolor. Jacq. hort. vind. 1. p. 1. t. 1. et 3. p. 1. Mit zweyfarbigen Blüthen.

— punicea. Pers. l. c.

2. *R. sulphurea.* Pers. l. c. Schwefelgelbe Rose. Im Orient. May, Jun. Im F. ♄.

3. *R. blanda.* Pers. l. c. Hudsonsbay-Rose. An der Hudsonsbay. May, Jun. Im F. ♄.

4. *R. cinnamomea.* Pers. l. c. Zimmt-Rose. In Südeur. May. Im F. ♄.

5. *R. kamtschatica.* Pers. l. c. Kamtschatka'sche Rose. Zu Kamtschatka. May, Jun. Im F. ♄.

6. *R. pimpinellifolia.* Pers. l. c. Pimpinellenblättrige Rose. In Südeur. May — Jul. Im F. ♄.

7. *R. spinosissima.* Pers. l. c. 2. p. 48. Vielstachlige Rose. Auf Hügeln in Deutschl. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. ♄.

8. *R. ferox.* Biberst. cent. pl. rar. Taur. et Cauc. p. et t. 37. Langstachlige Rose. Am Taurus u. Caucasus. Jul. Im F. ♄.

9. *R. lucida.* Pers. l. c. Glänzende Rose. In Nordamer. May, Jun. Im F. ♄.

10. *R. carolina.* Pers. l. c. Carolinische Rose. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. ♄.

11. *R. villosa.* Pers. l. c. Weichhaarige Rose. In Eur. Jun. Im F. ♄.

12. *R. provincialis.* Pers. l. c. Provencer-Rose. In Böhmen, Ital. Span. u. Frankr. May, Jun. Im F. ♄.

13. *R. centifolia.* Pers. l. c. Garten-Rose. —. May, Jun. Im F. ♄.

14. *R. gallica.* Pers. l. c. Zucker-Rose. In Eur. May, Jun. Im F. ♄.

15. *R. alba.* Pers. l. c. 2. p. 49. Weifse Rose. In Südeur. May, Jun. Im F. ♄.

16. *R. pumila.* Pers. l. c. Niedrige Rose. In Oesterr. u. Ital. Jun. Im F. ♄.

17. *R. turbinata.* Pers. l. c. Kreiselförmige Rose. In Eur. May, Jun. Im F. ♄.

18. *R. rubiginosa.* Pers. l. c. Wein-Rose. Auf sonnigen Hügeln in Eur. Jun. Im F. ♄.

19. *R. muscosa.* Pers. l. c. Moos-Rose. —. Jun. Im F. ♄.

20. *R. moschata.* Pers. l. c. Bisam-Rose. In der Barbarey. Aug. Sept. K. H. ♄.

β. caule altiore. Mit höherem Wuchse.

21. *R. rubrifolia.* Pers. l. c. Rothblättrige Rose. In Oesterr. der Schweiz u. Dauphine auf Bergen. Jun. Im F. ♄.

22. *R. alpina.* Pers. l. c. Alpen-Rose. Auf Alpen in Eur. Jun. Jul. Im F. ♄.

23. *R. pendulina.* Pers. l. c. Hängende Rose. In Eur. May. Im F. ♄.

24. *R. pyrenaica.* Pers. l. c. Pyrenäische Rose. Auf den Pyrenäischen, den Schweizer- u. Schlesieralpen. May. Im F. ♄.

25. *R. multiflora.* Pers. l. c. 2. p. 50. Vielblüthige Rose. In Japan. May, Jun. Ch. ♄.

26. *R. canina.* Pers. l. c. Hecken-Rose. In Eur. May, Jun. Im F. ♄.

27. *R. repens.* Scop. fl. carn. n. 610. Kriechende Rose. In Oesterr. Ungarn, Sclavon. u. Krain. May, Jun. Im F. ♄.
R. arvensis. Pers. l. c. 2. p. 47.

28. *R. collina.* Pers. l. c. 2. p. 50. Hügel-Rose. Auf Hügeln in Oesterr. May, Jun. Im F. ♄.

29. *R. parvifolia.* Pers. l. c. Burgunder-Rose. In Eur. May, Jun. Im F. ♄.

30. *R. semperflorens.* Curt. bot. mag. t. 284. Immerblühende Rose. In China. Blüht das ganze Jahr hindurch. Ch. ♄.
R. bengalensis. Pers. l. c.
— sinica. Lin. syst. veg. 394.
β. punicea. Willd. enum. 1. p. 547. Mit dunkelrother Blüthe.
— chinensis Pers. l. c.
γ. pallida. Willd. l. c. Mit blafsrother Blüthe.

31. *R. bracteata.* Pers. l. c. Deckblättrige Rose. In China. Jul. Aug. Ch. ♄.

467. Rubus, Himbeere.

1. *R. rosaefolius.* Pers. l. c. Rosenblättrige Himbeere. Auf der St. Moritzinsel. Jun. Jul. W. H. ♄.

2. *R. Idaeus.* Pers. l. c. 2. p. 51. Gemeine Himbeere. Auf steinigen Hügeln in Eur. May. Im F. ♄.

3. *R. occidentalis.* Pers. l. c. Schwarze Himbeere. In Canada. May. Im F. ♄.

4. *R. caesius.* Pers. l. c. Kriechende Himbeere. An Hecken in Eur. May. Im F. ♄.

5. *R. fruticosus.* Pers. l. c. Strauchartige Himbeere. In Eur. May. Im F. ♄.
β. fructibus albis. Mit weifsen Früchten.
γ. floribus plenis albis. Mit weifsgefüllten Blüthen.

6. *R. laciniatus.* Willd. hort. berol. 2. p. 82. t. 82. Schlitzblättrige Himbeere. —. May. Im F. ♄.

7. *R. canadensis.* Pers. l. c. Canadische Himbeere. In Canada. May. Im F. ♄.

3. *R. odoratus.* Pers. l. c. 2. p. 52. Wohlriechende Himbeere. In Canada. Jun. Jul. Im F. ♄.

468. Fragaria, Erdbeere.

1. *Fr. vesca.* Pers. l. c. 2. p. 53. Wilde Erdbeere. In Europ. Wäldern. Apr. May. Im F. 24.

2. *Fr. collina.* Pers. l. c. Harte Erdbeere. Auf dürren Hügeln in Deutschl. u. der Schweiz. Apr. May. Im F. 24.

3. *Fr. elatior.* Pers. l. c. Garten-Erdbeere. In Amer.? Apr. May. Im F. 24.

4. *Fr. grandiflora.* Ananas-Erdbeere. Zu Surinam. Apr. May. Im F. 24.

5. *Fr. chiloënsis.* Pers. l. c. Chilische Erdbeere. In Südamer. Apr. May. Im F. 24.

469. Potentilla, Fingerkraut.

1. *P. fruticosa.* Pers. l. c. Strauchartiges Fingerkraut. In Engl. u. Sibir. Jun. Im F. ♄.

2. *P. bifurca.* Pers. l. c. 2. p. 54. Spaltelblättriges Fingerkraut. In Sibir. u. Armenien. May, Jun. Im F. 24.

3. *P. pensylvanica.* Pers. l. c. Pensylvanisches Fingerkraut. In Canada u. Sibir. Jun. — Aug. Im F. 24.

4. *P. recta.* Pers. l. c. Gerades Fingerkraut. Im südlicher. Eur. May, Jun. Im F. 24.

5. *P. argentea.* Pers. l. c. Silberblättriges Fingerkraut. In Eur. May. — Jul. Im F. 24.

6. *P. opaca.* Pers. l. c. Dunkelblättriges Fingerkraut. In Oesterr. Deutschl. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 24.

7. *P. aurea.* Pers. l. c. 2. p. 55. Goldfarbiges Fingerkraut. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz, Schlesien u. Dänemark. May, Jun. Im F. 24.

8. *P. alba.* Pers. l. c. Weifses Fingerkraut. Auf Bergen in Oesterr. Steyermark, Ungarn u. Deutschl. May, Jun. Im F. 24.

9. *P. clusiana.* Pers. l. c. Clusisches Fingerkraut. Auf Oesterreichischen Alpen. Jun. — Aug. Im F. 24.

470. Tormentilla, Tormentill.

1. *T. erecta.* Pers. l. c. 2. p. 56. Aufrechte Tormentille. In Eur. May, Jun. Im F. 24.

471. Geum, Geum.

1. *G. virginianum.* Pers. l. c. Weifses Geum. In Virgin. u. Carol. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *G. urbanum.* Pers. l. c. 2. p. 57. Gemeines Geum. In Eur. May, Jun. Im F. 24.

3. *G. rivale.* Pers. l. c. Wasser-Geum. Auf feuchten Wiesen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *G. montanum.* Pers. l. c. Berg-Geum. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz, Schlesien u. Dauphine. Jun. Jul. Im F. 24.

472. Dryas, Dryade.

1. *Dr. octopetala.* Pers. l. c. Alpen-Dryade. Auf den Europ. Alpen. Jun. Jul. Im F. 24.

473. Calycanthus, Kelchblume.

1. *C. floridus.* Pers. l. c. 2. p. 38. Carolinische Kelchblume. In Carol. Jun. Jul. K. H. ♄.

2. *C. laevigatus.* Willd. hort. berol. 1. p. 80. t. 80. Virginische Kelchblume. Auf hohen Bergen in Carol. u. Virgin. Jun. Jul. K. H. ♄. C. ferax. Pers. l. c.

3. *C. praecox.* Pers. l. c. Japanische Kelchblume. In Japan. Jän. Febr. Ch. ♄.

CLASSIS. XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

474. Capparis, Capper.

1. *C. spinosa.* Pers. l. c. 2. p. 59. Gemeine Capper. In Südeur. im Orient u. Africa. Jun. Jul. K. H. ♄.

2. *C. mariana.* Pers. l. c. 2. p. 60. Marianische Capper. Auf den Marianischen Inseln. —. W. H. ♄.

3. *C. frondosa.* Pers. l. c. Buschige Capper. In Wäldern zu Carthagena u. St. Domingo. Jän. Febr. W. H. ♄.

4. *C. odoratissima.* Pers. l. c. Wohlriechende Capper. Zu Caracas. —. W. H. ♄.

5. *C. Cynophallophora.* Pers. l. c. Langschottige Capper. Im wärmer. Amer. —. W. H. ♄.

6. *C. saligna.* Pers. l. c. Weidenartige Capper. Auf St. Crux. —. W. H. ♄.

7. *C. tenuisiliqua.* Pers. l. c. Dünnfrüchtige Capper. Zu Carthagena in Amer. Jun. Jul. W. H. ♄.

8. *C. Breynia.* Pers. l. c. Breynische Capper. Am Meerstrande in Jamaica. Jun. — Aug. W. H. ♄.

475. Actäa, Christophskraut.

1. *A. spicata.* Pers. l. c. 2. p. 61. Aehriges Christophskraut. In Europäischen Hainen. May, Jun. Im F. 4.

2. *A. racemosa.* Pers. l. c. Traubiges Christophskraut. In Florida, Virgin. u. Canada. Jun. Jul. Im F. 4.

476. Chelidonium, Schöllkraut.

1. *Ch. laciniatum.* Mill. dict. n. 2. ic. t. 92. Schlitzblättriges Schöllkraut. In Südeur. Apr. — Jun. Im F. 4.
Ch. majus β laciniatum. Pers. l. c.

477. Glaucium, Glaucium.

1. *Gl. luteum.* Pers. l. c. Grofsblüthiges Glaucium. In der Schweiz, Ital. Frankr. u. Engl. May — Jul. Im F. 4.
Chelid. Glaucium. Lin. sp. pl. p. 724.

2. *Gl. fulvum.* Smith. exot. bot. 1. p. 11. t. 7. Dunkelgelbes Glaucium. In Südeur. May, Jun. Im F. 4.
Chelid. Glauc. rubrum. Hortulan.

3. *Gl. phoenicium.* Smith brit. 2. p. 564. Purpurrothes Glaucium. In Oesterr. Böhm. Ungarn u. zu Montpellier. Jun. Jul. Im F. ⊙.
Glaucium corniculatum. Pers. l. c.
Chelid. corniculat. Lin. l. c.

4. *Gl. violaceum.* Pers. l. c. Violettes Glaucium. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ⊙.
Chelid. hybridum. Lin. l. c.

478. Papaver, Mohn.

1. *P. alpinum.* Pers. l. c. 2. p. 62. Alpen-Mohn. Auf den Oesterreich. Schweizer. u. den Pyrenäischen Alpen. Jun. — Aug. Im F. 2.

2. *P. dubium.* Pers. l. c. Saat-Mohn. Zwischen den Saaten des nördlicher. Eur. May, Jun. Im F. ⊙.

3. *P. somniferum.* Pers. l. c. Garten-Mohn. Im südlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. ⊙.

β. cristatum, florib. et seminib. albis. Mit krausen Blättern, weifsen Blüthen u. Samen.

4. *P. orientale.* Pers. l. c. Orientalischer Mohn. Im Orient. Jun. Jul. Im F. 2.

479. Argemone, Argemone.

1. *A. mexicana.* Pers. l. c. Mexicanische Argemone. In Mexico u. Jamaica. Jun. Jul. Im F. ⊙.

480. Nymphaea, Seerose.

1. *N. lutea.* Pers. l. c. 2. p. 63. Gelbe Seerose. In süfsen Wässern v. Eur. May — Aug. Im freyen Wasserbehälter. 2.

2. *N. alba.* Pers. l. c. Weifse Seerose. In süssen Wäfsern v. Eur. May — Aug. Im freyen Wasserbehälter. 2.

3. *N. Lotus*. Pers. l. c. Aegyptische Seerose. In Wässern v. Ostind. u. Aegypt. dann in warmen Bädern Ungarns. Jun. — Aug. K. H. 24.

4. *N. coerulea*. Pers. l. c. Blaublühende Seerose. In Wässern v. Aegypten. Jun. — Aug. K. H. 24.

481. Bixa, Orleanbaum.

1. *B. Orellana*. Pers. l. c. Gemeiner Orleanbaum. Im wärmer. Amer. an Gräben u. Quellen. Jun. Jul. W. H. ♄.

482. Sparmannia, Sparmannie.

1. *Sp. africana*. Pers. l. c. 2. p. 64. Africanische Sparmannie. In Wäldern am Cap. May, Jun. Ch. ♄.

483. Grewia, Grewie.

1. *Gr. occidentalis*. Pers. l. c. 2. p. 65. Abendländische Grewie. Am Cap u. in Aethiop. Jun. Jul. Ch. 24.

484. Tilia, Linde.

1. *T. europaea*. Lin. sp. pl. p. 733. Grofsblättrige Linde. In Böhmen u. Krain. May, Jun. Im F. ♄.
T. europ. β grandifolia. Pers. l. c. 2. p. 66.

2. *T. microphylla*. Willd. enum. 1. p. 565. Kleinblättrige Linde. In Wäldern v. Eur. May, Jun. Im F. ♄.
T. europea. Pers. l. c.

3. *T. argentea.* Decand. cat. horti bot. mons pel. p. 150. Silberblättrige Linde. In Ungarn u. im Orient. Jun. Im F. ♄.
T. alba. Pers. l. c.

4. *T. alba.* Ait. hort. kew. 2. p. 230. Weifse Linde. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. ♄.

5. *T. americana.* Pers. l. c. Schwarze Linde. In Virgin. u. Canada. May, Jun. Im F. ♄.

6. *T. pubescens.* Pers. l. c. Feinbehaarte Linde. In Carolina. —. Im F. ♄.

485. Corchorus, Sattkraut.

1. *C. olitorius.* Pers. l. c. 2. p. 67. Gemüse-Sattkraut. In Asien, Africa u. Amer. Jun. K. H. ☉.

2. *C. japonicus.* Pers. l. c. Japanisches Sattkraut. In Japan. März — Jul. Ch. ♄.

3. *C. siliquosus.* Pers. l. c. Schottiges Sattkraut. In Südamer. Apr. W. H. ♄.

486. Clusia, Clusie.

1. *Cl. alba.* Pers. l. c. 2. p. 68. Weifse Clusie. Auf Martinique. —. W. H. ♄.

2. *Cl. flava.* Pers. l. c. Gelbe Clusie. Zu Jamaica. —. W. H. ♄.

487. Mentzelia, Mentzelie.

1. *M. hispida.* Pers. l. c. 2. p. 71. Rauhe Mentzelie. In Mexico. Jun. Jul. W. H. 4.

488. Lagerstroemia, Lagerströmie.

1. *L. indica.* Pers. l. c. Chinesische Lagerströmie. In China, Cochinchina u. Japan. Jun. Jul. Ch. ♄.

489. Trilix, Trilix.

1. *Tr. lutea.* Pers. l. c. 2. p. 72. Gelbe Trilix. Zu Carthagena in Amer. May. Jun. W. H. ♄.

490. Ludia, Aenderling.

1. *L. sessiliflora.* Pers. l. c. Stiellosblüthiger Aenderling. Auf der St. Moritzinsel. Jun. Jul. W. H. ♄.
L. tuberculata. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 59. t. 112.

491. Thea, Thee.

1. *Th. Bohea.* Pers. l. c. 2. p. 73. Brauner Thee. In China u. Japan. —. Ch. ♄.

2. *Th. viridis.* Pers. l. c. Grüner Thee. In China. —. Ch. ♄.

492. Ternstroemia, Ternströmie.

1. *T. meridionalis.* Pers. l. c. Mittägige Ternströmie. In Südamer. —. W. H. ♄.

493. Citrus, Citrone.

1. *C. medica.* Pers. l. c. Saure Citrone. (Limonie). Im Orient. Jun. Jul. K. H. ♄.

2. *C. Aurantium.* Pers. l. c. 2. p. 74. Süsse Citrone. (Pomeranze). In Ostind. Jun. Jul. K. H. ♄.

3. *C. decumana.* Pers. l. c. Pompelmufs-Citrone. In Ostind. Jun. Jul. K. H. ♄.

4. *C. trifoliata.* Pers. l. c. Dreyblättrige Citrone. In Ostind. —. W. H. ♄.

5. *C. Hystrix.* Decand. cat. horti bot. monspel. p. 97. Vieldornige Citrone. Auf der St. Moritzinsel. —. W. H. ♄.

494. Cistus, Cistenrose.

1. *C. villosus.* Pers. l. c. Rauhe Cistenrose. In Ital. Span. u. Nordafrica. Jun. Jul. K. H. ♄.

2. *C. laurifolius.* Pers. l. c. Lorbeerblättrige Cistenrose. In Span. Jun. Jul. K. H. ♄.

3. *C. vaginatus.* Pers. l. c. 2. p. 75. Scheidentragende Cistenrose. Auf Teneriffa. Jun. Jul. K. H. ♄.

4. *C. ladaniferus.* Pers. l. c. Ladanumgebende Cistenrose. Auf Hügeln in Span. u. Portug. May, Jun. K. H. ♄.

5. *C. monspeliensis.* Pers. l. c. Französische Cistenrose. Zu Montpellier u. Dauphine. Jul. K. H. ♄.

6. *C. salvifolius.* Pers. l. c. Salveyblättrige Cistenrose. In Krain, der Schweiz, Ital. Südfrankr. u. Sicilien. Jun. Jul. K. H. ♄.

7. *C. incanus.* Pers. l. c. Bestäubte Cistenrose. In Narbonne u. Span. May, Jun. K. H. ♄.

8. *C. creticus.* Pers. l. c. Candische Cistenrose. In Candien u. Sirien. Jun. K. H. ♄.

9. *C. purpureus.* Pers. l. c. Purpurfarbige Cistenrose. —. May, Jun. K. H. ♄.

10. *C. albidus.* Pers. l. c. Weifsliche Cistenrose. Zu Narbone u. Span. Jun. K. H. ♄.

11. *C. crispus.* Pers. l. c. Krause Cistenrose. Zu Portug. Aug. K. H. ♄.

495. Helianthemum, Sonnenröschen.

1. *H. laevipes.* Pers. l. c. 2. p. 76. Glattstieliges Sonnenröschen. Zu Montpellier. Jun. K. H. ♄.

2. *H. Fumana.* Pers. l. c. Dünnes Sonnenröschen. In Oesterreich, der Schweiz, Frankr. u. Gothland auf trockenen Hügeln. Jun. Jul. K. H. ♄.

3. *H. marifolium.* Pers. l. c. Marumblättriges Sonnenröschen. Auf Meeresfelsen zu Massilien, Verona u. in Span. Jun. K. H. ♄.

4. *H. ledifolium.* Pers. l. c. 2. p. 77. Porstblättriges Sonnenröschen. Zu Montpellier. Jun. Jul. Im F. ☉.

5. *H. angustifolium.* Pers. l. c. 2. p. 79. Schmalblättriges Sonnenröschen. —. Jun. Jul. K. H. ♄.

6. *H. vulgare.* Pers. l. c. Gemeines Sonnenröschen. Auf trockenen Trieften in Eur. May, Jun. Im F. ♄.

7. *H. mutabile.* Pers. l. c. Veränderliches Sonnenröschen. In Südfrankreich. Jun. Jul. K. H. ♄.

8. *H. apenninum.* Pers. l. c. 2. p. 80. Apenninisches Sonnenröschen. Auf den Apenninen. Jun. Jul. K. H. ♄.

9. *H. polifolium.* Pers. l. c. Poleyblättriges Sonnenröschen. In England. Jun. Jul. K. H. ♄.

DIGYNIA.

496. Paeonia, Päonie.

1. *P. officinalis.* Pers. l. c. 2. p. 81. Gemeine Päonie. Auf Bergen im Banat, der Schweiz u. am Ida in Candien. May, Jun. Im F. 4.

β. floribus plenis rubris. Mit rothgefüllten Blüthen.

γ. floribus plenis albido rubris. Mit blafsrothgefüllten Blüthen.

2. *P. humilis.* Pers. l. c. Niedrige Päonie. In Spanien. May, Jun. Im F. 4.

3. *P. albiflora.* Pers. l. c. Weifsblühende Päonie. In Sibir. Jun. Jul. Im F. 4.

4. *P. Moutan.* Curt. bot. magaz. t. 1154. Moutan-Päonie. In China. Apr. May. Ch. ♄.
P. fruticosa. Willd. enum. suppl. p. 39.
P. suffruticosa. Andrews bot. reposit. 6. n. 373.

5. *P. tenuifolia.* Pers. l. c. Feinblättrige Päonie. Im Banat, der Ukraine u. Sibir. May, Jun. Im F. 4.

497. Forthergilla, Fothergille.

1. *F. alnifolia.* Pers. l. c. Ellerblättrige Fothergille. In Carolina. —. K. H. ♄.

TRIGYNIA.

498. Homalium, Glattstrauch.

1. *H. racemosum.* Pers. l. c. 2. p. 82. Traubiger Glattstrauch. Auf Martinique u. Jamaica. —. W. H. ♄.

499. Delphinium, Rittersporn.

1. *D. Ajacis.* Pers. l. c. Garten-Rittersporn. In der Schweiz. May — Jul. Im F. ☉. Sammt mehreren Abarten.

2. *D. grandiflorum.* Pers. l. c. Grofsblüthiger Rittersporn. In Sibir. Jun. Jul. Im F. ♄.

β. floribus plenis. Mit gefüllten Blüthen.

3. *D. intermedium.* Pers. l. c. Mittlerer Rittersporn. Auf Bergen in Ungarn u. Schlesien. Jun. Jul. Im F. 4.

4. *D. elatum.* Pers. l. c. Hoher Rittersporn. In Sibir. u. der Schweiz. May — Jul. Im F. 4.

5. *D. exaltatum.* Pers. l. c. Americanischer Rittersporn. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 4.

6. *D. urceolatum.* Pers. l. c. Hohlblättriger Rittersporn. —. Jun. Jul. Im F. 4.

7. *D. pictum.* Willd. enum. 1. p. 574. Bemahlter Rittersporn. In Südeur. Jun. Jul. K. H. ♂.

500. Aconitum, Eisenhut.

1. *A. Lycoctonum.* Pers. l. c. 2. p. 83. Wolfs-Eisenhut. Auf Alpen in Oesterr. Deutschl. der Schweiz, Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 4.

2. *A. pyrenaicum.* Pers. l. c. Pyrenäischer Eisenhut. In Sibir. der Tartarey u. den Pyrenäen. Jul. Im F. 4.

3. *A. neomontanum.* Pers. l. c. Neubergischer Eisenhut. Auf Oesterreichischen, Steyerschen, u. Kärnthenschen Alpen. Jun. Jul. Im F. 4.

4. *A. Cammarum.* Pers. l. c. Langhelmiger Eisenhut. In Oesterr. u. Steyerm. auf Niederalpen. Jun. Jul. Im F. 4.

PENTAGYNIA.

501. Aquilegia, Ackeley.

1. *A. vulgaris.* Pers. l. c. 2. p. 85. Gemeine Ackeley. In steinigen Hainen v. Eur. May, Jun. Im F. 4.
Sammt mehreren, sich durch die Blüthenfarbe unterscheidende Abarten.

2. *A. canadensis.* Pers. l. c. Canadische Ackeley. In Virgin. u. Canada. Jun. — Aug. Im F. 4.

3. *A. atropurpurea.* Willd. enum. 1. p. 577. Dunkelpurpurrothe Ackeley. In Sibir. Jun. Im F. 4.

4. *A. viridiflora.* Pers. l. c. Grünblüthige Ackeley. In Sibir. Jun. Im F. 4.

502. Nigella, Schwarzkümmel.

1. *N. damascena.* Pers. l. c. Garten-Schwarzkümmel. Zwischen den Saaten in Südeur. Jun. Jul. Im F. ⊙.

2. *N. sativa.* Pers. l. c. Gemeiner Schwarzkümmel. Erdbärsame. In Aegypt. u. Cand. Jun. Jul. Im F. ☉.

3. *N. hispanica.* Pers. l. c. Spanischer Schwarzkümmel. In Span. u. bey Montpellier. Jun. Jul. Im F. ☉.

4. *N. orientalis.* Pers. l. c. Orientalischer Schwarzkümmel. Bey Aleppo. Jun. Jul. Im F. ☉.

503. Hypericum, Hartheu.

1. *H. balearicum.* Pers. l. c. 2. p. 86. Balearisches Hartheu. Auf Hügeln zu Majorca. Jul. Aug. K. H. ♄.

2. *H. monogynum.* Pers. l. c. 2. p. 87. Indisches Hartheu. In China, Japan u. Ostind. Jul. Aug. Ch. ♄.

3. *H. calycinum.* Pers. l. c. Grofsblumiges Hartheu. In Griechenland. Jun. — Oct. Im F. ♄.

4. *H. Androsaemum.* Pers. l. c. Englisches Hartheu. In England, Ital. u. Languedoc. Jun. Jul. Im F. ♄.

5. *H. canariense.* Pers. l. c. Canarisches Hartheu. Auf den Canarischen Inseln. Jul. — Oct. K. H. ♄.

6. *H. elatum.* Pers. l. c. 2. p. 88. Hohes Hartheu. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. ♄.

7. *H. hircinum.* Pers. l. c. Stinkendes Hartheu. In Sicilien, Calabrien u. Candien. Jun. Jul. Im F. ♄.

8. *H. quadrangulare.* Pers. l. c. 2. p. 89. Vierkantiges Hartheu. Auf Wiesen in Eur. May, — Jul. Im F. 4.

9. *H. dubium.* Pers. l. c. Zweifelhaftes Hartheu. Auf Niederalpen in Deutschl. Ital. u. England. Jun. Aug. Im F. 24.

10. *H. perforatum.* Pers. l. c. Gemeines Hartheu. In Eur. May, — Aug. Im F. 24.

11. *H. barbatum.* Pers. l. c. 2. p. 90. Bartiges Hartheu. In Oesterr. bey Mauerbach auf Bergwiesen. Jun. Jul. Im F. 24.

12. *H. hirsutum.* Pers. l. c. Haariges Hartheu. Auf Hügeln, Bergen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

POLYGYNIA.

504. Dillenia, Dillenie.

1. *D. scandens.* Pers. l. c. 2. p. 92. Rankende Dillenie. In Neuholl. Aug. Ch. ♄.

505. Liriodendron, Tulpenbaum.

1. *L. Tulipifera.* Pers. l. c. 2. p. 93. Virginischer Tulpenbaum. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. ♄.

506. Magnolia, Magnolie.

1. *M. grandiflora.* Pers. l. c. Grofsblüthige Magnolie. In Carol. u. Florida. Jul. Aug. K. H. ♄.

2. *M. glauca.* Pers. l. c. Graugrüne Magnolie. In Pensylvan. Virgin. u. Carol. Jun. Jul. K. H. ♄.

3. *M. obovata.* Pers. l. c. Rothe Magnolie. In Japan u. China. —. Ch. ♄.
M. purpurea. Curt. bot. mag. t. 390.

4. *M. tripetala.* Pers. l. c. Dreyblättrige Magnolie. In Virgin. u. Carol. Jun. Jul. K. H. ♄.

5. *M. fuscata.* Pers. l. c. Braune Magnolie. In China. —. Ch. ♄.

6. *M. auriculata.* Pers. l. c. Geöhrte Magnolie. Auf den höchsten Bergen in Carol. — K. H. ♄.

507. Annona, Flaschenbaum.

1. *A. muricata.* Pers. l. c. 2. p. 95. Stachliger Flaschenbaum. Im wärmer. Amer. —. W. H. ♄.

2. *A. glabra.* Pers. l. c. Glatter Flaschenbaum. In Carol. May. K. H. ♄.

3. *A. triloba.* Ait. hort. kew. 2. p. 254. Dreylappiger Flaschenbaum. In Carol. K. H. ♄. Porcellia triloba. Pers. l. c.

508. Hepatica, Leberkraut.

1. *H. triloba.* Decand. fl. Franc. 4. p. 885. Dreylappiges Leberkraut. In Europ. Hainen. März, Apr. Im F. ♄.
Anemone hepatica. Pers. l. c. 2. p. 96.

509. Pulsatilla, Küchenschelle.

1. *P. patens.* Mill. dict. n. 4. Ausgebreitete Küchenschelle. Auf Alpen in Böhmen, Schlesien, der Lausitz u. in Sibirien. May. Jun. F. 4.
Anemone patens. Pers. l. c.

2. *P. vernalis.* Mill. dict. n. 3. Frühlings Küchenschelle. In Wäldern v. Deutschl. der Schweiz u. Schweden. März. Im F. 4.
Anemone vernalis. Pers. l. c.

3. *P. vulgaris.* Mill. dict. n. 1. Gemeine Küchenschelle. Auf dürren Hügeln in Eur. März, Apr. Im F. 4.
Anemone Pulsatilla. Pers. l. c.

2. *P. pratensis.* Mill. dict. n. 2. Wiesen-Küchenschelle. In Deutschl. auf trockenen Wiesen u. Hügeln. Apr. Im F. 4.
Anemone pratensis. Pers. l. c. p. 97.

510. Anemone, Anemone.

1. *A. coronaria.* Pers. l. c. Gemeine Anemone. Im Orient. May. Im F. 4.

2. *A. hortensis.* Pers. l. c. Garten-Anemone. In Südtyrol, Ital. u. der Schweiz. Apr. May. Im F. 4.

3. *A. sylvestris.* Pers. l. c. Wald-Anemone. In Deutschl. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 4.

4. *A. virginiana.* Pers. l. c. Virginische Anemone. In Virgin. Jun. Jul. Im F. 4.

5. *A. nemorosa.* Pers. l. c. 2. p. 98. Busch-Anemone. In Europ. Hainen. May. Jun. Im F. 4.

6. A. *ranunculoides.* Pers. l. c. Ranunkelartige Anemone. Auf schattigen Wiesen im nördlicher. Eur. May. Im F. 4.

9. *A. narcissiflora.* pers. l. c. Narzissenblüthige Anemone. Auf Alpen in Oesterr. Schlesien, Schweiz, Frankr. u. Sibir. Jun. Jul. Im F. 4.

511. Atragene, Atragene.

1. *A. alpina.* Pers. l. c. Alpen-Atragene. Auf Alpen in Oesterr. Salzb. der Schweiz u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. ♄.

512. Clematis, Waldrebe.

1. *C. cirrhosa.* Lin. sp. pl. p. 769. Einfachblättrige Waldrebe. In Andalusien u. der Barbarey. Jun. Jul. K. H. ♄. 24
Atragene cirrhosa. Pers. l. c.

2. *C. florida.* Thunb. jap. 240. Grofsblüthige Waldrebe. In Japan. Jun. Jul. Ch. ♄.
Atrag. florida. Pers. l. c.

3. *C. Viticella.* Pers. l. c. 2. p. 99. Italienische Waldrebe. In Span. u. Ital. Jun. Jul. Im F. 24.

ß. floribus plenis. Mit gefüllten Blüthen.

4. *C. crispa.* Pers. l. c. Krausblüthige Waldrebe. In Carolina. Jun. Jul. K. H. ♄.

5. *C. calycina.* Ait. hort. kew. 2. p. 259. Gekelchte Waldrebe. Zu Minorca. Jun. Jul. K. H. ♄.
Atrag. balearica. Pers. l. c. 2. p. 96.

6. *C. glauca.* Pers. l. c. 5. p. 99. Meergrüne Waldrebe. In Sibir. u. im Orient. Aug. Im F.

7. *C. virginiana.* Pers. l. c. Virginische Waldrebe. In Nordamer. — Sept. Im F. ♄.

8. *C. Vitalba.* Pers. l. c. 2. p. 100. Gemeine Waldrebe. In Deutschl. der Schweiz u. Frankr. Jun. — Aug. Im F. ♄.

9. *C. Flammula.* Pers. l. c. Scharfe Waldrebe. Zu Montpellier u. in Graubündten. Jun. Jul. Im F. ♄.

10. *C. erecta.* Pers. l. c. Aufrechte Waldrebe. Auf Hügeln in Oesterr. Ungarn, der Schweiz zu Montpellier u. der Tartarey. Jun. Jul. Im F. 24.

11. *C. integrifolia.* Pers. l. c. Einfache Waldrebe. In Ungarn u. der Tartarey. Jun. — Aug. Im F. 24.

513. Thalictrum, Thalictrum.

1. *Th. foetidum.* Pers. l. c. Stinkendes Thalictrum. In der Schweiz. Frankr. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *Th. majus.* Pers. l. c. Grofses Thalictrum In Oesterr. und Ungarn. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *Th. minus.* Pers. l. c. Kleines Thalictrum. Auf Kalkgebirge in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *Th. purpurascens.* Pers. l. c. Röthliches Thalictrum. In Canada. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *Th. angustifolium.* Pers. l. c. 2. p. 101. Schmalblättriges Thalictrum. In Oesterr. u. Deutschl. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *Th. flavum.* Pers. l. c. Gemeines Thalictrum. Auf sumpfigen Wiesen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

7. *Th. speciosum.* Pers. l. c. Schönes Thalictrum. In Südfrankr. u. Span. Jun. Jul. Im F. 24.

8. *Th. rugosum.* Pers. l. c. Runzliges Thalictrum. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 24.

9. *Th. nigricans.* Pers. l. c. Schwärzliges Thalictrum. In Oesterr. Jun. Jul. Im F. 24.

10. *Th. aquilegifolium.* Pers. l. c. Ackeleyblättriges Thalictrum. In Deutschl. d. Schweiz u. Schweden. Jun. Jul. Im F. 24.

514. Adonis, Adonis.

1. *A. vernalis.* Pers. l. c. 2. p. 102. Frühlings-Adonis. Auf sonnigen Hügeln im mittler. Europa. Apr. May. Im F. W.

515. Ranunculus, Ranunkel. (Hahnenfuss.)

1. *R. Flammula.* Pers. l. c. Beifsender Ranunkel. An Wassergräben in Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

2. *R. gramineus.* Pers. l. c. Grasblättriger Ranunkel. Auf feuchten Wiesen in Frankreich. May, Jun. Im F. 24.

3. *R. Thora.* Pers. l. c. 2. p. 103. Giftiger Ranunkel. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz, Dauphine u. den Pyrenäen. Jun. — Aug. K. H. 24.

4. *R. auricomus.* Pers. l. c. Verschiedenblättriger Ranunkel. In feuchten Hainen v. Eur. un. Jul. Im F. 24.

5. *R. illyricus.* Pers. l. c. Illyrischer Ranunkel. In Oesterr. Ungarn, Ital. u. Languedo Jun. Jul. Im F. 24.

6. *R. asiaticus.* Pers. l. c. 2. p. 104. Garten-Ranunkel. In Asien u. Mauritanien. May, Jun. Im F. 24.

7. *R. montanus.* Pers. l. c. Berg-Ranunkel. Auf Alpen in Oesterr. Salzb. der Schweiz u. in der Dauphine. Jun. — Aug. Im F. ♂.

8. *R. bulbosus.* Pers. l. c. Knolliger Ranunkel. Auf Wiesen in Eur. May, — Jul. Im F. 24.

9. *R. repens.* Pers. l. c. 2. p. 205. Kriechender Ranunkel. In ausgetrockneten Wassergräben v. Europa. Jul. Aug. Im F. 24.

10. *R. lanuginosus.* Pers. l. c. Wolliger Ranunkel. Auf Bergwiesen in Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

516. Trollius, Trollblume.

1. *T. europaeus.* Pers. l. c. 2. p. 106. Europäische Trollblume. Auf Bergwiesen in Deutschl. Engl. u. Schweden. Jun. — Aug. Im F. 24.

2. *T. asiaticus.* Pers. l. c. Asiatische Trollblume. In Sibirien. Jun. — Aug. Im F. 24.

517. Isopyrum, Isopyrum.

1. *I. thalictroides.* Pers. l. 2. c. p. 107. Thalictrumartiges Isopyrum. In schattigen Hainen v. Oesterr. Krain, Ungarn u. Ital. May. Im F. 24.

518. Helleborus, Christwurz.

1. *H. hyemalis.* Pers. l. c. 2. Winter-Christwurz. In Oesterr. der Schweiz u. Italien. Febr. März. Im F. 24.

2. *H. niger.* Pers. l. c. Schwarze Christwurz. In Oesterr. u. Toscana. Jän. — Apr. Im F. 24.

3. *H. viridis.* Pers. l. c. Grüne Christwurz. Auf Bergen in Oesterr. Krain u. Ital. März, Apr. Im F. 24.

4. *H. foetidus.* Pers. l. c. Stinkende Christwurz. In Deutschl. d. Schweiz u. Frankr. März, Apr. Im F. 24.

5. *H. lividus*. Pers. l. c. Schmutzigweifse Christwurz. In Corsica. Apr. May. Im F. 2.

519. Caltha, Kuhblume.

1. *C. palustris*. Pers. l. c. Gemeine Kuhblume. Auf feuchtem Boden in Eur. Asien u. Nordamer. Jun. Jul. Im F. 2.

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

520. Teucrium, Gamander.

1. *T. fruticans*. Pers. l. c. 2. p. 110. Strauchartiger Gamander. In Ital. Span. Sicil. u. der Barbarey. Jul. Aug. K. H. ♄.

2. *T. Marum*. pers. l. c. Katzen-Gamander. Zu Valenzia in Span. Jul. Aug. K. H. ♄.

3. *T. multiflorum*. Pers. l. c. Vielblüthiger Gamander. In Span. Aug. Ch. ♄.

4. *T. Laxmanni*. Pers. l. c. Laxmannischer Gamander. Auf trockenen Plätzen in Ungarn, Sclavonien u. Sibirien. Jun. — Aug. Im F. 2.

5. *T. virginicum*. Pers. l. c. 2. p. 111. Virginischer Gamander. In Virgin. Jun. Jul. Im F. 2.

6. *T. hyrcanicum*. Pers. l. c. Hyrcanischer Gamander. In Hyrcanien. Jun. Jul. K. H. 2.

7. *T. abutiloides*. Pers. l. c. Grofsblättriger Gamander. Zu Madera. May — Jul. Ch. ♄.

8. *T. Scorodonia.* Pers. l. c. Scorodonien-Gamander. Auf Sandhügeln in Deutschl. der Schweiz, Frankr. Engl. u. Niederland. Jun. — Aug. Im F. 24.

9. *T. betonicum.* Pers. l. c. Betonienartiger Gamander. An Flüssen zu Madera. Jul. Aug. Ch. ♄.

10. *T. massiliense.* Pers. l. c. Französischer Gamander In Candien u. in Südfrankr. Jun. — Aug. K. H. ♄.

11. *T. flavum.* Pers. l. c. 2. p. 112. Gelber Gamander. In Ital. Span. Frankr. u. der Barbarey. Jun. — Aug. K. H. ♄.

12. *T. montanum.* Pers. l. c. Berg-Gamander. In Deutschl. d. Schweiz u. Frankr. Jun. — Aug. Im F. 24.

521. Satureia, Pfefferkraut. (Saturey.)

1. *S. Thymbra.* Pers. l. c. 2. p. 113. Candisches Pfefferkraut. In Candien u. Tripoli. Jun. — Aug. K. H. ♄.

2. *S. montana.* Pers. l. c. Berg-Pfefferkraut. In Krain, Croatien, Ital. Span. u. Südfrankr. Jun. Jul. Im F. ♄.

3. *S. hortensis.* Pers. l. c. Gemeines Pfefferkraut. In Ital. u. Languedoc. Jun. — Aug. Im F. ☉.

522. Hyssopus, Isopp.

1. *H. officinalis.* Pers. l. c. 2. p. 114. Gemeiner Isopp. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ♄.

2. *H. orientalis.* Willd. enum. 2. p. 599. Orientalischer Isopp. Am Caucasus. Jul. — Oct. K. H. ♄.

3. *H. scrophularifolius.* Pers. l. c. Langrüfslicher Isopp. In Canada. Jun. Jul. Im F. ♂.

423. Nepeta, Katzenmünze.

1. *N. Cataria.* Pers. l. c. Gemeine Katzenmünze. Im Eur. Jun. Jul. Im F. 2.

2. *N. violacea.* Pers. l. c. 2. p. 115. Violete Katzenmünze. In Span. Sibir. u. Krain. Jun. Jul. Im F. 2.

3. *N. Nepetella.* Pers. l. c. Kleine Katzenmünze. In Südeur. Jun. Jul. K. H. 2.

4. *N. colorata.* Willd. enum. 2. p. 601. Bemahlte Katzenmüntze. Am Caucasus. Jun. Jul. Im F. 2.
N. melissaefolia. Pers. l. c.

522. Lavandula, Lavendel.

1. *L. Spica.* Pers. l. c. 2. p. 116. Gemeiner Lavendel. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ♄.

2. *L. Stoechas.* Pers. l. c. Schopf-Lavendel. In Südfrankr. Span. u. Nordafr. Jun. Jul. K. H. ♄.

3. *L. dentata.* Pers. l. c. Gezähnter Lavendel. In Span. Nordafr. u. im Orient. May — Sept. Ch. ♄.

4. *L. pinnata.* Pers. l. c. Gefiederter Lavendel. Auf Madera. Jun. Jul. Ch. ♄.

5. *L. multifida.* Pers. l. c. Vielspaltiger Lavendel. In Africa u. Span. Jun. Jul. Ch. ♄.

6. *L. abrotanoides.* Pers. l. c. Stabwurzartiger Lavendel. Auf den Canarischen Inseln. Jun. Jul. Ch. ♄.

525. Sideritis, Gliedkraut.

1. *S. canariensis.* Pers. l. c. Canarisches Gliedkraut. Auf Madera u. den Canarischen Inseln. Jun. Jul. Ch. ♄.

2. *S. candicans.* Pers. l. c. Weifsliches Gliedkraut. Zu Madera. Jun. Jul. Ch. ♄.

3. *S. cretica.* Pers. l. c. Candisches Gliedkraut. In Candien. Jul. K. H. ♄.

4. *S. syriaca.* Pers. l. c. 2. p. 117. Syrisches Gliedkraut. In Ital. Candien u. im Orient. Jun. Jul. K. H. ♄.

526. Bistropogon, Kelchbart.

1. *B. punctatum.* Pers. l. c. 2. p. 118. Punktirter Kelchbart. Auf Madera. —. Ch. ♄.

527. Mentha, Münze,

1. *M. sylvestris.* Pers. l. c. 2. p. 119. Wald-Münze. In Deutschl. Engl. u. Frankr. an Bächen. Jun. — Aug. Im F. 4.

2. *M. viridis.* Pers. l. c. Grüne Münze. In Deutschl. Engl. Frankr. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 4.

3. *M. piperita.* Pers. l. c. Pfeffer-Münze. In Engl. Jun. Jul. Im F. 4.

4. *M. rotundifolia* Pers. l. c. Rundblättrige Münze. An feuchten Stellen in Deutschl. u. Engl. Jun. Jul. Im F. 24.

β. foliis variegatis. Mit bunten Blättern.

5. *M. crispa*. Pers. l. c. Krause Münze. In Deutschl. d. Schweiz u. Sibirien. May, — Jul. Im F. 24.

6. *M. aquatica*. Pers. l. c. Pferde-Münze. Am Wasser in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

7. *M. austriaca*. Pers. l. c. 2. p. 120. Oesterreichische Münze. In Oesterr. Deutschl. u. Frankreichs Sümpfen. Jun. Jul. Im F. 24.

8. *M. pulegium*. Pers. l. c. Poley-Münze In Deutschl. d. Schweiz, Engl. u. Frankr. in lehmigen Boden. Jun. Jul. Im F. 24.

9. *M. cervina*. Pers. l. c. Hirsch-Münze. In Südfrankr. Jun. Jul. Im F. 24.

528. Perilla, Perille.

1. *P. ocymoides*. Pers. l. c. Basilicumartige Perille. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☉.

529. Lamium, Bienensaug.

1. *L. orvala*. Pers. l. c. 2. p. 121. Grofsblüthiger Bienensaug. In Pannonien, Istrien, Ital. u. Croatien. May — Jul. Im F. 24.

2. *L. garganicum*. Pers. l. c. Italienischer. Bienensaug. Auf dem Bergen Gargano in Apulien. Jun. Jul. Im F. 24.

9. *L. album*. Pers. l. c. 2. p. 122. Weifser Bienensaug. In Eur. May, — Jul. Im F. 24.

530. Betonica, Betonie.

1. *B. officinalis.* Pers. l. c. Gemeine Betonie. In Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

2. *B. stricta.* Pers. l. c. 2. p. 123. Steife Betonie. In Deutschl. u. Frankr. Jun. — Aug. Im F. ♄.

3. *B. orientalis.* Pers. l. c. Orientalische Betonie. Im Orient. May — Jul. Im F. 24.

531. Stachys, Ziest.

1. *St. circinata.* Pers. l. c. Stumpfblättriger Ziest. In Africa. Sept. Oct. Ch. 24.

2. *St. coccinea.* Pers. l. c. Scharlachrother Ziest. In Mexico u. Chili. Jun. Jul. Ch. 24.

3. *St. alpina.* Pers. l. c. Gebirgs-Ziest. In Deutschl. u. d. Schweiz auf Bergen, May — Jul. Im F. 24.

4. *St. germanica.* Pers. l. c. Deutscher Ziest. In Deutschl. Engl. Frankr. u. Sibir. May, Jun. Im F. ♄.

5. *St. lanata.* Pers. l. c. Wolliger Ziest. In Sibirien. May, — Jul. Im F. 24.

6. *St. rugosa.* Pers. l. c. 2. p. 124. Runzliger Ziest. Am Cap. Jul. — Sept. Ch. ♄.

532. Marrubium, Andorn.

1. *M. peregrinum.* Pers. l. c. 2. p. 125. Fremder Andorn. Auf trockenen Boden in Oesterr. Sicil. u. Candien. May — Aug. Im F. 24.

2. *M. crispum.* Pers. l. c. Krauseblättriger Andorn. In Ital. u. Span. Jun. Jul. K. H. 4.

3. *M. hispanicum.* Pers. l. Spanischer Andorn. In Spanien. Jun. Jul. K. H. 4.

4. *M. Pseudo-Dictamnus.* Pers. l. c. Dostartiger Andorn. In Candien. Jun. Jul. K. H. ♄.

533. Phlomis, Fackelblume.

1. *Ph. fruticosa.* Pers. l. c. 2. p. 126. Strauchartige Fackelblume. In Sicilien u. Span. Jul. Aug. K. H. ♄.

2. *Ph. salviaefolia.* Pers. l. c. Salveyblättrige Fackelblume. —. May, Jun. Ch. ♄.

3. *Ph. tuberosa.* Pers. l. c. 2. p. 127. Knollige Fackelblume. In Sibirien. Jun. — Aug. Im F. 4.

4. *Ph. nepetifolia.* Pers. l. c. Katzenmünzblättrige Fackelblume. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☉.

5. *Ph. Leonurus.* Pers. l. c. Goldfarbige Fackelblume. Am Cap. Oct. Nov. Ch. ♄.

534. Moluccella, Trichterkelch.

1. *M. spinosa.* Pers. l. c. Stachliger Trichterkelch. Auf den Molluken. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *M. laevis.* Pers. l. c. 2. p. 128. Glatter Trichterkelch. In Syrien. Jun. Jul. Im F. ☉.

535. Origanum, Dosten.

1. *O. Dictamnus.* Pers. l. c. Diptam-Dosten. Auf dem Berge Ida in Candien. Sept. Oct. K. H. ♄.

2. *O. heracleoticum.* Pers. l. c. 2. p. 129. Griechischer Dosten. Steyerm. bey Grätz u. Südeur. besonders in Griechenl. May — Jul. Im F. 4.

3. *O. vulgare.* Pers l. c. Gemeiner Dosten. In Eur. u. Canada. May — Jul. Im F. 4.

4. *O. Majorana.* Pers. l. c. Majoran-Dosten. In Portug. u. Palästina. Jun. Jul. Im F. ☉.

536. Westeringia, Westeringie.

1. *W. rosmariniformis.* Smith in act. holm. 1797. p. 175. t. 8. Rosmarinartige Westeringie. In Neuholl. May, — Aug. Ch. ♄.
W. rosmarinacea. Pers. l. c.
Cunila fruticosa. Donn. catal. horti cantabr. p. 5.

537. Thymus, Thymian.

1. *Th. Serpyllum.* Pers. l. c. 2. p. 130. Feld-Thymian. In Eur. May — Aug. Im F. ♄.

2. *Th. vulgaris.* Pers. l. c. Gemeiner Thymian. In Südeur. May — Jul. Im F. ♄.

3. *Th. Calamintha.* Willd. enum. 2. p. 624. Calmünzen-Thymian. In Oesterr. d. Schweiz. Ital. Span. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 4.
Melissa Calamintha. Pers. l. c. 2. p. 132.

4. *Th. Acinos.* Lin. sp. pl. p. 826. Acker-Thymian. In Eur. Jun. Jul. Im F. ☉.
Acynos vulgaris. Pers l. c. 2. p. 131.

5. *Th. alpinus.* Lin. l. c. Alpen Thymian. Auf Bergen in Oesterr. Salzb. d. Schweiz u. zu Montpellier. May, Jun. Im F. 4.
Acynos alpinus. Pers. l. c. 2. p. 131.

6. *Th. montanus.* Pers. l. c. 2. p. 130. Berg-Thymian. In Ungarn. Jun. Jul. Im F. 4.

538. Melissa, Melisse.

1. *M. officinalis.* Pers. l. c. 2. p. 132. Citronen-Melisse. Auf Bergen in Ungarn d. Schweiz u. Ital. Jun. — Aug. Im F. 4.

539. Horminum, Horminum.

1. *H. pyrenaicum.* Pers. l. c. Pyrenäisches Horminum. Auf den Pyrenäen, den Tyroler u. Krainer Alpen, Jun. Jul. Im F. 4.
Melissa pyrenaica. Jacq. hort. vind. 2. p. 86. t. 183.

540. Melittis, Bienenblume.

1. *M. Melissophyllum.* Pers. l. c. Melissenblättrige Bienenblume. Auf Bergen in Oesterr. d. Schweiz, Deutschl. u. England. Jun. Jul. Im F. 4.

541. Dracocephalum, Drachenkopf.

1. *D. virginianum.* Pers. l. c. 2. p. 133. Virginischer Drachenkopf. In Virgin. u. Carol. Jun. — Aug. Im F. 4.

2. *D. canariense.* Pers. l. c. Canarischer Drachenkopf. Auf den Canarischen Inseln. Jul. K. H. ♄.

3. *D. austriacum.* Pers. l. c. Oesterreichischer Drachenkopf. Auf dem Geisberge in Oesterr. dann auf Bergen in Ungarn, Siebenbürgen u. Portugall. Jun. Jul. Im F. 4.

4. *D. Ruyschiana.* Pers. l. c. Schwedischer Drachenkopf. In Schweden, Dännemark, Sibirien u. d. Schweiz. Jun. — Aug. Im F. 4.

5. D. *Sibiricum.* Pers. l. c. Sibirischer Drachenkopf. In Sibir. May — Aug. Im F. 4.

6. *D. Moldavica.* Pers. l. c. Türkischer Drachenkopf. In der Moldau u. Sibir. Jun. Jul. Im F. 4.

542. Ocymum, Basilicum,

1. *O. monachorum.* Pers. l. c. 2. p. 134. Zimmtduftendes Basilicum. In Ostind. Jun. — Aug. W. H. ☉.

2. *O. gratissimum.* Pers. l. c. Angenehmes Basilicum. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☉.

3. *O. suave.* Willd. enum. 2. p. 629. Lieblichduftendes Basilicum. —. May — Oct. W. H. ♄.

4. *O. Basilicum.* Pers. l. c. Gemeines Basilicum. In Ostind. u. Persien. May — Aug. W. H. ☉.

β. fimbriatum. Mit verbrämten Blättern.

γ. bullatum. — blasigen —

5. *O. minimum.* Pers. l. c. Kleinstes Basilicum. Auf Ceylon. May — Aug. W. H. ☉.

6. *O. polystachyon.* Pers. l. c. Vielähriges Basilicum. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☉.

543. Plectranthus, Hahnensporn.

1. *P. fruticosus.* Pers. l. c. 2. p. 135. Strauchartiger Hahnensporn. Am Cap. Jun. — Nov. Ch. ♄.

2. *P. parviflorus.* Willd. hort. berol. 1. p. 65. Kleinblüthiger Hahnensporn. In Peru? May — Aug. Ch. ♄.

544. Scutellaria, Helmkraut.

1. *Sc. alpina.* Pers. l. c. 2. p. 136. Alpen-Helmkraut. Auf Alpen in d. Schweiz. Jul. Aug. Im F. 24.

2. *Sc. galericulata.* Pers. l. c. Gemeines Helmkraut. An Wässern in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

545. Prunella, Prunelle.

1. *P. grandiflora.* Pers. l. c. 2. p. 137. Grofsblüthige Prunelle. In Eur. May — Jul. Im F. 24.

2. *P. laciniata.* Pers. l. c. Schlitzblättrige Prunelle. In Europ. Waldungen. May — Jul. Im F. 24.

546. Prasium, Niccoline.

1. *P. majus.* Pers. l. c. Grofse Niccoline. In Dalmatien, Sicil. zu Rom. u. bey Tanger. Jun. Jul. K. H. ♄.

ANGIOSPERMA.

547. Verbena, Eisenhart.

1. *V. Aubletia.* Pers. l. c. 2. p. 138. Schönblühender Eisenhart. In Carol. u. Georg. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *V. bonariensis.* Pers. l. c. Südamericanischer Eisenhart. Zu Buenos Ayres. Jun. Jul. Ch. 4.

3. *V. hastata.* Pers. l. c. Spiefsblättriger Eisenhart. In Nordamer. Jun. — Im F. W.

4. *V. triphylla.* l'Herit. styrp. 1. p. 21. t. 11. Dreyblättriger Eisenhart. Zu Buenos Ayres u. Chili. Jul. Jul. Ch. ♄.
Aloisia citriodora. Pers. l. c. 2. p. 139.

548. Priva, Prive.

1. *P. mexicana.* Pers. l. c. Mexicanische Prive. In Mexico. Jun. Jul. W. H. 4.
Verbena mexicana. Mill. dict. n. 16.

449. Lantana, Lantane.

1. *L. mista.* Pers. l. c. 2. p. 140. Bunte Lantane. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. ♄.

2. *L. trifolia.* Pers. l. c. Dreyblättrige Lantane. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. ♄.

3. *L. Cammara.* Pers. l. c. Veränderliche Lantane. Im wärmer. Amer. Jun. — Sept. W. H. ♄.

4. *L. crocea.* Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 37. t. 47. Safranfarbige Lantane. In Jamaica. Apr. May. W. H. ♄.

5. *L. involucrata.* Pers. l. c. Andornblättrige Lantane. Im wärmer. Amer. Bl. das ganze Jahr hindurch. W. H. ♄.

6. *L. recta.* Pers. l. c. Kleinblättrige Lantane. In Jamaica. Jun. — Aug. W. H. ♄.

7. *L. lavandulacea.* Pers. l. c. Lavendelblättrige Lantane. —. Jun. — Aug. W. H. ♄.

8. *L. salvifolia.* Pers. l. c. Salveyblättrige Lantane. Am Cap. Jun. — Aug. W. H. ♄.

9. *L. melissaefolia.* Pers. l. c. Melissenblättrige Lantane. In Westindien. Jun. — Aug. W. H. ♄.

10. *L. scabrida.* Pers. l. c. Scharfblättrige Lantane. In Westind. Jun. — Aug. W. H. ♄.

11. *L. nivea.* Pers. l. c. Weifsblühende Lantane. In Ostind. Jun. — Aug. W. H. ♄.

12. *L. aculeata.* Pers. l. c. Stachlige Lantane. Im wärmer. Amer. Jun. — Aug. W. H. ♄.

550. Duranta, Durante.

1. *D. Plumieri.* Pers. l. c. Plumierische Durante. In Südamer. —. W. H. ♄.

2. *D. Ellisia.* Pers. l. c. Ellisische Durante. In Jamaica. —. W. H. ♄.

3. *D* ? Frutex an novi generis? Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 51. t. 500. Ist in Patagonien zu Hause.

551. Citharexylum, Geigenholz.

1. *C. cynereum.* Pers. l. c. 2. p. 142. Graues Geigenholz. In Jamaica. — W. H. ♄.

2. *C. caudatum.* Pers. l. c. Ausgerandetes Geigenholz. In Jamaica. —. W. H. ♄.

3. *C. villosum.* Pers. l. c. Haariges Geigenholz. In St. Domingo. Aug. — Oct. W. H. ♄.

4. *C. molle.* Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 9. t. 417. Weiches Geigenholz. — . Apr. — Jul. W. H. ♄.

5. *C. quadrangulare.* Pers. l. c. Vierkantiges Geigenholz. Zu Martinique. Jun. — Aug. W. H. ♄.

6. Eine noch unbeschriebene Art, dem C. cinereo sehr ähnlich, dessen Vaterland mir unbekannt ist.

552. Cornutia, Cornutie.

1. *C. punctata.* Willd. sp. pl. 3. p. 322. Punktirte Cornutie. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. W. H. ♄.
Hostana coerulea. Pers. l. c. 2 p. 143.
Hosta coerulea. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 60. t. 114.

553. Vitex, Müllen.

1. *V. Agnus castus.* Pers. l. c. Gemeine Müllen. In Sümpfen v. Neapel. u. Sicilien. Jul. Aug. K. H. ♄.

2. *V. incisa.* Pers. l. c. Eingeschnittene Müllen. In China. Aug. Sept. Ch. ♄.

554. Volkameria, Volkamerie.

1. *V. aculeata.* Pers. l. c. 2. p. 144. Stachlige Volkamerie. In Jamaica u. Barbados. — W. H. ♄.

2. *V. ligustrina.* Pers. l. c. Ligusterartige Volkamerie. Auf der St. Moritzinsel. Jun. Jul. W. H. ♄.

3. *V. inermis.* Pers. l. c. Wehrlose Volkamerie. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♄.

4. *V. buxifolia.* Willd. enum. 2. p. 658. Buchsblättrige Volkamerie. —. —. W. H. ♄.

555. Clerodendrum, Loosbaum.

1. *C. viscosum.* Pers. l. c. 2. p. 145. Klebriger Loosbaum. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♄.

2. *C. purpureum.* Hort. parisiens. Purpurrother Loosbaum. —. —. W. H. ♄.

3. *C. fortunatum.* Pers. l. c. Glücklicher Loosbaum. In Ostind. —. W. H. ♄.

4. *C. fragrans.* Willd. enum. 2. p. 659. Wohlriechender Loosbaum. In Japan. Jun. — Aug. W. H. ♄.
Volkameria fragrans. Pers. l. c.
Volkmannia japonica. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 48. t. 338.

556. Selago, Selago.

1. *S. corymbosa.* Pers. l. c. Doldentraubige Selago. Am Cap. Jun. — Oct. Ch. ♄.

557. Hebenstreitia, Hebenstreitie.

1. *H. dentata.* Pers. l. c. 2. p. 146. Gezähnte Hebenstreitie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♂.

558. Manulea, Handblume.

1. *M. alternifolia.* Pers. l. c. 2. p. 148. Wechselblättrige Handblume. In Neuholl. Jun. Jul. Ch. ♄.

2. *M. viscosa.* Willd. enum. 2. p. 653. Klebrige Handblume. Am Cap. Jun. — Sept. Ch. ♄. Buchnera viscosa. Pers. l. c. 2. p. 149.

3. *M. oppositifolia.* Pers. l. c. 2. p. 148. Gegenüberstehendblättrige Handblume. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.

559. Bartsia, Bartsie.

1. *B. alpina.* Pers. l. c. 2. p. 150. Alpen-Bartsie. Auf Alpen in Oesterr. d. Schweiz, Savoyen u. Lappland. Jul. Aug. Im F. 24.

560. Linaria, Leinkraut.

1. *L. Cymbalaria.* Willd. enum. 2. p. 639. Eckiges Leinkraut. Auf Felsen in Eur. May — Aug. Im F. 24.
Antirrhinum Cymbalaria. Pers. l. c. 2. p. 155.

2. *L. latifolia.* Willd. l. c. Breitblättriges Leinkraut. In Nordafrica. Jun. Jul. Im F. ☉.
Antirrhin. latif. Pers. l. c.

3. *L. purpurea.* Willd. l. c. Purpurfarbiges Leinkraut. Am Vesuv. Jun. Jul. K. H. 24.
Antirrhin. purp. Pers. l. c. 2. p. 156.

4. *L. versicolor.* Willd. l. c. 2. p. 640. Buntes Leinkraut. In Südfrankr. Jun. Jul. Im F. ☉.
Antirrhin. versic. Pers. l. c.

5. *L. repens.* Willd. l. c. Kriechendes Leinkraut. In Engl. Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 24.
Antirrhin. rep. Pers. l. c.

6. *L. bipartita.* Willd. l. c. Zweytheiliges Leinkraut. Zu Mogador. Jun. Jul. Im F. ☉.
Antirrhin. bipartit. Pers. l. c. 2. p. 155.

7. *L. alpina.* Willd. l. c. 2. p. 641. Alpen-Leinkraut. Auf Alpen in Oesterr. Steyerm. d. Schweiz u. den Pyrenäen. Jun. — Aug. Im F. 24. Antirrhin. alp. Pers. l. c. 2. p. 157.

8. *L. genistifolia.* Willd. l. c. Ginsterblättriges Leinkraut. Auf trockenen Hügeln in Oesterr. d. Schweiz u. Sibirien. May — Jul. Im F. 24. Antirrhin. genistif. Pers. l. c. 2. p. 158.

9. *L. vulgaris.* Willd. l. c. Gemeines Leinkraut. In trockenen Hainen u. auf Wiesen in Eur. May — Jul. Im F. 24.
Antirrhin. Linaria. Pers. l. c.

β. Peloria. Mit monströser Blüthe.

10. *L. chalepensis.* Willd. l. c. 2. q. 642. Aleppisches Leinkraut. In Ital. u. zu Montpellier. Jun. Jul. Im F. ⊙.
Antirrhin. chalep. Pers. l. c.

561. Antirrhinum.

1. *A. majus.* Lin. sp. pl. p. 859. Garten-Löwenmaul. In Südtyrol, u. den noch südlicheren Eur. May — Jul. Im F. ♄.
Orontium majus. Pers. l. c.

2. *A. siculum.* Ucria. apud Roem. arch. 1. p. 69. Sicilianisches Löwenmaul. In Sicilien. Jun. Jul. K. H. 24.
Oront. sicul. Pers. l. c.

562. Nemesia, Nemesie.

1. *N. foetens.* Pers. l. c. 2. p. 159. Stinkende Nemesie. Am Cap. Jul. — Sept. Ch. 24.

563. Maurandia, Maurandie.

1. *M. semperflorens.* Jacq- hort. schoenbr. 3. p. 20. t. 288. Immerblühende Maurandie. In Mexico. Jun. — Sept. W. H. 24.
M. scandens. Pers. l. c. 2. p. 160.

2. *M. antirrhiniflora.* Humboldt et Bompland. Löwenmaulblättrige Maurandie. In Mexico. Jul. — Sept. W. H. 24.

564. Scrophularia, Braunwurz.

1. *Sc. aquatica.* Pers. l. c. Wasser-Braunwurz. An feuchten Stellen in Eur. May — Jul. Im F. ♂.

2. *Sc. betonicaefolia.* Pers. l. c. Betonienblättrige Braunwurz. In Portugall. Jun. Jul. K. H. 24.

3. *Sc. orientalis.* Pers. l. c. Orientalische Braunwurz. Im Orient. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *Sc. altaica.* Pers. l. c. Altaische Braunwurz. Auf den Altaischen Alpen in Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *Sc. vernalis.* Pers. l. c. Frühlings-Braunwurz. In Oesterr. Ungarn, Deutschl. der Schweiz u. Ital. May, Jun. Im F. ♂.

6 *Sc. sambucifolia.* Pers. l. c. 2. p. 161. Hollunderblättrige Braunwurz. In Span. Portug. u. im Orient. Jun. — Aug. K. H. 24.

7. *Sc. canina.* Pers. l. c. Hunds-Braunwurz. In Deutschl. der Schweiz u. Frankr. Jun. Jul. Im F. ☉.

8. *Sc. lucida.* Pers. l. c. Glänzende Braunwurz. In Ital. Candien u. im Orient. Jul. Aug. K. H. 4.

9. *Sc. peregrina.* Pers. l. c. Fremde Braunwurz. In Italien. Jun. Jul. Im F. ☉.

565. Celsia, Celsie.

1. *C. orientalis.* Pers. l. c. Orientalische Celsie. In Dalmatien, Cappadocien u. Armenien. Sept. Oct. Im F. ☉.

2. *C. Arcturus.* Pers. l. c. Gestielte Celsie. In Candien. Jun. — Oct. K. H. ♂.

3. *C. cretica.* Pers. l. c. Candische Celsie. In Candien u. Nordafr. Jun. — Aug. K. H. ♂.

566. Hemimeris, Halbblume.

1. *H. urticifolia.* Pers. l. c. 2. p. 162. Nesselblättrige Halbblume. In Südamer. Jul. — Oct. Ch. ♄.

2. *H. coccinea.* Willd. sp. pl. 3. p. 283. Scharlachfarbige Halbblume. In Südamer. Jul. — Oct. Ch. ♄.
Hemimeris linearis. Pers. l. c.
Celsia — Jacq. ic. rar. 3. t. 497. Collect. 2. p. 270.

567. Digitalis, Fingerhut.

1. *D. purpurea.* Pers. l. c. Rother Fingerhut. Auf Bergen in Deutschl. der Schweiz u. Frankr. Jun. Jul. Im F. ♂.

2. *D. ambigua.* Lin. suppl. 280. Blafsgelber Fingerhut. In Wäldern v. Oesterr. Deutschl. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 4.
D. ochroleuca. Pers. l. c.

3. *D. lutea.* Pers. l. c. Gelber Fingerhut. In Frankr. u. Ital. Jun. Jul. Im F. 4.

4. *D. ferruginea.* Pers. l. c. Rostfarbiger Fingerhut. In Ital. Jun. Jul. Im F. 4.

5. *D. lanata.* Pers. l. c. 2. p. 163. Wolliger Fingerhut. Auf sonnigen Hügeln in Ungarn u. Griechenland. Jun. Jul. Im F. 4.

6. *D. laevigata.* Pers. l. c. Glatter Fingerhut. Auf Kalkfelsen in Croatien. Jun. Jul. Im F. 4.

7. *D. obscura.* Pers. l. c. Dunkler Fingerhut. In Spanien. Jun. Jul. Im F. 4.

568. Mimulus, Gauklerblume.

1. *M. glutinosus.* Pers. l. c. Klebrige Gauklerblume. —. Jun. Jul. Ch. ♄.

2. *M. luteus.* Pers. l. c. Gelbe Gauklerblume. In Peru. Jun. Jul. Ch. ☉.

569. Halleria, Hallerie.

1. *H. lucida.* Pers. l. c. Glänzende Hallerie. In Wäldern am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

570. Trevirana, Trevirane.

1. *Tr. coccinea.* Willd. enum. 2. p. 638. Scharlachrothe Trevirane. Auf Bergen in Jamaica. Aug. Sept. W. H. 2.
Achimenes cocc. Pers. l. c. 2. p. 165.
Cyrilla pulchella. L'Heritier stirp. nov. 1. p. 147. t. 71.

571. Besleria, Beslerie.

1. *B. serrulata.* Pers. l. c. Gezähnelte Beslerie. In Westind. May, Jun. W. H. ♄.

572. Capraria, Herzblume.

1. *C. lucida.* Ait. hort. kew. 2. p. 353. Glänzende Herzblume. Am Cap. —. Ch. ♂.
Teedia lucida. Pers. l. c. 2. p. 166.

2. *C. undulata.* Pers. l. c. Wellenblättrige Herzblume. Auf Hügeln am Cap. —. Ch. ♄.

573. Browallia, Browallie.

1. *Br. demissa.* Pers. l. c. Niedrige Browallie. In Südamer. Jun. W. H. ☉.

2. *Br. elata.* Pers. l. c. Hohe Browallie. In Peru. Aug. W. H. ☉.

574. Bontia, Bontie.

1. *B. daphnoides.* Pers. l. c. 2. p. 168. Seidelbastartige Bontie. Auf den Antillen. Jun. W. H. ♄.

575. Brunsfelsia, Brunsfelsie.

1. *Br. americana.* Pers. l. c. Americanische Brunsfelsie. Im wärmer. Amer. —. W. H. ♄.

576. Crescentia, Kürbisbaum.

1. *Cr. Cujete.* Pers. l. c. Grofsfrüchtiger Kürbisbaum. Auf den Caraibischen Ins. Jun. Jul. W. H. ♄.

2. *Cr. pinnata.* Jacq. collect. 3. p. 203. t. 18. (flos). Fragm. bot. p. 30. t. 33. f. 4. (folium et fructus). Gefiederter Kürbisbaum. Zu Mozambique. —. W. H. ♄.

577. Chelone, Schildblume.

1. *Ch. obliqua.* Pers. l. c. 2. p. 169. Schiefe Schildblume. In Virgin. u. Canada. Jun. Jul. Im F. 4.

2. *Ch. barbata.* Pers. l. c. Bartige Schildblume. In Mexico. May — Aug. Im F. 4.

578. Pentstemon, Bartfaden.

1. *P. campanulata.* Willd. sp. pl. 3. p. 228. Glockenförmiger Barttaden. In Mexico. Jul. Aug. Ch. 4.
Chelone campanul. Pers. l. c.

579. Bignonia, Trompetenblume.

1. *B. Catalpa.* Pers. l. c. 2. p. 170. Gemeine Trompetenblume. In Carol. u. Florida. Jul. Aug. Im F. ♄.

2. *B. longissima.* Pers. l. c. Langfrüchtige Trompetenblume. In Westind. Jul. Aug. W. H. ♄.

3. *B. aequinoctialis.* Pers. l. c. Cajennische Trompetenblume. Zu Cajenne. Jun. Jul. W. H. ♄.

4. *B. rigescens.* Pers. l. c. 2. p. 171. Steifblättrige Trompetenblume. Zu Caracas. Jul. W. H. ♄.

5. *B. paniculata.* Pers. l. c. Rispenblüthige Trompetenblume. Im wärmer. Amer. Jul. W. H. ♄.

6. *B. grandifolia.* Pers. l. c. Grofsblättrige Trompetenblume. Zu Caracas. Aug. Sept. W. H. ♄.

7. *B. capreolata.* Pers. l. c. Rankende Trompetenblume. In Nordamer. May, Jun. Im F. ♄.

8. *B. echinata.* Pers. l. c. Weichstachlige Trompetenblume. In Carthagena. —. W. H. ♄.

9. *B. chrysantha.* Pers. l. c. Goldfarbige Trompetenblume. Zu Caracas. May. W. H. ♄.

10. *B. Leucoxylon.* Pers. l. c. Weifsholzige Trompetenblume. In Jamaica an den Ufern der Flüsse. Jul. Aug. W. H. ♄.

11. *B. radicans.* Pers. l. c. Wurzelnde Trompetenblume. In Pensylvan. u. Florida. Jun. Jul. Im F. ♄.

12. *B. grandiflora.* Pers. l. c. Grofsblumige Trompetenblume. In China u. Japan. —. Ch. ♄.

13. *B. stans.* Pers. l. c. Eschenblättrige Trompetenblume. Im wärmer. Amer. —. W. H. ♄.

14. *B. pandorana.* Pers. l. c. Geigenblättrige Trompetenblume. In Neuholl. Apr. May. Ch. ♄.

15. Eine noch unbeschriebene Art aus dem jardin des plantes v. Paris.

580. Xenopoma, Fremdlingstrank.

1. *X. obovatum.* Willd. enum. suppl. p. 43. Gewürzhafter Fremdlingstrank. In China. Jul. — Sept. Ch. ♄.
Frutex innominatus. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 50. t. 498.

581. Gloxinia, Gloxinie.

1. *Gl. maculata.* Pers. l. c. 2. p. 174. Gefleckte Gloxinie. Zu Carthagena in Amer. Jul. Aug. W. H. 2.

582. Gesneria, Gesnerie.

1. *G. tomentosa.* Pers. l. c. 2. p. 175. Filzige Gefsnerie. An Flüssen in Südamer. Jul. Aug. W. H. ♄.

583. Ruellia, Ruellie.

1. *R. patula.* Pers. l. c. 2. p. 176. Ausgebreitete Ruellie. In Ostind. Jul. Aug. W. H. ☉.

2. *R. lactea.* Pers. l. c. Milchfarbige Ruellie. In Mexico. Jun. Jul. W. H. 2.

3. *R. clandestina.* Pers. l. c. Heimliche Ruellie. Auf den Ins. Barbados u. St. Crux. Jun. Jul. W. H. 2.

4. *R. varians.* Pers. l. c. Veränderliche Ruellie. Zu Coromandel. Nov. — März. W. H. ♄. Eranthemum pulchellum. Andrews bot. repos. p. et. t. 80.

5. *R. macrophylla.* Pers. l. c. 2. p. 177. Grofsblättrige Ruellie. Zu St. Martha in Amer. Jun. — Aug. W. H. ♄.

6. *R. tuberosa.* Pers. l. c. Knollige Ruellie. In Jamaica. Jul. Aug. W. H. 24.

584. Barleria, Barlerie.

1. *B. Prionitis.* Pers. l. c. 2. p. 178. Fufsangelförmige Barlerie. In Ostind. Jul. Aug. W. H. ♄.

2. *B. flava.* Jacq. eclog. fasc. 5. p. 67. t. 46. Gelbe Barlerie. In Aegypten. Bl. das ganze Jahr hindurch. Ch. 24.
Justicia flava. Pers. l. c. 1. p. 21.

585. Harrachia, Harrachie.

1. *H. speciosa.* Jacq. eclog. fasc. 3. p. 33. t. 21. Schöne Harrachie. In Ostind. May — Jul. W. H. ♄.
Justiciainfundibuliformis. Pers. l. c. 1. p. 22.

586. Acanthus, Bärenklaue.

1. *A. mollis.* Pers. l. c. 2. p. 179. Aechte Bärenklaue. In Sicilien. Jul. Aug. K. H. 24.

2. *A. spinosus.* Pers. l. c. Stachlige Bärenklaue. In Ital. Jun. Jul. K. H. 24.

587. Melianthus, Honigblume.

1. *M. major.* Pers. l. c. 2. p. 182. Grofse Honigblume. Am Cap. Apr. — Jul. Ch. ♄.

2. *M. comosus.* Pers. l. c. Schopfartige Honigblume. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA,

SILICULOSAE.

588. Crambe, Meerkohl.

1. *Cr. maritima.* Pers. l. c. 2. p. 184. Gemeiner Meerkohl. An den nördlichen Meeresküsten. Jun. Jul. Im F. 4.

2. *Cr. hispanica.* Pers. l. c. Spanischer Meerkohl. In Span. Jun. Jul. Im F. ⊙.

3. *Cr. filiformis.* Pers. l. c. Fadenförmiger Meerkohl. In Patagonien. Jul. — Oct. Ch. 4.

589. Iberis, Bauernsenf.

1. *I. semperflorens.* Pers. l. c. 2. p. 186. Immerblühender Bauernsenf. In Sicilien u. Persien. Bl. das ganze Jahr hindurch. K. H. ♄.

2. *I. gibraltarica.* Pers. l. c. Gibraltarischer Bauernsenf. Zu Gibraltar. Jul. — Oct. K. H. ♄.

3. *I. sempervirens.* Pers. l. c. Immergrüner Bauernsenf. In Candien u. Italien. May — Jul. K. H. ♄.

4. *I. umbellata.* Pers. l. c. 2. p. 187. Doldentragender Bauernsenf. In Istrien, Dalmatien, Toscana, Spanien u. Candien. Jun. Jul. Im F. ⊙.

5. *I. amara.* Pers. l. c. Bitterer Bauernsenf. In der Schweiz u. Deutschl. Jun. Jul. Im F. ⊙.

6. *I. linifolia.* Pers. l. c. Leinblättriger Bauernsenf. In Spanien, Portugall, u. Montpellier. Jun. Jul. K. H. ♂.

590. Alyssum, Steinkraut.

1. *A. saxatile.* Pers. l. c. 2. p. 191. Gebirgs-Steinkraut. In Oesterr. u. Candien auf Felsen. Jun. — Aug. Im F. ♄.

2. *A. montanum.* Pers. l. c. 2. p. 192. Berg-Steinkraut. In Deutschl. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 2.

591. Peltaria, Scheibenkraut.

1. *P. alliacea.* Pers. l. c. 2. p. 193. Knoblauchduftendes Scheibenkraut. Bey Stixenstein in Oesterr. dann auf Alpen in Istrien u. Croatien. Jun. Jul. Im F. 2.

592. Biscutella, Brillenschote.

1. *B. apula.* Pers. l. c. Apulische Brillenschote. In Ital. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *B. laevigata.* Pers. l. c. Glatte Brillenschote. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz. Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 2.

593. Isatis, Waid.

1. *I. tinctoria.* Pers. l. c. Färber-Waid. In Oesterr. u. an den Meeresküsten v. Südeur. Jun. Jul. Im F. ♂.

594. Lunaria, Mondviole.

1. *L. rediviva.* Pers. l. c. 2. p. 194. Spitzfrüchtige Mondviole. Im nördlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. ♄.

2. *L. annua.* Pers. l. c. Stumpffrüchtige Mondviole. In schattigen Wäldern Deutschlands u. Schwedens. Jun. Jul. Im F. ♂.

SILIQUOSAE.

595. Dentaria, Zahnwurz.

1. *D. enneaphylla.* Pers. l. c. Neunblättrige Zahnwurz. Auf waldigen Bergen in Oesterr. u. Ital. Jun. Jul. Im F. 2.

2. *D. bulbifera.* Pers. l. c. Zwiebeltragende Zahnwurz. Auf waldigen Bergen v. Eur. Jun. Jul. Im F. 2.

596. Cheiranthus, Levkoy.

1. *Ch. Cheiri.* Pers. l. c. 2. p. 200. Lack-Levkoy. In Dalmatien, der Schweiz, Frankr. Span. u. Engl. auf Mauern. Jun. Jul. K. H. ♂.

2. *Ch. maritimus.* Lin. sp. pl. p. 924. Meerstrands-Levkoy. An den mittelländischen Meeresküsten. May — Aug. Im F. ☉.
Hesperis maritima. Pers. l. c. 2. p. 203.

3. *Ch. incanus* Pers. l. c. 2. p. 201. Winter-Levkoy. Am Meerstrande in Span. Febr. März. K. H. ♄.

4. *Ch. fenestralis.* Pers. l. c. Zwerg-Levkoy. —. Jun. Jul. K. H. ♂.

5. *Ch. annuus.* Pers. l. c. Sommer-Levkoy. Am Meeresstrande in Südeur. Jun. Jul. Im F. ☉.

597. Hesperis, Nachtviole.

1. *H. tristis.* Pers. l. c. 2. p. 202. Eigentliche Nachtviole. In Oesterr. u. Ungarn auf trockenen Haiden. Jun. Jul. Im F. ♂.

2. *H. matronalis.* Pers. l. c. Rothe Nachtviole. In Deutschl. der Schweiz u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. ♂.

β. hortensis, flore pleno albo. Mit weifsgefüllter Blüthe.

3. *H. inodora.* Pers. l. c. Fleischfarbige Nachtviole. Bey Wien u. Montpellier. Jun. Jul. Im F. ♂.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

TRIANDRIA.

598. Tamarindus, Tamarinden.

1. *T. indica.* Pers. l. c. 2. p. 211. Indische Tamarinden. In Ind. Aegypt. Arab. u. Amer. May, Jun. W. H. ♄.

599. Sisyrinchium, Schweinsrüssel.

1. *S. racemosum.* Pers. l. c. 1. p. 49. Traubentragender Schweinsrüssel. In Brasilien. May, Jun. W. H. ♃.
S. palmifolium. Lin. mant. 122.
Moraea palmifolia. Thunb. disser. de Moraea p. 8. n. 6.

2. *S. striatum.* Pers. l.c. 1. p. 50. Gestreifter Schweinsrüssel In Mexico. Jun. Jul. Ch. 4.
Moraea sertata. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 6. t. 11.

3. *S. Bermudiana.* Pers. l. c. Bermudischer Schweinsrüssel. Auf den Bermudischen Ins. Jun. Jul. Ch. 4.

4. *S. tenuifolium.* Humboldt et Bompland. Zartblättriger Schweinsrüssel. In Mexico. Jul. Aug. Ch. 4.

600. Ferraria, Ferrarie.

1. *F. Pavonia.* Cavan. diss. 6. p. 342. t. 189. f. 1. Pfauenartige Ferrarie. In Mexico u. Peru. Jul. Aug. W. H. 4.
Tigridia Pavonia. Pers. l. c. 1. p. 50.

2. *F. undulata.* Lin. sp. pl. p. 1353. Wellenförmige Ferrarie. Am Cap. May, Jun. Ch. 4.
Ferraria punctata. Pers. l. c.

3. *F. minor.* Pers. l. c. Punktirte Ferrarie. Am Cap. May — Jul. Ch. 4.
Ferraria Ferrariola. Willd. sp. pl. 3. p. 581.
Moraea — Jacq. collect. 4. p. 141.

PENTANDRIA.

601. Lobelia, Lobelie.

1. *L. longiflora.* Pers. l. c. 2. p. 213. Langblüthige Lobelie. In Jamaica. Jun. — Aug. W. H. 4.

2. *L. cardinalis.* Pers. l. c. Cardinals-Lobelie. In Virgin. u. Carol. Jun. — Aug. K. H. 4.

3. *L. fulgens.* Willd. hort. berol. 2. p. 85. Glänzende Lobelie. In Mexico. Jun. — Aug. Ch. 24.

4. *L. splendens.* Willd. l. c. p. et t. 86. Schimmernde Lobelie. In Mexico. Jun. — Aug. Ch. 24.

5. *L. siphilitica.* Pers. l. c. Gemeine Lobelie. In Wäldern v. Virgin. Jul. Aug. K. H. 24.

6. *L. surinamensis.* Pers. l. c. Surinamische Lobelie. Zu Surinam. Sept. Oct. W. H. ♄.

7. *L. Erinus.* Pers. l. c. 2. p. 214. Langgestielte Lobelie. Am Cap. May — Oct. Ch. ☉.

8. *L. pubescens.* Pers. l. c. Weichhaarige Lobelie. Am Cap. May — Aug. Ch. 24.

9. *L. coronopifolia.* Pers. l. c. Schlitzblättrige Lobelie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.

602. Hermannia, Hermannie.

1. *H. althaeifolia.* Pers. l. c. 2. p. 216. Eibischblättrige Hermannie. Am Cap, wie alle folgende. Apr. — Jul. Ch. ♄.
H. aurea. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 46. t. 214.

2. *H. plicata.* Pers. l. c. Gefaltene Hermannie. Apr. — Jul. Ch. ♄.
H. althaeifolia. Jacq. l. c. 2. p. 46. t. 213.

3. *H. candicans.* Pers. l. c. Weifsblättrige Hermannie. May, Jun. Ch. ♄.

4. *H. disticha.* Pers. l. c. Zweyzeilige Hermannie. Apr. — Jun. Ch. ♄.
H. rotundifolia. Jacq. l. c. 1. p. 63. t. 118.

5. *H. micans.* Pers. l. c. Glänzende Hermannie. Apr. — Aug. Ch. ♄.
H. latifolia. Jacq. l. c. 1. p. 64. t. 119.

6. *H. scordifolia.* Pers. l. c. Gamanderblättrige Hermannie. Apr. — Jun. Ch. ♄.

7. *H. denudata.* Pers. l. c. Glatte Hermannie. Apr. — Aug. Ch. ♄.

8. *H. disermaefolia.* Pers. l. c. Wellenblättrige Hermannie. May — Aug. Ch. ♄.

9. *H. alnifolia.* Pers. l. c. 2. p. 217. Erlenblättrige Hermannie. May — Jul. Ch. ♄.

10. *H. cuneifolia.* Pers. l. c. Keilblättrige Hermannie. Apr. May. Ch. ♄.

11. *H. holosericea.* Pers. l. c. Sammetblättrige Hermannie. Nov. Dec. u. May — Jul. Ch. ♄.

12. *H. hirsuta.* Pers. l. c. Behaarte Hermannie. May, Jun. Ch. ♄.

13. *H. scabra.* Pers. l. c. Scharfblättrige Hermannie. Apr. — Aug. Ch. ♄.

14. *H. multiflora.* Pers. l. c. Vielblüthige Hermannie. Apr. — Aug. Ch. ♄.

15. *H. flammea.* Pers. l. c. Feuerfarbige Hermannie. May — Jul. Ch. ♄.

16. *H. hyssopifolia.* Pers. l. c. Isopblättrige Hermanie. May — Aug. Ch. ♄.

17. *H. lavandulaefolia.* Pers. l. c. Lavandelblättrige Hermannie. May — Jul. Ch. ♄.

18. *H. procumbens.* Pers. l. c. Liegende Hermannie. —. Ch. ♄.

19.)
20.) Noch unbeschriebene Arten.

603. Mahernia, Mahernie.

1. *M. pinnata.* Pers. l. c. 2. p. 218. Gefiederte Mahernie. Am Cap. May — Aug. Ch. ♄.

2. *M. diffusa.* Pers. l. c. Ausgebreitete Mahernie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

3. *M. incisa.* Pers. l. c. Eingeschnittene Mahernie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

4. *M. odorata.* Pers. l. c. Wohlriechende Mahernie. Am Cap. May — Jul. Ch. ♄.

604. Melochia, Melochie.

1. *M. pyramidata.* Pers. l. c. Pyramiden-Melochie. In Brasilien u. auf den Caraibisch. Ins. —. W. H. ♄.

2. *M. caracasana.* Pers. l. c. 2. p. 219. Caracassche Melochie. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. ♄.

605. Passiflora, Passionsblume.

1. *P. serratifolia.* Pers. l. c. Sägeblättrige Passionsblume. Zu Surinam. Jun. Jul. W. H. ♄.

2. *P. cuprea.* Pers. l. c. Kupferfarbige Passionsblume. Auf Providenze. Jul. Aug. W. H. ♄.

3. *P. maliformis.* Pers. l. c. Aepfeltragende Passionsblume. Auf St. Domingo, Martinique, Jamaica u. Cajenne. Jun. W. H. ♄.

4. *P. quadrangularis.* Pers. l. c. Viereckige Passionsblume. In Wäldern v. Jamaica. Dec. Jän. u. Jun. Jul. W. H. ♄.

5. *P. alata.* Pers. l. c. 2. p. 220. Geflügelte Passionsblume. In Westind. Jänn. — März. Jul. Aug. W. H. ♄.

6. *P. perfoliata.* Pers. l. c. Durchstochene Passionsblume. In Südjamaica am Meeresstrande. Jun. — Aug. W. H. ♄.

7. *P. rubra.* Pers. l. c. Rothe Passionsblume. In Jamaica, St. Domingo, Martinique u. Cajenne. Jun. Jul. W. H. ♄.

8. *P. lunata.* Pers. l. c. Mondförmige Passionsblume. In Jamaica u. Mexico. Jun. Jul. W. H. ♄.

9. *P. tuberosa.* Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 49. t. 496. In Westind. Oct. Nov. W. H. ♄.

10. *P. Vespertilio* ? Pers. l. c. Fledermausartige Passionsblume. In Amer. Jun. Jul. W. H. ♄.

11. *P. punctata.* Pers. l. c. 2. p. 221. Punktirte Passionsblume. In Peru. —. W. H. ♄.

12. *P. lutea.* Pers. l. c. Gelbe Passionsblume. In Virgin. u. Jamaica. Jun. Jul. W. H. 4.

13. *P. angustifolia.* Pers. l. c. Schmalblättrige Passionsblume. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. ♄. P. heterophylla. Ait. hort. kew. 3. p. 309.

14. *P. minima.* Pers. l. c. Kleinste Passionsblume. Zu Curassao. Jun. Jul. W. H. ♄.

15. *P. suberosa.* Pers. l. c. Korkstämmige Passionsblume. Auf St. Domingo u. den Antillen. Jul. Aug. W. H. ♄.

16. *P. peltata.* Pers. l. c. Schildblättrige Passionsblume. Auf den Antillen. Jul. Aug. W. H. ♄.

17. *P. glauca.* Pers. l. c. Graugrüne Passionsblume. Zu Cajenne. Jun. Jul. W. H. ♄.

18. *P. caracasana.* Willd. enum. 2. p. 697. Caracassch Passionsblume. Zu Caracas. —. W. H. ♄.

19. *P. holosericea.* Pers. l. c. Sammetartige Passionsblume. Auf Veracrux. Jun. Jul. W. H. ♄.

20. *P. foetida.* Pers. l. c. 2. p. 222. Stinkende Passionsblume. Zu St. Domingo, Martinique u. Curassao. Jul Aug. W. H. ☉.

21. *P. ciliata.* Pers. l. c. Gefranzte Passionsblume. Zu Jamaica. —. W. H. ♄.

22. *P. incarnata.* Pers. l. c. Fleischfarbige Passionsblume. In Virgin. Brasilien u. Peru. Jun. — Aug. K. H. ♄.

23. *P. coerulea.* Pers. l. c. Gemeine Passionsblume. In Brasilien. Jun. — Aug. K. H. ♄.

β. angustifolia. Mit schmäleren Blatteinschnitten.

P. pedata. Hortulan.

24. *P. Adiantum.* Willd. enum. 2. p. 698. Krullfarn-Passionsblume. —. Jul. W. H. ♄.

606. Erodium, Reiherschnabel.

1. *E. ciconium.* Pers. l. c. 2. p. 224. Langer Reiherschnabel. In Span. Ital. Montpellier u. im Walliserland. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *E. moschatum.* Pers. l. c. Bisamduftender Reiherschnabel. In Südeur. Sibir. der Barbarey, Brasilien, Peru u. am Cap. Jun. — Oct. Im F. ☉.

3. *E. hirtum.* Pers. l. c. Rauher Reiherschnabel. In Aegypt. Jun. Jul. Im F. ⊙.

4. *E. gruinum.* Pers. l. c. Candischer Reiherschnabel. In Candien, Nordafr. Ital. u. Span. Jun. — Aug. Im F. ⊙.

5. *E. hymenodes.* Pers. l. c. 2. p. 225. Dreytheiliger Reiherschnabel. In Felsenritzen des Berges Atlas. Jun. — Aug. K. H. 24.
E. trilobatum. Jacq. ic. rar. 3. t. 508. Collect. 4. p. 200.

6. *E. malacoides.* Pers. l. c. Malvenartiger Reiherschnabel. In Südeur. u. den Canarischen Ins. Jun. — Aug. Im F. ⊙.

7. *E. chamaedryoides.* Pers. l. c. Niedriger Reiherschnabel. Auf Minorca u. zu Corsica am St. Michaelsberge. Jun. — Sept. K. H. ♄.
Geranium Reichardi. Murr. in. comment. goett. 1780. p. 11. t. 3.

HEPTANDRIA.

607. Pelargonium, Kranichschnabel.

1. *P. astragalifolium.* Pers. l. c. 2. p. 227. Traganthblättriger Kranichschnabel. Ist sammt den meisten folgenden am Cap zu Hause. Jul. Aug. Ch. 24.
P. pinnatum. Ait. hort. kew. 2. p. 417.

2. *P. barbatum.* Pers. l. c. Bartiger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. 24.

3. *P. melananthon.* Pers. l. c. Schwarzblüthiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 24.

4. *P. rapaceum.* Pers. l. c. 2. p. 228. Rübenartiger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. 24.

5. *P. lobatum.* Pers. l. c. Lappiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 4.

6. *P. apiifolium.* Jacq. eclog. fasc. 2. p. 45. t. 27. Epichblättriger Kranichschnabel. Am Cap? Jun. — Aug. Ch. ♄.

7. *P. triste.* Pers. l. c. Trauernder Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. 4.

8. *P. sanguineum.* Wendl. collect. pl. 2. p. 43. t. 53. Blutiger Kranichschnabel. Am Cap? Iun. Ch. ♄.

9. *P. flavum.* Pers. l. c. Gelber Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. 4.

β. daucoides. Mit möhrenartigen Blättern.

10. *P. blattarium.* Pers. l. c. Königskerzenartiger Kranichschnabel. Iun. — Aug. Ch. 4.

11. *P. tabulare.* Pers. l. c. 2. p. 229. Tafelbergs-Kranichschnabel. Jun. — Oct. Ch. 4.

12. *P. alchemilloides.* Pers. l. c. Löwenfufsblättriger Kranichschnabel. Jun. — Oct. Ch. 4.

13. *P. odoratissimum.* Pers. l. c. Wohlriechender Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 4.

14. *P. fragrans.* Willd. hort. berol. 2. p. 77. t. 77. Duftender Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♄.

15. *P. grossularioides.* Pers. l. c. Stachelbeerblättriger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 4.

16. *P. anceps.* Pers. l. c. Zweykantiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 4.

17. *P. columbinum.* Pers. l. c. Tauben-Kranichschnabel. Jun. — Aug. Im F. ☉.

18. *P. tricolor.* Curt. bot. mag. 240. Dreyfarbiger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. 4. Pelarg. violarium. Pers. l. c.

19. *P. lacerum.* Pers. l. c. 2. p. 230. Schlitzblättriger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 4.

β. longicaule. Mit höherem Wuchse.

20. *P. coriandrifolium.* Pers. l. c. Coriander blättriger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 4.

21. *P. glaucum.* Pers. l. c. Lanzetblättriger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♄.

22. *P. diversifolium.* Pers. l. c. Verschiedenblättriger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ♄.

23. *P. betulinum.* Pers. l. c. Birkenblättriger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ♄.

24. *P. acetosum.* Pers. l. c. Saurer Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♄.

25. *P. pumilum.* Willd. enum. 2. p. 704. Niedriger Kranichschnabel. May — Aug. Ch. ♄.

26. *P. stenopetalum.* Pers. l. c. Schmalblüthiger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♄.

27. *P. hybridum.* Pers. l. c. Bastardartiger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♄.

28. *P. malvaefolium.* Jacp. eclog. ined. Malvenblättriger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ♄.

β. lateritium. Mit ziegelrothen Blüthen. Pelarg. lateritium. Willd. enum. suppl. p. 47.

29. *P. zonale.* Pers. l. c. 2. p. 231. Schwarzbemahlter Kranichschnabel. Jun. — Sept. Ch. ♄.

β. marginatum. Mit bemahltem Blattrande.

γ. floribus albis. Mit weissen Blüthen.

30. *P. inquinans.* Pers. l. c. Beschmutzender Kranichschnabel. Jul. — Sept. Ch. ♄.

31. *P. heterogamum.* Pers. l. c. Rother Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♄.

32. *P. monstrum.* Pers. l. c. Ungestalteter Kranichschnabel. —. Jun. — Aug. Ch. ♄.

33. *P. peltatum.* Pers. l. c. Schildblättriger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ♄.

β. foliis aldo marginatis. Mit weifsgeränderten Blättern.

34. *P. lateripes.* Pers. l. c. Seitenstieliger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ♄.

35. *P. tetragonum.* Pers. l. c. Vierkantiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♄.

36. *P. cordatum.* Pers. l. c. Herzblättriger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♄.

37. *P penicillatum.* Willd. hort. berol. 1. p. et t. 37. Büschliger Kranichschnabel. —.—. Ch. ♄.

38. *P. conduplicatum.* Willd. enum. 2. p. 705. Doppeltgezähnter Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♄.
P. cordifolium. Hortulan.

39. *P. cucullatum.* Pers. l. c. Kappenförmiger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♄.

40. *P. Barringtonii.* Willd. enum. 2. p. 706. Barrington'scher Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♄.

41. *P. angulosum.* Pers. l. c. Eckiger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ♄.

42. *P. sidaefolium.* Willd. l. c. Sidablättriger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♄.

43. *P. speciosum.* Willd. l. c. Schöner Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♄.

44 *P. acerifolium.* Pers. l. c. Ahornblättriger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♄.

45. *P. beaufortianum.* Pers. l. c. Beaufortischer Kranichschnabel. Jun. —. Aug. Ch. ♄.

46. *P. papilionaceum.* Pers. l. c. Schmetterlingartiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♄.

47. *P. grandiflorum.* Pers. l. c. Grofsblüthiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♄.

48. *P. Cotyledonis.* Pers. l. c. Nabelkrautartiger Kranichschnabel. Auf der Ins. St. Helena u. am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

49. *P. cuspidatum.* Willd. enum. suppl. p. 47. Zugespitzter Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♄.

50. *P. amplissimum.* Willd. l. c. p. 48. Ansehnlicher Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♄.

51. *P. sororium.* Willd. l. c. Verschwisterter Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♄.

52. *P. echinatum.* Pers. l. c. 2. p. 232. Stachliger Kranichschnabel. Apr. May. Ch. ♄. Pelarg. hamatum. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 7. t. 138.

53. *P.* australe. Pers. l. c. Südlicher Kranichschnabel. In Neuholl. Jun. — Aug. Ch. ♄.

54. *P. vitifolium.* Pers. l. c. Weinblättriger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♄.

55. *P. capitatum.* Pers. l. c. Kopfförmiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♄.

56. *P. glutinosum.* Pers. l. c. Klebriger Kranichschnabel. Jun. — Oct. Ch. ♄.

57. *P. hispidum.* Pers. l. c. Rispenblüthiger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♄.

58. *P. tomentosum.* Pers. l. c. Filziger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ♄.

59. *P. ribifolium.* Pers. l. c. Johannisbeerblättriger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♄.

60. *P. quercifolium.* Pers. l. c. Eichenblättriger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♄.

61. *P. balsameum.* Pers. l. c. Balsamischer Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♄.

62. *P. delphinifolium.* Willd. enum. 2. p. 708. Rittersporнblättriger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♄.

63. *P. Radula.* Pers. l. c. Raspelblättriger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♄.

β. roseum Hortulan. Mit rosenduftenden Blättern.

64. *P. denticulatum.* Pers. l. c. Gezähnelter Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♄.

65. *P. bicolor.* Pers. l. c. Zweyfarbiger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ♄.

66. *P. quinquevulnerum.* Pers. l. c. Fünffleckiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♄.

67. *P. canariense.* Pers. l. c. Canarischer Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♄.

68. *P. tricuspidatum.* Pers. l. c. 2. p. 233. Dreyspitziger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♄.

79. *P. scabrum.* Pers. l. c. Scharfblättriger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ♄.

70. *P. rigidum.* Pers. l. c. Steifblättriger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♄.

71. *P. crispum.* Pers. l. c. Krauser Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ♄.

72. *P. hermannifolium.* Pers. l. c. Hermannienblättriger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ♄.

73. *P. gratum.* Willd. enum. 2. p. 710. Citronenduftender Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♄.
P. citriodorum. Hortulan.

74. *P. adulterinum.* Pers. l. c. Verschwägerter Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♄.

75. *P. semitrilobum.* Pers. l. c. Halbdreylappiger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ♄.

76. *P. tripartitum.* Pers. l. c. Dreytheiliger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♄.
P. trifidum. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 5. t. 133.

77. *P. fulgidum.* Pers. l. c. Schimmender Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ♄.

78. *P. gibbosum.* Pers. l. c. Höckeriger Kranichschnabel. Sept. Oct. Ch. ♄.

79. *P. exstipulatum.* Pers. l. c. Nacktwinkliger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ♄.

80. *P. ternatum.* Pers. l. c. Gedreyter Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♄.

81. *P. incisum.* Pers. l. c. Eingeschnittener Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♄.

82. *P. carnosum.* Pers. l. c. Fleischiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♄.

83. *P. crithmifolium.* Pers. l. c. 2. p. 234. Bacillenblättriger Kranichschnabel. Febr. März. Ch. ♄.
P. paniculatum. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 6. t. 137.

84. *P. hirtum.* Pers. l. c. Behaarter Kranichschnabel. März, Apr. Ch. ♄.

Nebst mehreren andern noch unbeschriebenen Arten.

DECANDRIA.

608. Geranium, Storchschnabel.

1. *G. sibiricum.* Pers. l. c. Sibirischer Storchschnabel. In Sibirien u. China. Jun. Jul. K. H. 24.

2. *G. sanguineum.* Pers. l. c. Bluthrother Storchschnabel. In Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *G. anemonefolium.* Pers. l. c. Anemonenblättriger Storchschnabel. Auf Madera. Jun. — Aug. K. H. ♄.

4. *G. macrorrhizum.* Pers. l. c. 2. p. 235. Langwurzliger Storchschnabel. In Ital. u. Kärnthen. May, Jun. Im F. 24.

5. *G. phaeum.* Pers. l. c. Rothbrauner Storchschnabel. In Oesterr. Ungarn, Steyerm. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 24.

6. *G. lividum.* Pers. l. c. Bläulicher Storchschnabel. In Oesterr. der Schweiz. u. Frankr. May, Jun. Im F. 24.

7. *G. reflexum.* Pers. l. c. Zurückgebogener Storchschnabel. In Ital. Jun. Jul. K. H. 24.

8. *G. striatum.* Pers. l. c. Gestreifter Storchschnabel. In Ital. Jun. Jul. K. H. 24.

9. *G. sylvaticum.* Pers. l. c. Wald-Storchschnabel. Auf Niederalpen an Quellen im nördlicher. Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

10. *G. pratense.* Pers. l. c. Wiesen-Storchschnabel. Auf Bergwiesen des nördlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

11. *G. canescens.* Pers. l. c. Grauer Storchschnabel. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.

12. *G. incanum.* Pers. l. c. Bestäubter Storchschnabel. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.

13. *G. pyrenaicum.* Pers. l. c. 2. p. 236. Pyrenäischer Storchschnabel. Auf Wiesen in Engl. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 24.

14. *G. umbrosum.* Pers. l. c. Schattenliebender Storchschnabel. In Oesterr. u. Ungarn. Jun. Jul. Im F. 24.

15. *G. divaricatum.* Pers. l. c. Ausgebreiteter Storchschnabel. In Ungarn, Böhmen u. Sibirien. Jun. — Aug. Im F. ⊙.

16. *G. lucidum.* Pers. l. c. Glänzender Storchschnabel. An schattigen Oertern in Eur. Jun. Jul. Im F. ⊙.

609. Brownea, Brownea.

1. *Br. leucantha.* Jacq. fragm. bot. p. 26. n. 88. t. 20. et 21. Weifsblüthige Brownea. Zu Caracas? —. W. H. ♄.

DODECANDRIA.

610. Guazuma, Guazuma.

1. *G. ulmifolia.* Pers. l. c. 2. p. 238. Rüsterblättrige Guazuma. Auf Südamericanischen Feldern. —. W. H. ♄.
Bubroma Guazuma. Willd. sp. pl. 3. p. 1423.
Theobroma Guazuma. Lin. sp. pl. p. 1100.

611. Abroma, Abroma.

1. *A. augusta* Pers. l. c. Prächtige Abroma. In Ostind. Aug. Sept. W. H. ♄.

612. Monsonia, Monsonie.

1. *M. lobata.* Pers. l. c. Gelappte Monsonie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

613. Helicteris, Schraubenbaum.

1. *H. jamaicensis.* Pers. l. c. Westindischer Schraubenbaum. Am Meeresstrande zu Jamaica. Jun. Jul. W. H. ♄.

2. *H. baruensis.* Pers. l. c. 2. p. 239. Baruensischer Schraubenbaum. Auf der Insel Baru u. zu Panama. —. W. H. ♄.

614. Sterculia, Stinkbaum.

1. *St. Balanghas.* Pers. l. c. Eyförmiger Stinkbaum. In Ostind. —. W. H. ♄.

2. *St. platanifolia.* Pers. l. c. 2. p. 240. Platanenblättriger Stinkbaum. In Japan u. China. —. Ch. ♄.

615. Dombeya, Dombeye.

1. *D. ferruginea.* Pers. l. c. Braune Dombeye. Auf der St. Moritzinsel. —. W. H. ♄.

2. *D. nivea.* Cat. hort. carlsruhan. p. 95. Weifse Dombeye. In Ostind. Jul. Aug. W. H. ♄.

616. Pentapetes, Pentapetes.

1. *P. phoenicea.* Pers. l. c. 2. p. 241. Scharlachrother Pentapetes. In Ostind. Jul. Aug. W. H. ☉.

POLYANDRIA.

617. Carolinea, Carolinea.

1. *C. insignis.* Pers. l. c. Ansehnliche Carolinea. In Südamer. zu Veracrux, u. den Inseln Tabago u. Martinique. —. W. H. ♄.

618. Bombax, Wollbaum.

1. *B. pentandrum.* Pers. l. c. Fünffädiger Wollbaum. In beyden Ind. —. W. H. ♄.

2. *B. Ceiba.* Pers. l. c. 2. p. 242. Starker Wollbaum. In Amer. —. W. H. ♄.

619. Sida, Side.

1. *S. carpinifolia.* Pers. l. c. Hainbuchenblättrige Side. Zu Madera u. den Canarischen Ins. Jun. — Aug. Ch. ♄.

2. *S. rhombifolia.* Pers. l. c. 2. p. 243. Rautenförmige Side. In Ostind. u. Jamaica. Jun. Jul. W. H. ♄.

3. *S. mauritiana.* Pers. l. c. 2. p. 245. Flachsblüthige Side. Auf der St. Moritzinsel. Jul. Aug. W. H. ♄.

4. *S. Abutilon.* Pers. l. c. Gemeine Side. In beyd. Ind. der Schweiz u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. ☉.

5. *S. molissima.* Pers. l. c. Weichste Side. In Peruvianischen Wäldern. Jun. Jul. W. H. ♄.

6. *S. cordifolia.* Pers. l. c. 2. p. 246. Herzblättrige Side. In Ostind. u. am Cap. Jun. Jul. W. H. ☉.

7. *S. umbellata.* Pers. l. c. Doldenblüthige Side. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. ♄.

8. *S. vesicaria.* Pers. l. c. 2. p. 247. Aufgeblasene Side. In Mexico. Apr. — Aug. W. H. ♄.

9. *S. gigantea.* Pers. l. c. Riesenartige Side. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. ♄.

10. *S. hastata.* Pers. l. c. Spontonblättrige Side. An feuchten Stellen zu Lima u. Mexico. May — Aug. Im F. ☉.

11. *S. parviflora.* Pers. l. c. Kleinblüthige Side. In Mexico. Jun. — Aug. W. H. ☉.

12. *S. triloba.* Pers. l. c. Dreylappige Side. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.

13. *S. Napaea.* Cavan. diss. 5. p. 277. t. 132. f. 1. Virginische Side. In Virgin. Jun. Jul. Im F. 4.
Napaea laevis. Pers. l. c. 2. p. 242.

620. Malachra, Malachre.

1. *M. alceaefolia.* Pers. l. c. 2. p. 248. Stockmalvenblättrige Malachre. Zu Caracas. Aug. W. H. ⊙.

621. Althaea, Eibisch.

1. *A. officinalis.* Pers. l. c. Gemeiner Eibisch. In Ungarn, Holland, Engl. Frankr. Sibirien. Jun. — Aug. Im F. 4.

2. *A. cannabina.* Pers. l. c. 2. p. 249. Hanfblättriger Eibisch. An Waldrändern in Oesterr. Ungarn, Languedoc. u. Ital. Jun. Jul. Im F. 4.

3. *A. rosea.* Pers. l. c. Stockrosen-Eibisch. Im Orient. Jun. — Aug. Im F. 4.
Alcea rosea. Lin. sp. pl. p. 966.

4. *A. pallida.* Pers. l. c. Blafsblüthiger Eibisch. In Ungarn. Jul. Aug. Im F. ♂.
Alcea pallida. Waldst. et Kitaib. 1. p. 46. t. 47.

622. Malva, Malve.

1. *M. scabra.* Pers. l. c. 2. p. 250. Scharfästige Malve. In Peru. Jun. Jul. Ch. ♄.

2. *M. peruviana.* Pers. l. c. Peruvianische Malve. In Peru. Jun. Im F. ⊙.

3. *M. umbellata.* Pers. l. c. Doldenblüthige Malve. In Mexico. —. W. H. ♄.

4. *M. abutiloides.* Pers. l. c. Sidenartige Malve. Auf den Bahamainseln. Jun. Jul. W. H. ♄.

5. *M. lactea.* Pers. l. c. Milchweifse Malve. In Mexico. Jul. Aug. Ch. ♄.

6. *M. fragrans.* Pers. l. c. Wohlriechende Malve. Am Cap. Jul. — Oct. Ch. ♄.

7. *M. capensis.* Pers. l. c. Capische Malve. Am Cap. Jul. — Oct. Ch. ♄.

8. *M. virgata.* Pers. l. c. Ruthenförmige Malve. Am Cap. Jul. — Oct. Ch. ♄.

9. *M. miniata.* Pers. l. c. 2. p. 251. Mennigrothe Malve. In Mexico? Jun. — Aug. Ch. ♄.

10. *M. asperrima.* Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 7. t. 139. Rauhe Malve. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.

11. *M. nicaeensis.* Pers. l. c. Nicäensische Malve. In Ital. Jun. Jul. Im F. ☉.

12. *M. mauritiana.* Pers. l. c. Mauritanische Malve. In Ital. Portug. u. Span. Jun. Jul. Im F. ☉.

13. *M. crispa.* Pers. l. c. Krausblättrige Malve. In Syrien. Jun. Jul. Im F. ☉.

14. *M. Alcea.* Pers. l. c. 2. p. 252. Schlitzblättrige Malve. In Ungarn, Deutschl. Engl. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 2.

623. Lavatera, Lavatere.

1. *L. arborea.* Pers. l. c. Baumartige Lavatere. In Ital. Engl. Span. u. Nordafr. Jun. Jul. K. H. ♂.

2. *L. micans.* Pers. l. c. Schimmernde Lavatere. In Span. u. Portug. Jun. Jul. K. H. ♄.

3. *L. Olbia.* Pers. l. c. Olbische Lavatere. Auf der Insel Olbia. Jun. Jul. K. H. ♄.

4. *L. unguiculata.* Pers. l. c. Langnägelige Lavatere. —. Jul. Aug. K. H. ♄.

5. *L. hispida.* Pers. l. c. Büschelhaarige Lavatere. In Nordafr. Jun. — Aug. K. H. ♄.

6. *L. maritima.* Pers. l. c. Meerstrands-Lavatere. Am Meerstrande in Span. u. Frankr. Jun. Jul. K. H. ♄.

7. *L. thuringiaca.* Pers. l. c. Thüringische Lavatere. In Oesterr. Ungarn, Thüringen u. Schweden. Jul. Aug. Im F. 2.

8. *L. cretica.* Pers. l. c. Candische Lavatere. In Candien. Jun. Jul. Im F. ☉.

9. *L. trimestris.* Pers. l. c. 2. p. 253. Garten-Lavatere. In Syrien, Span. u. der Provence. Jun. Jul. Im F. ☉.

624. Ruizia, Ruizie.

1. *R. variabilis.* Pers. l. c. Veränderliche Ruizie. Auf der Insel Bourbon. Jun. Jul. W. H. ♄.

625. Kitaibelia, Kitaibelie.

1. *K. vitifolia.* Pers. l. c. Weinblättrige Kitaibelie. In der Syrmier Gespannschaft in Sclavonien. Apr. — Jun. Im F. 2.

626. Urena, Urene.

1. *U. lobata.* Pers. l. c. Lappige Urene. In China. Jul. Aug. Ch. ♄.

627. Gossypium, Baumwolle.

1. *G. herbaceum.* Pers. l. c. 2. p. 254. Krautartige Baumwolle. In Ostind. Syrien u. Africa. Jun. Jul. W. H. ☉.

2. *G. religiosum.* Pers. l. c. Gelbe Baumwolle. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♄.

3. *G. barbadense.* Pers. l. c. Westindische Baumwolle. In Barbados. Jun. Jul. W. H. ♄.

628. Hibiscus, Hibiscus.

1. *H. Moscheutos.* Pers. l. c. Blattstielblüthiger Hibiscus. In Canada u. Virgin. Jul. Aug. K. H. 2.

2. *H. heterophyllus.* Pers. l. c. Neuholländischer Hibiscus. In Neuholl. Apr. May. Ch. ♄.

3. *H. palustris.* Pers. l. c. Sumpf-Hibiscus. In Virgin. u. Canada. May — Jul. Im F. 2.

4. *H. populneus.* Pers. l. c. 2. p. 255. Pappelblättriger Hibiscus. In Ostind. u. den Freundschaftsinseln. Jun. Jul. W. H. ♄.

5. *H. tiliaceus.* Pers. l. c. Lindenblättriger Hibiscus. An Bächen in Ostind. —. W. H. ♄.

6. *H. abutiloides.* Willd. enum. 2. p. 736. Grofsblättriger Hibiscus. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. W. H. ♄.

7. *H. Lampus.* Pers. l. c. Philippinischer Hibiscus. Auf den Philippinischen Inseln. Jul. Aug. W. H. ♄.

8. *H. Rosa-sinensis.* Pers. l. c. Rosenartiger Hibiscus. In Ostind. May — Sept. W. H. ♄.

β. floribus plenis rubris. Mit rothgefüllten Blüthen.

γ. floribus plenis rubro flavescentibus. Mit rothgelbgefüllten Blüthen.

9. *H. phoeniceus.* Pers. l. c. Schönrother Hibiscus. In Ostind. Jul. W. H. ♄.

10. *H. mutabilis.* Pers. l. c. 2. p. 256. Veränderlicher Hibiscus. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♄.

11. *H. syriacus.* Pers. l. c. Syrischer Hibiscus. In Südeur. u. Syrien. Aug. Sept. Im F. ♄.

β. floribus albis plenis. Mit weifsgefüllten Blüthen.

12. *H. acerifolius* ? Hoocker in parad. londin. n. 33. Ahornblättriger Hibiscus. Das Vaterland ist unbekannt, cultivirt findet man ihn in China. Jun. Jul. W. H. ♄.

13. *H. Sabdariffa.* Pers. l. c. Dreytheiliger Hibiscus. In beyden Indien. Jul. Aug. W. H. ☉.

14. *H. diversifolius.* Pers. l. c. Verschiedenblättriger Hibiscus. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♄. H. ficulneus. Cavan. diss. 3. p. 148. t. 51. f. 2.

15. *H. speciosus.* Pers. l. c. Ansehnlicher Hibiscus. In Südcarolina. Jun. Jul. W. H. ♃.

16. *H. cannabinus.* Pers. l. c. Hanfartiger Hibiscus. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☉.

17. *H. Manihot.* Pers. l. c. 2. p. 257. Schwefelfarbiger Hibiscus. In beyden Ind. Jul. Aug. W. H. ♄.

18. *H. Abelmoschus.* Pers. l. c. Bisam-Hibiscus. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. W. H. ♄.

19. *H. esculentus.* Pers. l. c. Eſsbarer Hibiscus. In beyden Indien. Jun. Jul. W. H. ☉.

20. *H. vesicarius.* Pers. l. c. 2. p. 258. Aufgeblasener Hibiscus. In Africa. Jun. Jul. Im F. ☉.

21. *H. Trionum.* Pers. l. c. Stunden-Hibiscus. In Krain, Ital. u. Africa. Jun. Jul. Im F. ☉.

629. Pavonia, Pavonie.

1. *P. praemorsa.* Willd. sp. pl. 3. p. 833. Abgebissene Pavonie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄. P. cuneifolia. Pers. l. c.

2. *P. spinifex.* Pers. l. c. Vielstachlige Pavonie. In Südamer. May, Jun. W. H. ♄.

3. *P. Columella.* Pers. l. c. 2. p. 259. Fünfeckige Pavonie. Auf der Insel Bourbon. Jul. Aug. W. H. ♄.

630. Achania, Tuttenmalve.

1. *A. Malvaviscus.* Pers. l. c. Baumartige Tuttenmalve. Auf Kalkfelsen in Jamaica u. Mexico. Jun. Jul. W. H. ♄.

2. *A. mollis.* Pers. l. c. Weiche Tuttenmalve. In Amer. Jul. — Sept. W. H. ♄.

631. Lagunea, Lagunea.

1. *L. Patersonia.* Pers. l. c. Patersonische Lagunea. Auf der Insel Nordfolk. Jul. Aug. Ch. ♄. Hibiscus Patersonius. Andrews bot. repos. t. 286.

632. Camellia, Camellie.

1. *C. japonica.* Pers. l. c. 2. p. 260. Japanische Camellie. In Japan u. China. Jun. Jul. Ch. ♄.

β. floribus rubris plenis. Mit rothgefüllten Blüthen.

γ. floribus albis — Mit weifsgefüllten Blüthen

δ. floribus variegatis. Mit bunten Blüthen.

633. Inga, Inge.

1. *I. dulcis.* Willd. sp. pl. 4. p. 1005. Süsse Inge. Auf den Philippinischen Inseln u. zu Coromandel. —. W. H. ♄.
Mimosa dulcis. Pers. l. c. 2. p. 262.

2. *I. Unguis-cati.* Willd. l. c. 4. p. 1006. Katzenklauen-Inge. In Jamaica u. den Caraibischen Inseln. Jun. Jul. W. H. ♄.
M. Unguis Cati. Pers. l. c.

3. *I. foetida.* Willd. l. c. 4. p. 1008. Stinkende Inge. In Westind. Jun. Jul. W. H. ♄.
M. foetida. Pers. l. c.

4. *I. alba.* Willd. l. c. 4. p. 1013. Weifse Inge. Zu Cajenne. Jun. — Sept. W. H. ♄.
M. alba. Pers. l. c. 2. p. 261.

5. *I. latifolia.* Willd. l. c. 4. p. 1020. Breitblättrige Inge. In Westind. —. W. H. ♄.
M. latifolia. Pers. l. c. 2. p. 262.

6. *I. Saman.* Willd. l. c. 4. p. 1024. Saman-Inge. Zu Caracas. —. W. H. ♄.
M. Saman Jacq. fragm. bot. p. 5. t. 6.

634. Mimosa, Sinnpflanze.

1. *M. sensitiva.* Pers. l. c. 2. p. 262. Empfindliche Sinnpflanze. In Brasilien. Jul. — Sept. W. H. ♄.

2. *M. pudica.* Pers. l. c. Gemeine Sinnpflanze. In Brasilien. Jul. Aug. W. H. ☉.

635. Desmanthus, Büschelzopf.

1. *D. plenus.* Willd. sp. pl. 4. p. 1045. Gefüllter Büschelzopf. Auf Veracrux. Jul. Aug. W. H. ☉.
Mimosa plena. Pers. l. c. 2. p. 263.

2. *D. virgatus.* Willd. l. c. 4. p. 1047. Ruthenförmiger Büschelzopf. In Ostind. Jun. — Aug. W. H. ♄.
M. virgata. Pers. l. c.

636. Acacia, Acacie.

1. *A. verticillata.* Willd. sp. pl. 4. p. 1049. Wirtelblättrige Acacie. In Neuholl. Jän. — März. Ch. ♄.
Mimosa verticillata. Pers. l. c. 2. p. 261.

2. *A. juniperina.* Willd. l. c. Wachholderblättrige Acacie. In Neuholl. Jän. — März. Ch. ♄.
M. juniperina. Pers. l. c.

3. *A. suaveolens.* Willd. l. c. 4. p. 1050. Wohlriechende Acacie. In Neuholl. —. Ch. ♄.
M. suaveolens. Smith act. societ. lin. lond. 1. p. 253.

4. *A. floribunda.* Willd. l. c. 4. p. 1051. Vielblumige Acacie. In Neuholl. März, Apr. Ch. ♄.
M. floribunda. Pers. l. c.

5. *A. dodonaeifolia.* Decand. cat. hort. bot. monspel. p. 1. Klebrige Acacie. In Neuholl. —. Ch. ♄.
M. Dodonaeifol. Pers. l. c.

6. *A. stricta.* Willd. l. c. 4. p. 1052. Steife Acacie. In Neuholl. —. Ch. ♄.
M. stricta. Pers. l. c.

7. *A. longifolia.* Willd. l. c. Langblättrige Acacie. In Neuholl. März — May. Ch. ♄.
M. longif. Pers. l. c.

8. *A. falcata.* Willd. l. c. 4. p. 1053. Sichelblättrige Acacie. In Neuholl. —. Ch. ♄.
M. obliqua? Pers. l. c.

9. *A. paradoxa.* Decand. cat. hort. bot. monsp. p. 1. Wunderbare Acacie. In Neuholl.—. Ch. ♄.
Mimosa parad. Hortulan.

10. *A. heterophylla.* Willd. l. c. 4. p. 1054. Verschiedenblättrige Acacie. Auf der St. Moritzinsel. —. Ch. ♄.
M. heteroph. Pers. l. c.

11. *A. diptera.* Humboldt et Bonpland. Willd. enum. 2. p. 1051. Zweygetheilte Acacie. In Südamer. —. W. H. ♄

12. *A. Julibrissin.* Willd. sp. pl. 4. p. 1065. Orientalische Acacie. Im Orient. —. W. H. ♄.
M. Julibrissin. Pers. l. c. 2. p. 264.
M. arborea. Hortulan.

13. *A. speciosa.* Willd. l. c. 4. p. 1066. Ansehnliche Acacie. In Ostind. Jul. Aug. W. H. ♄.
M. speciosa. Pers. l. c.

14. *A. caracasana.* Willd. l. c. 4. p. 1068. Caracasanische Acacie. Zu Caracas. Jul. Aug. W. H. ♄.
M. caracas. Pers. l. c.

15. *A. portoricensis.* Willd. l. c. 4. p. 1069. Portorico'sche Acacie. Auf der Insel Portorico. —. W. H. ♄.
M. portoric. Pers. l. c.

16. *A. divaricata.* Willd. l. c. 4. p. 1070. Ausgebreitete Acacie. In Westind. —. W. H. ♄.
M. divaric. Pers. l. c.

17. *A. lophantha.* Willd. l. c. Büschelblüthige Acacie. In Neuholl. März. Apr. Ch. ♄.
M. lophantha. Pers. l. c.

18. *A. filicina.* Willd. l. c. 4. p. 1072. Farrenkrautartige Acacie. In Mexico. —. W. H. ♄.
A. filicoides. Pers. l. c. 2. p. 264.

19. *A. grandiflora.* Willd. l. c. 4. p. 1074. Grofsblumige Acacie. In Ostindien. —. W. H. ♄.
M. grandiflora. Pers. l. c. 2. p. 263.

20. *A. glauca.* Willd. l. c. 4. p. 1075. Eisengraue Acacie. Im wärmer. Amer. Jun. — Sept. W. H. ♄.
M. glauca. Pers. l. c. 2. p. 265.

21. *A. cornigera.* Willd. l. c. 4. p. 1080. Hörnertragende Acacie. In Mexico u. Cuba. —. W. H. ♄.
M. cornig. Pers. l. c.

22. *A. eburnea.* Willd. l. c. 4. p. 1081. Elfenbeinerne Acacie. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♄.
M. eburnea. Pers. l. c.

23. *A. horrida.* Willd. l. c. 4. p. 1082. Starkdornige Acacie. In Africa. Jun. — Aug. W. H. ♄.
M. horrida. Pers. l. c.
M. leucacantha. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 75. t. 393.

24. *A. tortuosa.* Willd. l. c. 4. p. 1083. Gedrehte Acacie. Auf Sandfeldern in Jamaica. Jun. — Sept. W. H. ♄.
M. tortuosa. Pers. l. c.

25. *A. farnesiana.* Willd. l. c. Farnesische Acacie. In St. Domingo. Jun. — Sept. W. H. ♄.
M. farnesiana. Pers. l. c.

26. *A. vera.* Willd. l. c. 4. p. 1085. Aechte Acacie. In Aegypten. —. W. H. ♄.
M. nilotica. Pers. l. c.

27. *A. acanthocarpa.* Willd. enum. 2. p. 1057. Stachelfrüchtige Acacie. —. —. W. H. ♄.
M. aculeaticarpa. Pers. l. c. 2. p. 266.

28. *A. pennata.* Willd. sp. pl. 4. p. 1090. Federförmige Acacie. Auf Ceylon. —. W. H. ♄.
M. pennata. Pers. l. c.

29. *A. tamarindifolia.* Willd. l. c. 4. p. 1092. Tamarindenblättrige Acacie. Zu Martinique u. Caracas. Jul. Aug. W. H. ♄.
M. tamarindifolia. Pers. l. c. 2. p. 267.

30. *A*? *quadrangularis.* Cujus? Aus dem jardin des plantes von Paris.

31. *A*? *undulata.* Cujus? Aus dem jardin des plantes von Paris.

32. *A*? Aus dem Fürstlich Esterhazyschen Garten von Eisenstadt.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

637. Corydalis, Helmblume.

1. *C. nobilis.* Pers. l. c. 2. p. 269. Schöne Helmblume. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. 4.
Fumaria nobilis. Lin. syst. veg. p. 529.

2. *C. bulbosa.* Pers. l. c. Knollige Helmblume. In Eur. Sibirien u. Kamtschatka. May — Jul. Im F. 4.
Fumaria bulbosa. Lin. mat. med. 168.

3. *C. Capnoides.* Pers. l. c. 2. p. 270. Weifse Helmblume. In der Schweiz, Frankr. Ital. u. Krain. May, Jun. Im F. 4.
Fumaria Capnoides. Lin. sp. pl. p. 984.

OCTANDRIA.

638. Polygala, Polygale.

1. *P. myrtifolia.* Pers. l. c. 2. p. 273. Myrtenblättrige Polygale. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.

2. *P. spinosa.* Pers. l. c. Stachlige Polygale. Am Cap. Jun. Ch. ♄.

3. *P. Chamaebuxus.* Pers. l. c. Oesterreichische Polygale. Auf Bergen in Oesterr. Deutschl. u. der Schweiz. Apr. May. Im F. ♄.

DECANDRIA.

639. Nissolia, Nissolie.

1. *N. fruticosa.* Pers. l. c. 2. p. 276. Strauchartige Nissolie. In Wäldern zu Carthagena in Amer. Jul. W. H. ♄.

640. Erythrina, Corallenbaum.

1. *E. herbacea.* Pers. l. c. 2. p. 279. Krautartiger Corallenbaum. In Carolina u. Florida. Jun. Ch. 4.

2. *E. Corallodendrum.* Pers. l. c. Gemeiner Corallenbaum. Auf den Antillen. Jun. Jul. W. H. ♄.

3. *E. velutina.* Pers. l. c. Sammtartiger Corallenbaum. Zu Terrafirma. —. W. H. ♄.

4. *E. mitis.* Pers. l. c. Wehrloser Corallenbaum. Zu Caracas. May. W. H. ♄.

5. Eine noch unbeschriebene Art aus dem jardin des plantes von Paris.

641. Rafnia, Rafnie.

1. *R. retusa.* Pers. l. c. 2. p. 280. Zurückgebogene Rafnie. In Neuholl. —. Ch. ♄.

642. Crotalaria, Klapperschote.

1. *Cr. verrucosa.* Pers. l. c. 2. p. 284. Vierkantige Klapperschote. Zu Malabar, Zeylon, Java u. den Philippinischen Inseln. Jun. Jul. W. H. ☉.

2. *Cr. incanescens.* Ait. hort. kew. 3. p. 20. Grauästige Klapperschote. Am Cap, auf der St. Moritz- u. Bourboninsel. Jun. — Oct. Ch. ♄. C. arborescens. Pers. l. c. 2. p. 285.

3. *Cr. purpurascens.* Pers. l. c. Purpurrothe Klapperschote. Auf den Inseln Madagascar u. St. Moritz. Jun. — Aug. W. H. ♄.

643. Spartium, Pfriemen.

1. *Sp. junceum.* Pers. l. c. 2. p. 286. Binsenartige Pfriemen. In Südeur. May, Jun. Im F. ♄.

2. *Sp. sphaerocarpon.* Pers. l. c. Rundfrüchtige Pfriemen. In Südeur. Jun. Jul. K. H. ♄.

3. *Sp. cinereum.* Pers. l. c. Graue Pfriemen. Zu Dauphine. May — Jul. Im F. ♄.

4. *Sp. Scorpius.* Pers. l. c. Dornige Pfriemen. In Spanien u. Languedoc. May — Jul. K. H. ♄.

5. *Sp. linifolium.* Pers. l. c. 2. p. 287. Flachsblättrige Pfriemen. In Südfrankr. Spanien, der Barbarey u. dem Orient. May — Jul. K. H. ♄. Genista linifolia. Lin. sp. pl. p. 405.

6. *Sp. scoparium.* Pers. l. c. Gemeine Pfriemen. In Deutschl. der Schweiz u. in Frankr. Jun. Jul. Im F. ♄.

7. *Sp. radiatum.* Pers. l. c. Gestrahlte Pfriemen. In Krain, Ital. u. Carolina. Jun. Jul. Im F. ♄.

8. *Sp. ferox.* Pers. l. c. Wilde Pfriemen. In der Barbarey. März, Apr. K. H. ♄.

9. *Sp. spinosum.* Pers. l. c. Starkdornige Pfriemen. In Span. Ital. u. der Barbarey. Jun. Jul. K. H. ♄.

644. Genista, Ginster.

1. *G. candicans.* Pers. l. c. Weifslicher Ginster. In Ital. u. Montpellier. Jul. Aug. K. H. ♄.

2. *G. sagittalis.* Pers. l. c. Geflügelter Ginster. In dürren Waldgegenden v. Oesterr. Deutschl. u. Frankreich. Jun. Im F. ♄.

3. *G. tinctoria.* Pers. l. c. Färbender Ginster. In Deutschl. u. England. Jun. Jul. Im F. ♄.

4. *G. sibirica.* Pers. l. c. 2. p. 288. Sibirischer Ginster. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. ♄.

5. *G. florida.* Pers. l. c. Vielblühender Ginster. In Spanien. Jun. — Aug. K. H. ♄.

6. *G. pilosa.* Pers. l. c. Haariger Ginster. In Deutschl. u. Languedoc auf sonnigen Bergen. May. Jun. Im F. ♄.

7. *G. anglica.* Pers. l. c. Englischer Ginster. In Wäldern v. Deutschl. u. England. Jun. Jul. Im F. ♄.

8. *G. germanica.* Pers. l. c. Deutscher Ginster. In Wäldern v. Deutschl. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. ♄.

645. Ulex, Hecksame.

1. *U. europaeus.* Pers. l. c. 2. p. 289. Europäischer Hecksame. In Deutschl. England, Frankr. Dännemark u. Brabant. May, Jun. K. H. ♄.

646. Ononis, Hauhechel.

1. *O. fruticosa.* Pers. l. c. 2. p. 292. Strauchartige Hauhechel. In der Dauphine. Jun. Jul. K. H. ♄.

647. Anthyllis, Wollblume.

1. *A. tetraphylla.* Pers. l. c. Vierblättrige Wollblume. In Ital. u. Sicilien. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *A. Vulneraria.* Pers. l. c. Gemeine Wollblume. Auf Wiesen im Mitteleur. May, Jun. Im F. ♃.

3. *A. montana.* Pers. l. c. Berg-Wollblume. In Oesterr. Krain, der Schweiz, Languedoc u. der Provence. Jun. Jul. Im F. ♃.

4. *A. Barba Jovis.* Pers. l. c. 2. p. 293. Silberblättrige Wollblume. In Italien, Span. u. im Orient. Jun. — Aug. K. H. ♄.

5. *A. Hermanniae.* Pers. l. c. Flachsblättrige Wollblume. In Griechenland, Candien u. Palästina Jun. Jul. K. H. ♄.

648. Lupinus, Feigbohne.

1. *L. varius.* Pers. l. c. 2. p. 294. Bunte Feigbohne. Zu Montpellier. Jun. — Aug. Im F. ☉.

2. *L. hirsutus.* Pers. l. c. Rauhe Feigbohne. In der Barbarey, den Archipelagischen Inseln u. Spanien. Jun. Jul. Im F. ☉.

3. *L. luteus.* Pers. l. c. Gelbe Feigbohne. In Sicilien. May — Jul. Im F. ☉.

4. *L. arboreus.* Pers. l. c. Baumartige Feigbohne. Jun. Jul. Ch. ♄.

649. Amorpha, Unform.

1. *A. fruticosa.* Pers. l. c. Strauchartige Unform. In Carolina. Jul. Im F. ♄.

2. *A. pubescens.* Pers. l. c. Haarige Unform. In Carolina. Jul. Im F. 24.

650. Abrus, Paternostererbse.

1. *A. precatorius.* Pers. l. c. 2. p. 295. Gemeine Paternostererbse. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♄.

651. Dolichos, Faseln.

1. *D. Lablab.* Pers. l. c. 2. p. 296. Aegyptische Faseln. In Aegypten u. Ostind. Jul. Aug. Im F. ☉.

2. *D. sinensis.* Pers. l. c. Chinesische Faseln. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☉.

3. *D. lignosus.* Pers. l. c. 2. p. 298. Holzige Faseln. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♄.

652. Glycine, Glycine.

1. *Gl. clandestina.* Pers. l. c. 2. p. 299. Heimlichblühende Glycine. In Neuholl. Jul. Aug. Ch. ♄.

2. *Gl. precatoria.* Willd. enum. 2. p. 755. Paternosterartige Glycine. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. ♄.
Gl. tomentosa. Hortulan.

3. *Gl. caribaea.* Pers. l. c. 2. p. 301. Caraibische Glycine. Auf den Caraibischen Inseln. Jun. Jul. W. H. ♄.

4. *Gl. rubicunda.* Curt. bot. mag. 268. Dunkelrothe Glycine. In Neuholl. Jul. Aug. Ch. ♄. Kennedia rubicunda. Pers. l. c. 2. p. 302.

5. *Gl. coccinea.* Curt. bot. mag. 270. Scharlachrothe Glycine. In Neuholl. Jun. — Aug. Ch. ♄. Kennedia coccinea. Pers. l. c.

6. *Gl. Apios.* Pers. l. c. 2. p. 301. Knollige Glycine. In Virgin. Aug. Im F. 24.

7. *Gl. frutescens.* Pers. l. c. Strauchartige Glycine. In Carolina. Aug. Im F. ♄.

8. *Gl. bimaculata.* Curt. bot. mag. 263. Zweyfleckige Glycine. In Neuholl. Jun. — Aug. Ch. ♄. Kennedia monophylla. Pers. l. c. 2. p. 302.

653. Orobus, Walderbse.

1. *O. lathyroides.* Pers. l. c. 2. p. 303. Sibirische Walderbse. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *O. vernus.* Pers. l. c. Frühlings-Walderbse. In Hainen des nördlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *O. albus.* Pers. l. c. Weifse Walderbse. In Oesterr. Ungarn u. Sibirien. Jun. — Aug. Im F. 24.

654. Lathyrus, Platterbse.

1. *L. odoratus.* Pers. l. c. 2. p. 304. Wohlriechende Platterbse. In Sicilien u. Ceylon. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *L. tingitanus.* Pers. l. c. Africanische Platterbse. Auf der St. Moritzinsel. Jun. Jul. Im F. ☉.

3. *L. tuberosus.* Pers. l. c. 2. p. 305. Knollige Platterbse. In Deutschl. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 24.

4. *L. latifolius.* Pers. l. c. Breitblättrige Platterbse. In Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

5. *L. heterophyllus.* Pers. l. c. Verschiedenblättrige Platterbse. Am Fufse der Berge in Eur. Jun. — Aug. Im F. 4.

655. Cytisus, Bohnenbaum.

1. *C. Laburnum.* Pers. l. c. 2. p. 309. Gemeiner Bohnenbaum. In der Schweiz, Savoyen u. Frankr. May, Jun. Im F. ♄.

2. *C. alpinus.* Willd. enum. 2. p. 767. Alpen-Bohnenbaum. In Schottland, Savoyen u. Ungarn. Jun. Jul. Im F. ♄.
Cytis. Laburnum β latifolium. Pers. l. c.

3. *C. nigricans.* Pers. l. c. Schwärzlicher Bohnenbaum. In Oesterr. Ungarn, Böhmen u. Deutschl. Jun. Jul. Im F. ♄.

4. *C. sessilifolius.* Pers. l. c. 2. p. 310. Italienischer Bohnenbaum. In Italien u. der Provence. Jun. Jul. Im F. ♄.

5. *C. wolgaricus.* Pers. l. c. Wolgarischer Bohnenbaum. Auf trockenen Hügeln an der Wolga. Jun. Jul. Im F. ♄.

6. *C. Cajan.* Pers. l. c. Indischer Bohnenbaum. In Ostind. Jun. — Aug. W. H. ♄.

7. *C. capitatus.* Pers. l. c. Kopfförmiger Bohnenbaum. In Oesterr. Sicil. u. der Provence. Jun. Jul. Im F. ♄.

8. *C. austriacus.* Pers. l. c. Oesterreichischer Bohnenbaum. In Oesterr. Ital. u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. ♄.

9. *C. purpureus.* Pers. l. c. Purpurrother Bohnenbaum. In Krain, Kroatien u. Friaul auf sonnigen Höhen. Jun. Jul. Im F. ♄.

10. *C. elongatus.* Waldst. et Kitaib. pl. rar. hung. 2. p. 200. t. 183. Banatischer Bohnenbaum. In Wäldern der Beregher Gespannschaft u. im Banat. Apr. May. Im F. ♄.

11. *C. supinus.* Pers. l. c. Niedriger Bohnenbaum. Auf sonnigen Hügeln in Oesterr. Ungarn u. Sibirien. Jul. Im F. ♄.

12. *C. biflorus.* Pers. l. c. Zweyblumiger Bohnenbaum. In Ungarn. Apr. May. Im F. ♄.

656. Robinia, Robinie.

1. *R. Pseudacacia.* Pers. l. c. 2. p. 311. Gemeine Robinie. (Acacie). In Nordamer. May, Jun. Im F. ♄.

β. inermis. Mit stachellosen Aesten.

2. *R. umbraculifera.* Dumont Cours. le bot. cultiv. 6. p. 140. Schattenbringende Robinie. —. — . Im F. ♄.

3. *R. viscosa.* Pers. l. c. Klebrige Robinie. Auf den höchsten Bergen in Südcarolina. Jun. Im F. ♄.

4. *R. hispida.* Pers. l. c. Borstige Robinie. In Carolina, Florida, Virgin. u. Pensylvan. Jun. Jul. Im F. ♄.

5. *R. Caragana.* Pers. l. c. 2. p. 312. Sibirische Robinie. In Sibirien. May, Jun. Im F. ♄.

6. *R. Altagana.* Pers. l. c. Sand-Robinie. Auf sandigem Boden in Davurien. —. Im F. ♄.

7. *R. jubata.* Pers. l. c. Mähnenartige Robinie. In Sibirien am See Baical. —. Im F. ♄.

8. *R. spinosa.* Pers. l. c. Dornige Robinie. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. ♄.

9. *R. Halodendron.* Pers. l. c. Graue Robinie. In Sibirien. May. Im F. ♄.

10. *R. Chamlagu.* Pers. l. c. Glänzende Robinie. In China. —. Ch. ♄.

11. *R. frutescens.* Pers. l. c. Strauchartige Robinie. In Sibirien u. der Tartarey. May, Jun. Im F. ♄.

12. *R. pygmaea.* Pers. l. c. Niedrige Robinie. In Sibirien. May, Jun. Im F. ♄.

13. *R. sophorifolia.* Cujus? Stammt aus Französischen Baumschulen.

657. Colutea, Blasenstrauch.

1. *C. arborescens.* Pers. l. c. Baumartiger Blasenstrauch. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ♄.

2. *C. cruenta.* Ait. hort. kew. 3. p. 55. Rother Blasenstrauch. In Süddeutschl. Ital. Taurien u. im Orient. Jun. Im F. ♄.
C. orientalis. Pers. l. c.

3. *C. Pocockii.* Pers. l. c. Aleppischer Blasenstrauch. Im Orient. Jun. Jul. Im F. ♄.
C. halepica. Lam. encycl. 1. p. 349.

4. *C. frutescens.* Pers. l. c. Grauer Blasenstrauch. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

5. *C. herbacea.* Pers. l. c. 2. p. 313. Krautartiger Blasenstrauch. Am Cap. Jun. — Aug. Im F. ☉.

658. Glycyrrhiza, Süfsholz.

1. *Gl. echinata.* Pers. l. c. Stachliges Süfsholz. In Ungarn an der Theifs, Apulien auf dem Berge Gargano u. der Tartarey. Jul. Im F. 2.

2. *Gl. foetida.* Pers. l. c. Stinkendes Süfsholz. Auf dem Berge Atlas u. den Heiden bey Mayenne. in Frankr. Jul. Im F. 4.

3. *Gl. glabra.* Lin. sp. pl. p. 1046. Gemeines Süfsholz. In Frankr. Ital. u. Spanien. Jul. Im F. 4. Liquiritia officinalis. Pers. l. c.

659. Coronilla, Peltschen.

1. *C. aculeata.* Willd. sp. pl. 3. p. 1147. Stachlige Peltschen. Auf Ceylon u. Malabar. Jun. W. H. ☉.
Sesbania aculeata. Pers. l. c. 2. p. 316.
Aeschinomene bispinosa. Jacq. ic. rar. 3. t. 564.

2. *C. Emerus.* Pers. l. c. 2. p. 315. Scorpions-Peltschen. In Oesterr. Krain, Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. ♄.

3. *C. valentina.* Pers. l. c. 2. p. 316. Valentinische Peltschen. In Spanien u. Italien. Jun. — Aug. K. H. ♄.

4. *C. cretica.* Pers. l. c. Candische Peltschen. In Candien. Jun. Jul. Im F. ☉.

5. *C. securidaca.* Pers. l. c. Beilkrautartige Peltschen. In Dalmat. Ital. u. Spanien. Jun. Jul. Im F. ☉.

660. Hippocrepis, Pferdehufschote.

1. *H. balearica.* Pers. l. c. 2. p. 315. Strauchartige Pferdehufschote. Zu Minorca. Jul. Aug. K. H. ♄.

661. Aeschynomene, Schampflanze.

1. *A. aristata.* Pers. l. c. 2. p. 316. Gegrannte Schampflanze. Auf den Inseln St. Domingo u. St. Crux. Jän. — März u. Aug. Sept. W. H. ♄.

662. Hedysarum, Hahnenkopf.

1. *H. triquetrum* ? Pers. l. c. 2. p. 319. Dreykantiger Hahnenkopf. In Ostind. — W. H. ♄.

2. *H. Vespertilionis.* Pers. l. c. Zweylappiger Hahnenkopf. In Cochinchina. Jun. Jul. W. H. ☉.

3. *H. gyrans.* Pers. l. c. 2. p. 321. Beweglicher Hahnenkopf. In Bengalen am Ganges. Jul. W. H. ♄.

4. *H. frutescens.* Lin. sp. pl. p. 1055. Strauchartiger Hahnenkopf. In Virgin. u. Carolina. — K. H. ♄.
Leopedeza fruticosa. Pers. l. c. 2. p. 318.

5. *H. uncinatum.* Pers. l. c. 2. p. 323. Hackenförmiger Hahnenkopf. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. ♄.

6. *H. coronarium.* Pers. l. c. Italienischer Hahnenkopf. Auf Wiesen in Italien. Jun. Jul. Im F. 4.

7. *H. Onobrychis.* Pers. l. c. 2. p. 324. Futter-Hahnenkopf. (Esparsette). Auf Hügeln in Deutschl. Böhmen, England u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 4.

663. Indigofera, Indigo.

1. *I. psoraloides.* Pers. l. c. 2. p. 326. Psoralienartiger Indigo. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.

2. *I. cytisoides.* Pers. l. c. 2. p. 327. Bohnenbaumartiger Indigo. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

3. *I. Anil.* Pers. l. c. 2. p. 328. Sichelfrüchtiger Indigo. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♄.

4. *I. tinctoria.* Pers. l. c. Färber-Indigo. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♄.

664. Galega, Geisraute.

1. *G. officinalis.* Pers. l. c. 2. p. 330. Gemeine Geisraute. In Deutschl. der Schweiz, Italien, Spanien u. Nordafrica. Jun. — Aug. Im F. ♄.

2. *G. orientalis.* Pers. l. c. Orientalische Geisraute. Im Orient. Jun. Jul. Im F. 4.

3. *G. caribaea.* Pers. l. c. Westindische Geisraute. Auf den Caraibischen Inseln. Jul. Aug. W. H. ♄.

665. Astragalus, Traganth.

1. *A. Onobrychis.* Pers. l. c. 2. p. 336. Langfahniger Traganth. In Oesterreich, Deutschl. der Schweiz u. Sibirien. Jun. — Sept. Im F. 4.

2. *A. glycyphyllos.* Pers. l. c. 2. p. 338. Süfsblättriger Traganth. In Hainen v. Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

3. *A. Cicer.* Pers. l. c. Kichernartiger Traganth. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz, Italien u. Rufsland. Jun. Jul. Im F. 4.

4. *A. galegiformis.* Pers. l. c. Geisrautenartiger Traganth. In Sibirien u. im Orient. Jun. Im F. 4.

5. *A. virescens.* Ait. hort. kew. 3. p. 73. Grünlicher Traganth. In Sibirien, Armen. u. Nordafr. May, Jun. Im F. 4.
A. falcatus β virescens. Pers. l. c. 2. p. 339.

6. *A. alopecuroides.* Pers. l. c. 2. p. 340. Fuchsschwanzartiger Traganth. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. 2.

7. *A. Tragacantha.* Pers. l. c. 2. p. 341. Gemeiner Traganth. In Istrien, Dalmatien, Arragonien, Südfrankr. Sicilien u. der Barbarey. Aug. — Oct. K. H. 2.

666. Psoralea, Psoralea.

1. *Ps. pinnata.* Pers. l. c. 2. p. 346. Gefiederte Psoralea. An Bächen am Cap. Jul. Aug. Ch. ♄.

2. *Ps. odoratissima.* Pers. l. c. Wohlriechende Psoralea. Am Cap. May, Jun. Ch. ♄.

3. *Ps. verrucosa.* Pers. l. c. Warzige Psoralea. Am Cap. Jun. — Oct. Ch. ♄.
Ps. angustifolia. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 53. t. 226.

4. *Ps. bracteata.* Pers. l. c. Punktirte Psoralea. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

5. *Ps. aphylla.* Pers. l. c. Blattlose Psoralea. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

6. *Ps. hirta.* Pers. l. c. Rauhe Psoralea. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

7. *Ps. bituminosa.* Pers. l. c. 2. p. 347. Harzige Psoralea. Auf Hügeln am Meere in Ital. Sicilien u. Languedoc. Jun. Jul. K. H. ♄.

8. *Ps. glandulosa.* Pers. l. c. Drüsige Psoralea. In Peru. Jun. — Aug. Ch. ♄.

9. *Ps. palaestina.* Pers. l. c. Palästinische Psoralea. In Palästina. Jul. Aug. Ch. ♄.

10. *Ps. americana.* Pers. l. c. Maderische Psoralea. Auf Madera. Jun. Jul. Ch. ♄.

667. Lotus, Schotenklee.

1. *L. tetragonolobus.* Pers. l. c. 2. p. 355. Spargel-Schotenklee. Auf Hügeln in Sicilien. Jun. — Aug. Im F. ☉.

2. *L. edulis.* Pers. l. c. Geniefsbarer Schotenklee. In Ital. Sicilien, Span. u. Candien. Jun. — Aug. Im F. ☉.

3. *L. jacobaeus.* Pers. l. c. Schwarzer Schotenklee. Auf der St. Jacobsinsel. Jul. Aug. Ch. 4.

4. *L. hirsutus.* Pers. l. c. 2. p. 354. Zottiger Schotenklee. In Ital. Languedoc. u. im Orient. Jun. Jul. K. H. ♄.

668. Medicago, Schneckenklee.

1. *M. arborea.* Pers. l. c. 2. p. 356. Baumartiger Schneckenklee. Zu Rhodos u. Neapel. Jun. — Sept. K. H. ♄.

CLASSIS XVIII.

SYNGENESIA.

AEQUALIS.

669. Arnopogon, Schafsbart.

1. *A. Dalechampii.* Pers. l. c. 2. p. 360. Dalechampischer Schafsbart. In Dalmatien, Italien. u. Span. May, Jun. K. H. 4.

670. Sonchus, Gänsedistel.

1. *S. fruticosus.* Pers. l. c. 2. p. 363. Strauchartige Gänsedistel. Auf hohen Felsen zu Madera. Jun. Jul. K. H. ♄.

2. *S. hispanicus.* Pers. l. c. Spanische Gänsedistel. In Spanien bey Malaga. Jun. Jul. Im F. ☉.

3. *S. tingitanus.* Lam. encycl. 3. p. 383. Tunetanische Gänsedistel. Auf Felsen am Meere in der Barbarey. Jun. Jul. Im F. ☉.
Picridium tingitanum. Pers. l. c. 2. p. 362.

4. *S. macrophyllus.* Willd. sp. pl. 3. p. 1510. Grofsblättrige Gänsedistel. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 24.
S. canadensis. Pers. l. c. 2. p. 363.

5. *S. alpinus.* Pers. l. c. Alpen-Gänsedistel. Auf Alpen in Oesterr. Deutschl. der Schweiz, Krain, Italien, Frankr. England, Schweden, Norwegen u. Canada. Jul. Aug. Im F. 24.

671. Prenanthes, Hasenlattich.

1. *Pr. purpurea.* Pers. l. c. 2. p. 365. Purpurrother Hasenlattich. Auf Berghainen in Deutschl. der Schweiz u. Italien. Jun. Jul. Im F. 24.

672. Hieracium, Habichtskraut.

1. *H. alpinum.* Pers. l. c. 2. p. 370. Alpen-Habichtskraut. Auf Alpen in Oesterr. Lappland, England, der Schweiz u. auf dem Berge Brocken. Jun. — Aug. Im F. 24.

2. *H. aurantiacum.* Pers. l. c. 2. p. 371. Pomeranzenfarbiges Habichtskraut. In Oesterr. Steyerm. Schlesien, der Schweiz, Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 4.

3. *H. fruticosum.* Pers. l. c. 2. p. 375. Strauchartiges Habichtskraut. Zu Madera? Jun. Jul. Ch. ♄.

673. Crepis, Pippau.

1. *Cr. rubra.* Pers. l. c. Rother Pippau. In Dalmatien u. Apulien. Jul. Im F. ☉.

674. Andryala, Wolldistel.

1. *A. lanata.* Lin. sp. pl. p. 1137. Weifshaarige Wolldistel. In Südeur. Jun. Jul. K. H. 4. Hieracium verbascifolium. Pers. l. c. 2. p. 374.

675. Catananche, Zwangkraut.

1. *C. coerulea.* Pers. l. c. 2. p. 379. Blaues Zwangkraut. Zu Languedoc u. Nordafrica. Jun. Jul. Im F. ☉.

676. Scolymus, Golddistel.

1. *Sc. maculatus.* Pers. l. c. 2. p. 380. Gefleckte Golddistel. In Ital. zu Languedoc u. in Nordafrica. Jun. Jul. Im F. ☉.

677. Carthamus, Saflor.

1. *C. tinctorius.* Pers. l. c. Gemeiner Saflor. In Aegypten u. Ostind. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *C. lanatus.* Pers. l. c. Wolliger Saflor. In Oesterr. Ungarn, Krain, der Schweiz, Ital. Frankr. u. Candien auf Heiden. Jun. Jul. Im F. ☉.

678. Carlovizia, Carlovizie.

1. *C. salicifolia.* Moench. method. pl. suppl. p. 225. Weidenblättrige Carlowizie. Zu Madera. Jul. Aug. Ch. ♄.
Cartham ? salicifol. Pers. l. c. 2. p. 381.

679. Carduus, Distel.

1. *C. marianus.* Pers. l. c. 2. p. 386. Marien-Distel. In Eur. Jul. Aug. Im F. ☉.

2. *C. mollis.* Pers. l. c. Weiche Distel. Auf Bergen in Oesterr. u. bey Montpellier. May, Jun. Im F. 2.

680. Cnicus, Kratzkraut.

1. *Cn. rivularis.* Willd. sp.pl.3.p. 1676. Bach-Kratzkraut. Auf feuchten Wiesen in Oesterr. u. Ungarn. Jun. Im F. 2.
Carduus rivul. Pers. l. c. 2. p. 388.

2. *Cn. afer.* Willd. l. c. 3. p. 1682. Africanisches Kratzkraut. In Nordafrica u. Syrien. Jun. Jul. K. H. ♂.
Carduus diacanthus. Pers. l. c. 2. p. 389.

681. Serratula, Scharte.

1. *S. tinctoria.* Pers. l. c. 2. p. 390. Färber-Scharte. Im nördlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. 2.

2. *S. alata.* Willd. enum. suppl. p. 56. Geflügelte Scharte. —. Jul. Aug. Im F. 2.

682. Staehelina, Stäheline.

1. *St. Chamaepeuce.* Pers. l. c. 2. p. 391. Fichtenblättrige Stäheline. In Candien. Sept. Oct. K. H. ♄.

683. Spilanthus, Fleckblume.

1. *Sp. Acmella.* Pers. l. c. 2. p. 393. Wahre Fleckblume. In Ceylon. Jun. Jul. W. H. ☉.

2. *Sp. oleraceus.* Pers. l. c. Krautartige Fleckblume. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☉.

684. Bidens, Zweyzahn.

1. *B. heterophylla.* Pers. l. c. 2. p. 394. Verschiedenblättriger Zweyzahn. In Mexico. Jun. Jul. Ch. ♄.

2. *B. luxurians.* Willd. enum. 2. p. 847. Wuchernder Zweyzahn. In Mexico. Jun. Jul. Ch. ♃.

685. Cacalia, Pestwurz.

1. *C. papillaris.* Pers. l. c. 2. p. 395. Warzige Pestwurz. Am Cap. —. Ch. ♄.

2. *C. Anteuphorbium.* Pers. l. c. Wolfsmilchartige Pestwurz. Am Cap. —. Ch. ♄.

3. *C. Kleinia.* Pers. l. c. Canarische Pestwurz. Auf den Canarischen Inseln. Sept. Oct. Ch. ♄.

4. *C. Ficoides.* Pers. l. c. Zaserblumenartige Pestwurz. Am Cap. Sept. Oct. Ch. ♄.

5. *C. repens.* Pers. l. c. Kriechende Pestwurz. Am Cap. Sept. Oct. Ch. ♄.

6. *C. canescens.* Donn. catalog. cantabrig. p. 151. Graublättrige Pestwurz. Am Cap. —. Ch. ♄.

7. *C. carnosa.* Pers. l. c. Fleischige Pestwurz. Am Cap. —. Ch. ♄.

8. *C. articulata.* Pers. l. c. Dreyblättrige Pestwurz. Am Cap. Sept. Oct. Ch. ♄.
C. laciniata. Jacq. ic. rar. 1. t. 168. Coll. 1. p. 77.

9. *C. cylindrica.* Pers. l. c. Cylindrische Pestwurz. In Africa. —. Ch. ♄.

10. *C. sagittata.* Pers. l. c. Pfeilblättrige Pestwurz. Zu Java. Jun. Jul. Im F. ☉.

11. *C. suaveolens.* Pers. l. c. Wohlriechende Pestwurz. In Virgin. u. Canada. Jun. — Aug. Im F. 4.

12. *C. alpina.* Pers. l. c. 2. p. 397. Alpen-Pestwurz. Auf Alpen in Oesterr. Salzburg, Schlesien, der Schweiz u. den Pyrenäen. Jun. — Aug. Im F. 4.

13. Eine noch unbeschriebene Art vom Cap.

686. Humea, Humea.

1. *H. elegans.* Smith exot. bot. 1. p. 1. t. 1. Schöne Humea. In Australien. Jul. Aug. Ch. ♂. Calomeria amaranthoides. Pers. l. c. 2. p. 406.

687. Piqueria, Piquerie.

1. *P. trinervia.* Pers. l. c. 2. p. 397. Dreynervige Piquerie. In Mexico. Jun. Jul. Ch. 4.

688. Mikania, Mikanie.

1. *M. scandens.* Pers. l. c. 2. p. 398. Kletternde Mikanie. In Wässern v. Virginien. Jul. Aug. K. H. ♄.

689. Eupatorium, Wasserdost.

1. *E. Dalea.* Pers. l. c. 2. p. 399. Weidenblättriger Wasserdost. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. ♄.

2. *E. cannabinum.* Pers. l. c. 2. p. 400. Hanfartiger Wasserdost. In Wässern v. Eur. Jul. Aug. Im F. 24.

3. *E. purpureum.* Pers. l. c. Purpurfarbiger Wasserdost. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 24.

4. *E. perfoliatum.* Pers. l. c. Durchwachsener Wasserdost. In Virginien u. Pensylvanien am Wasser. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *E. ageratoides.* Pers. l. c. 2. p. 401. Ageratumartiger Wasserdost. In Canada u. Virginien. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *E. deltoideum.* Pers l. c. Deltablättriger Wasserdost. —. Jul. Aug. Im F. 24.

690. Ageratum, Ageratum.

1. *A. conyzoides.* Pers. l. c. 2. p. 402. Dürrwurzelartiges Ageratum. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. ☉.

691. Stevia, Stevie.

1. *St. Eupatoria.* Willd. im Magaz. der Gesellsch. naturf. Fr. zu Berl. 1807. p. 138. Wasserdostartige Stevie. In Mexico. Jul. Aug. Ch. 24. St. purpurea. Pers. l. c.

2. *St. purpurea.* Willd. enum. 2. p. 855. Purpurfarbige Stevie. In Mexico. Jul. Aug. Ch. 24. St. purpurea. Pers. l. c.

3. *St. serrata.* Pers. l. c. 2. p. 403. Gesägte Stevie. In Mexico. Jul. Aug. Ch. 24. Ageratum punctatum. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 28. t. 300.

692. Vernonia, Vernonie.

1. *V. noveboracensis.* Pers. l. c. 2. p. 404. Neujorkische Vernonie. Zu Neujork, Virginien, Carolina u. Pensylvanien. Jun. Jul. Im F. 24. Serratula noveborac. Lin. sp. pl. p. 1146.

2. *V. praealta.* Pers. l. c. Hohe Vernonie. In Carolina, Virgin. u. Pensylvan. Jun. Jul. Im F. 24. Serratula praealta. Lin. l. c.

3. *V. anthelmintica.* Pers. l. c. Wurmtreibende Vernonie. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☉. Conyza anthelm. Lin. sp. pl. p. 1207.

693. Chrysocoma, Goldhaar.

1. *Ch. Coma aurea.* Pers. l. c. Gemeines Goldhaar. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

2. *Ch. cernua.* Pers. l. c. Hängendes Goldhaar. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

3. *Ch. denticulata.* Pers. l. c. 2. p. 405. Gezähneltes Goldhaar. —. Jul. Aug. Ch. ♄.

4. *Ch. Linosyris.* Pers. l. c. Deutsches Goldhaar. In Mitteleur. Jun. Jul. Im F. 24.

694. Tarchonanthus, Pelzsame.

1. *T. camphoratus.* Pers. l. c. Kampferartiger Pelzsame. Am Cap. Oct. — Dec. Ch. ♄.

695. Santolina, Heiligenpflanze.

1. *S. Chamaecyparissus.* Pers. l. c. 2. p. 406. Cypressenartige Heiligenpflanze. In Südeur. Jul. Aug. K. H. ♄.

2. *S. rosmarinifolia.* Pers. l. c. Rosmarinartige Heiligenpflanze. In Spanien Jun. — Aug. K. H. ♄.

3. *S. viridis.* Pers. l. c. Grüne Heiligenpflanze. In Span. u. Südfrankr. Jun. — Aug. K. H. ♄.

4. *S. alpina.* Lin. sp. pl. p. 1180. Berg-Heiligenpflanze. In Italien. Jun. Jul. K. H. 24. S. erecta. Pers. l. c. 2. p. 407.

696. Athanasia, Athanasie.

1. *A. virgata.* Pers. l. c. 2. p. 407. Ruthenförmige Athanasie. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.

2. *A. annua.* Pers. l. c. Jährige Athanasie. In der Barbarey. Jun. Jul. Im F. ☉.

3. *A. crithmifolia.* Pers. l. c. Bacillenblättrige Athanasie. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.

4. *A. parviflora.* Pers. l. c. Kleinblumige Athanasie. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.

697. Balsamita, Frauenmünze.

1. *B. vulgaris.* Willd. sp. pl. 3. p. 1802. Gemeine Frauenminze. In Toscana, Languedoc. u. der Schweiz. Jul. Aug. Im F. 4.
Balsam. suaveolens. Pers. l. c. 2. p. 408.
Tanacetum Balsamita. Lin. sp. pl. p. 1184.

698. Pentzia, Pentzie.

1. *P. flabelliformis.* Willd. sp. pl. 3. p. 1808. Fächerförmige Pentzie. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♄.
Balsamita flabelliform. Pers. l. c.

SUPERFLUA.

699. Tanacetum, Wurmkraut.

1. *T. vulgare.* Pers. l. c. 2. p. 409. Gemeines Wurmkraut. (Rainfarrn). Auf Bergen in Eur. Jun. — Oct. Im F. 4.

β. foliis crispis. Mit krausen Blättern.

700. Artemisia, Beyfuss.

1. *A. Abrotanum.* Pers. l. c. Stabwurz-Beyfuss. Im Orient. u. Südfrankr. Jun. — Aug. Im F. ♄.

2. *A. afra.* Pers. l. c. Africanischer Beyfuss. Am Cap? Jul. — Oct. Ch. ♄.

3. *A. arborescens.* Pers. l. c. Baumartiger Beyfuss. In Ital. im Orient. u. in der Barbarey. Jul. Aug. K. H. ♄.

4. *A. argentea.* Pers. l. c. Silberfarbiger Beyfufs. Zu Madera. Sept. Oct. K. H. ♄.

5. *A. scoparia.* Pers. l. c. 2. p. 410. Besen-Beyfufs. In Ungarn, Taurien u. der Tartarey. Jun. Jul. Im F. ☉.

6. *A. crithmifolia.* Pers. l. c. 2. p. 411. Bacillenblättriger Beyfufs. In Portugall u. Frankr. am Meeresstrande. — . K. H. 24.

7. *A. maritima.* Pers. l. c. Meerstrands-Beyfufs. Am Meeresstrande in Norvegen, Schweden, Pommern, Niederland u. England. Jun. Jul. Im F. 24.

8. *A. austriaca.* Pers. l. c. 2. p. 412. Oesterreichischer Beyfufs. In Oesterr. u. Ungarn. Jun. Jul. Im F. 24.

9. *A. pontica.* Pers. l. c. Römischer Beyfufs. Auf trockenen Bergen in Deutschl. der Schweiz u. Ital. Jul. Aug. Im F. 24.

10. *A. Absinthium.* Pers. l. c. 2. p. 413. Bitterer Beyfufs. In Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

11. *A. vulgaris.* Pers. l. c. Gemeiner Beyfufs. In Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

12. *A. Dracunculus.* Pers. l. c. Drachen-Beyfufs. (Bertram). In Südeur. Sibirien u. der Tartarey. Jun. Jul. Im F. 24.

701. Xeranthemum, Papierblume.

1. *X. annuum.* Pers. l. c. Gemeine Papierblume. In Oesterr. Ital. Frankr. Jul. Aug. Im F. ☉.

2. *X. inapertum.* Pers. l. c. Geschlossene Papierblume. In Oesterr. Ungarn, der Schweiz u. Ital. Jun. Jul. Im F. ☉.

702. Elichrysum, Strohblume.

1. *E. bracteatum.* Willd. enum. 2. p. 869. Goldfarbige Strohblume. In Neuholl. Jun. Jul. Ch. ♂.
Helichrysum chrysanthum. Pers. l. c. 2. p. 414. Xeranthemum bracteatum. Vent. hort. malmais. 2. t. 2.

703. Gnaphalium, Ruhrkraut.

1. *Gn. ericoides.* Pers. l. c. 2. p. 417. Heidenartiges Ruhrkraut. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♄.

2. *Gn. Stoechas.* Pers. l. c. Buschiges Ruhrkraut. In Ungarn, Frankr. Span. dem Oesterreichischen Littorale u. im Orient. Jul. Aug. K. H. ♄.

3. *Gn. angustifolium.* Pers. l. c. Schmalblättriges Ruhrkraut. In Span. u. in Ital. bey Neapel. Jul. Aug. K. H. ♄.

4. *Gn. foetidum.* Pers. l. c. 2. p. 418. Stinkendes Ruhrkraut. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♂.

5. *Gn. orientale.* Pers. l. c. Levantisches Ruhrkraut. In Africa. Jun. — Aug. K. H. ♄.

6. *Gn. helianthemifolium.* Pers. l. c. 2. p. 419. Graublättriges Ruhrkraut. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♄.

7. *Gn. squarrosum.* Pers. l. c. Sparrkelchiges Ruhrkraut. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♃.

8. *Gn. divaricatum.* Thunb. prod. 151. Weitästiges Ruhrkraut. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.
Gn. auriculatum. Pers. l. c. 2. p. 420.

9. *Gn. margaritaceum.* Pers. l. c. 2. p. 420. Perlenartiges Ruhrkraut. In Krain, Südtyrol, der Schweiz, in Schlesien, Sibirien, Nordamer. u. Kamtschatka auf Bergen. Jul. — Sept. Im F. 4.

704. Baccharis, Baccharis.

1. *B. ivaefolia.* Pers. l. c. 2. p. 423. Ivablättrige Baccharis. In Virgin. u. Peru. Jul. Aug. K. H. ♄.

2. *B. nereifolia.* Pers. l. c. Oleanderblättrige Baccharis. Am Cap. —. Ch. ♄.

3. *B. halimifolia.* Pers. l. c. Meldenblättrige Baccharis. In Virgin. u. Florida. Jul. Aug. K. H. ♄.

4. *B. adnata.* Willd. enum. 2. p. 870. Angewachsene Baccharis. In Südamer. Jun. W. H. ♄.

5. *B. Dioscoridis.* Pers. l. c. 2. p. 424. Levantische Baccharis. In Syrien u. Aegypt. Jun. Jul. Ch. ♄.

6. *B. parviflora.* Pers. l. c. 2. p. 425. Kleinblüthige Baccharis. An Flüssen in Peru. —. Ch. ♄.

705. Conyza, Dürrwurz.

1. *C. saxatilis.* Pers. l. c. 2. p. 428. Stein-Dürrwurz. In Südeur. Palästina u. der Barbarey. Jun. — Aug. K. H. ♄.

2. *C. candida.* Pers. l. c. 2. p. 429. Weifse Dürrwurz. In Dalmatien u. Candien. Jun. Jul. K. H. ♄.

3. *C. incisa.* Pers. l. c. Eingeschnittene Dürrwurz. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♄.

4. *C. thapsoides* Pers. l. c. Königskerzenartige Dürrwurz. Am Caspischen Meere. Jul. Aug. K. H. 4.

706. Psiadia, Tropfenpflanze.

1. *Ps. glutinosa.* Pers. l. c. Klebrige Tropfenpflanze. Auf der St. Moritzinsel. Jun. Jul. Ch. ♄.

707. Madia, Madie.

1. *M. viscosa.* Pers. l. c. 2. p. 430. Klebrige Madie. In Chili. Aug. Sept. W. H. ☉. M. mellosa. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 29. t. 302.

708. Erigeron, Berufungskraut.

1. *E. alpinum.* Pers. l. c. p. 2. 431. Alpen-Berufungskraut. Auf Alpen in Oesterr. Steyerm. Krain u. der Schweiz. Jun. — Aug. Im F. 4.

709. Senecio, Kreuzkraut.

1. *S. purpureus.* Pers. l. c. 2. p. 432. Purpurfarbiges Kreuzkraut. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 4. Cacalia villosa. Jacq. ic. rar. 3. t. 580. Collect. 2. p. 347.

2. *S. haematophyllus.* Willd. enum. 2. p. 875. Blutblättriges Kreuzkraut. —. —. W. H. ♄.

3. *S. elegans.* Pers. l. c. 2. p. 434. Schönes Kreuzkraut. Am Cap. Jul. — Sept. Im F. ♄.

β. floribus. plenis. Mit gefüllten Blüthen.

4. *S. rosmarinifolius.* Pers. l. c. 2. p. 436. Rosmarinblättriges Kreuzkraut. Am Cap. Jul. Ch. ♄.

5. *S. nemorensis.* Pers. l. c. 2. p. 437. Hain-Kreuzkraut. In Deutschl. Jul. Im F. 2.

6. *S. saracenicus.* Pers. l. c. Heidnisches Kreuzkraut. In Deutschl. der Schweiz, Frankr. u. Engl. Jul. Im F. 2.

7. *S. coriaceus.* Pers. l. c. Lederblättriges Kreuzkraut. Im Orient. Jul. Im F. 2.

8. *S. Doria.* Pers. l. c. Hohes Kreuzkraut. In Oesterr. Deutschl. u. dem Orient. Jul. Im F. 2.

9. *S. rigidus.* Pers. l. c. 2. p. 438. Steifes Kreuzkraut. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.

10. *S. solidaginoides.* Pers. l. c. Goldruthenartiges Kreuzkraut. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♄.

710. Cineraria, Aschenpflanze.

1. *C. geifolia.* Pers. l. c. 2. p. 439. Steinbrechblättrige Aschenpflanze. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.

2. *C. aurita.* Pers. l. c. Geöhrte Aschenpflanze. Auf Madera. Jun. Jul. Ch. ♄.

3. *C. hybrida.* Willd. enum. 2. p. 893. Bastard-Aschenpflanze. —. Apr. — Jul. Ch. ♄.

4. *C. cruenta.* Pers. l. c. Rothblättrige Aschenpflanze. Auf den Canarisch. Inseln. März — Jul. Ch. 2.

5. *C. cordifolia.* Pers. l. c. 2. p. 440. Herzblättrige Aschenpflanze. Auf Alpen in Oesterr. Salzburg, der Schweiz u. Frankr. Jul. Aug. Im F. 2.

6. *C. alpina.* Pers. l. c. Alpen-Aschenpflanze. Auf Europ. Alpen. Jul. Aug. Im F. 2.

7. *C. maritima.* Pers. l. c. Meerstrands-Aschenpflanze. Am Meeresstrande in Südeur. Jul. Aug. K. H. 2.

8. *C. bicolor.* Pers. l. c. Zweyfarbige Aschenpflanze. —. Jul. Aug. K. H. ♄.

9. *C. linifolia.* Pers. l. c. Leinblättrige Aschenpflanze. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

10. *C. lanata.* Pers. l. c. Wollige Aschenpflanze. Auf den Canarischen Inseln. Jun. — Aug. Ch. ♄.

11. *C. amelloides.* Pers. l. c. 2. p. 441. Blaue Aschenpflanze. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.

711. Aster, Sternblume.

1. *A. tomentosus.* Pers. l. c. Filzige Sternblume. In Neuholland. Jul. Aug. Ch. ♄.
A. dentatus. Andrews bot. repos. 1. p. 61. t. 61.

2. *A. argophyllus.* Pers. l. c. Silberblättrige Sternblume. In Neuholl. —. Ch. ♄.

3. *A. Cymbalariae.* Pers. l. c. Fünfzähnige Sternblume. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♄.

4. *A. angustifolius.* Pers. l. c. Schmalblättrige Sternblume. Am Cap. Jun. — Oct. Ch. ♄.

5. *A. fruticulosus.* Pers. l. c. Strauchartige Sternblume. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.

6. *A. alpinus.* Pers. l. c. 2. p. 442. Alpen-Sternblume. Auf Europäischen Alpen. Jul. Aug. Im F. 2.

7. *A. tenellus.* Pers. l. c. Zarte Sternblume. Am Cap. Jul, Aug. Ch. ☉.

8. *A. nemoralis.* Pers. l. c. Wald-Sternblume. In Nordamer. Sept. Oct. Im F. 4.

9. *A. hyssopifolius.* Pers. l. c. Ysopblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

10. *A. punctatus.* Pers. l. c. Punktirte Sternblume. In Ungarn. Aug. Sept. Im F. 4.

11. *A. acris.* Pers. l. c. Scharfe Sternblume. In Ungarn, zu Montpellier u. auf den Pyrenäen. Jul. — Sept. Im F. 4.

12. *A. canus.* Pers. l. c. Graue Sternblume. Im Banat. Aug. Sept. Im F. 4.

13. *A. linifolius.* Pers. l. c. 2. p. 443. Leinblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

14. *A. linariifolius.* Pers. l. c. Frauenflachsblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

15. *A. tenuifolius.* Pers. l. c. Dünnblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

16. *A. dumosus.* Pers. l. c. Buschige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

17. *A. multiflorus.* Pers. l. c. Vielblumige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

18. *A. umbellatus.* Ait. hort. kew. 3 p. 106. Doldenblüthige Sternblume. In Pensylvanien. Aug. Sept. Im F. 4.

19. *A. vernus.* Pers. l. c. Frühlings-Sternblume. In Virginien. Jun. Jul. Im F. 4.

20. *A. salicifolius.* Pers l. c. 2. p. 444. Weidenblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

21. *A. Amellus.* Pers. l. c. Virgils- Sternblume. Auf Hügeln im südlicher. Eur. Jul. Aug. Im F. 4.

22. *A. Novae Angliae.* Pers. l. c. Neuenglische Sternblume. In Neuengland. Aug. Sept. Im F. 4.

23. *A. undulatus.* Pers. l. c. Wellenblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

24. *A. sagittifolius.* Pers. l. c. Pfeilblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

25. *A. paniculatus.* Pers. l. c. 2. p. 445. Rispenästige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

26. *A. corymbosus.* Pers. l. c. Doldentraubige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

27. *A. cordifolius.* Pers. l. c. Herzblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

28. *A. macrophyllus.* Pers. l. c. Grofsblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

29. *A. chinensis.* Pers. l. c. Chinesische Sternblume. In Ostind. China u. Japan. Jul. Aug. Im F. ☉.

30. *A. Tripolium.* Pers. l. c. Meerstrands-Sternblume. Am Meeresstrande in Südeuf. u. auf salzigem Boden in Deutschl. u. Sibirien. Aug. Sept. Im F. 4.

31. *A. puniceus.* Pers. l. c. Blaustielige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

32. *A. annuus.* Ait. hort kew. 3. p. 209. Jährige Sternblume. In Deutschl. Dännemark. u. Canada. Jul. Aug. Im F. ⊙.
Erigeron heterophyllum. Pers. l. c. 2. p. 431.

33. *A. sibiricus.* Pers. l. c. Sibirische Sternblume. In Sibirien. Jul. Im F. 4.

34. *A. laevis.* Pers. l. c. 2, p. 446. Glatte Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

35. *A. mutabilis.* Pers. l. c. Veränderliche Sternblume. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 4.

36. *A. longifolius.* Pers l. c. Langlättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

37. *A. vimineus.* Pers. l. c. Ruthenförmige Sternblume. In Canada. Aug. Sept. Im F. 4.

38. *A. Tradescanti.* Pers. l. c. Tradescantische Sternblume. In Virginien. Aug. Sept. Im F. 4.

39. *A. recurvatus.* Pers. l. c. Zurückgebogene Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

40. *A. floribundus.* Pers. l. c. Blumenreiche Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

41. *A. Novi Belgii.* Pers. l. c. Pensylvanische Sternblume. In Pensylv. u. Virgin. Aug. Sept. Im F. 4.

42. *A. serotinus.* Pers. l. c. 2. p. 447. Späte Sternblume. In Nordamer. Sept. Oct. Im F. 4.

43. *A. tardiflorus.* Pers. l. c. Herbst-Sternblume. In Nordamer. Sept. Oct. Im F. 4.

44. *A. junceus.* Pers. l. c. Binsenartige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

45. *A. fragilis.* Pers. l. c. Zerbrechliche Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

46. *A. miser.* Pers. l. c. Kurzstrahlige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

47. *A. pendulus.* Pers. l. c. Hängende Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

48. *A. diffusus.* Pers. l. c. Weitästige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

Nebst einigen noch nicht bestimmten Arten.

712. Solidago, Goldruthe.

1. *S. canadensis.* Pers. l. c. 2. p. 448. Canadische Goldruthe. In Virgin. u. Canada. Jul. Aug. Im F. 4.

2. *S. altissima.* Pers. l. c. Höchste Goldruthe. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

3. *S. elliptica.* Pers. l. c. Elliptische Goldruthe. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 4.

4. *S. sempervirens.* Pers. l. c. Immergrüne Goldruthe. In Neujork u. Canada. Oct. — Dec. Im F. 4.

5. *S. odora.* Pers. l. c. 2. p. 440. Wohlriechende Goldruthe. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 4.

6. *S. lanceolata.* Pers. l. c. Schmalblättrige Goldruthe. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 4.

7. *S. caesia.* Pers. l. c. Blaustielige Goldruthe. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

8. *S. mexicana.* Pers. l. c. Mexicanische Goldruthe. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 4.

9. *S. flexicaulis* Pers. l. c. Gebogene Goldruthe. In Canada. Jul. Aug. Im F. 4.

β. latifolia. Mit breiteren Blättern.

10. *S. alpestris.* Pers. l. c. Alpen-Goldruthe. Auf Alpen in Oesterr. Böhmen u. den Carpathen. Aug. Sept. Im F. 4.

11. *S. Virga aurea.* Pers. l. c. Gemeine Goldruthe. In Eur. auf trockenen Trieften. Aug. Sept. Im F. 4.

12. *S. rigida.* Pers. l. c. 2. p. 450. Steife Goldruthe. In Pensylvanien. Jun. Jul. Im F. 4.

713. Inula, Alant.

1. *I. Helenium.* Pers. l. c. Wahrer Alant. In England, Niederl. Deutschl. u. Ungarn. Jun. — Aug. Im F. 4.

2. *I. Oculus Christi.* Pers. l. c. Weifsblättriger Alant. In Oesterr. u. um Tübingen. Jun. — Aug. Im F. 4.

3. *I. britannica.* Pers. l. c. Wiesen-Alant. Auf feuchten Wiesen in Eur. Jul. Aug. Im F. 4.

4. *I. dysenterica.* Pers. l. c. Ruhr-Alant. In Eur. an Gräben. Jul. Aug. Im F. 4.

5. *I. squarrosa.* Pers. l. c. 2. p. 451. Sparriger Alant. In Italien u. zu Montpellier. Jul. Aug. Im F. 4.

6. *I. salicina.* Pers. l. c. Weidenblättriger Alant. In Eur. Jun. — Aug. Im F. 4.

7. *I. Bubonium.* Pers. l. c. Knorpliger Alant. Im Oesterreichischen Littorale, Krain, in der Krim u. am Flusse Donec. Jun. Jul. Im F. 24.

8. *I. hirta.* Pers. l. c. Steifhaariger Alant. In Deutschl. Frankr. u. Sibirien. Jun Jul. Im F. 24.

9. *I. germanica.* Pers. l. c. Deutscher Alant. In Deutschl. Ungarn u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

10. *I. ensifolia.* Pers. l. c. Nervigter Alant. In Oesterr. auf Steingerölle u. am Caspischen Meere. Jul. Aug. Im F. 24.

714. Arnica, Wohlverley.

1. *A. montana.* Pers. l. c. Wahrer Wohlverley. (Engelstrank). Auf Bergwiesen im kälteren Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *A. Doronicum.* Pers. l. c. Alpen-Wohlverley. Auf Alpen in Oesterr. Steyerm. Ital. u. zu Dauphine. Jun. Jul. Im F. 24.

715. Doronicum, Gemswurzel.

1. *D. Pardalianches.* Pers. l. c. 2. p. 454. Gemeine Gemswurzel. Auf waldigen Bergen in Oesterr. der Schweiz, Deutschl. Ital. u. Frankr. Jun. Im F. 24.

2. *D. orientale.* Willd. enum. 2. p. 898. Caucasische Gemswurzel. Am Caucasus. März, Apr. Im F. 24.
D. caucasicum. Bieberst. fl. taurico-caucas. 2. p. 321.

716. Tussilago, Huflattig.

1. *T. alpina.* Pers. l. c. 2. p. 455. Alpen-Huflattig. Auf Alpen in Oesterr. Salzb. Schlesien, Böhmen u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 4.

2. *T. discolor.* Pers. l. c. Zweyfarbiger Huflattig. Auf Alpen in Oesterr. Salzb. u. Krain. Jun. Jul. Im F. 4.

3. *T. fragrans.* Pers. l. c. Wohlriechender Huflattig. In Ital. bey Neapel. Nov. Dec. u. Apr. Im F. 4.

4. *T. Petasites.* Pers. l. c. Grofsblättriger Huflattig. In Eur. an Flüfsen u. Bächen. May, Jun. Im F. 4.

717. Georgina, Georgine.

1. *G. variabilis.* Willd. hort. berol. 2. p. et t. 93. Veränderliche Georgine. In Mexico. Jun. Jul. K. H. 4.
Dahlia pinnata. Pers. l. c. 2. p. 458.
Georgina purpurea. Willd. sp. pl. 3. p. 2124.

β. lilacina. Willd. hort. berol. 2. p. et t. 94. Mit lilafarbiger Blüthe.
Dahlia rosea. Pers. l. c.
Georgina rosea. Willd. sp. pl. l. c.

γ. pallida. Willd. hort. berol. 2. p. et t. 95. Mit blafsrother Blüthe.

Sammt mehreren andern sich durch die Blüthenfarbe unterscheidenden Abarten.

2. *G. coccinea.* Willd. hort. berol. 2. p. et t. 96. Scharlachfarbige Georgine. In Mexico. Jun. Jul. K. H. 4.
Dahlia coccinea. Pers. l. c.

β. crocea. Willd. enum. 2. p. 900. Mit safranfarbiger Blüthe.

γ. flava. Willd. l. c. 2. p. 909. Mit gelber Blüthe.

718. Zinnia, Zinnie.

1. *Z. multiflora.* Pers. l. c. Vielblühende Zinnie. In Luisiana. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *Z. verticillata.* Pers. l. c. Wirtelblättrige Zinnie. In Mexico. Jun. Jul. Im F. ☉.

3. *Z. elegans.* Jacq. ic. rar. 3. t. 589. Collect. 5. p. 152. Schöne Zinnie. In Mexico. Jun. — Aug. Im F. ☉.
Z. violacea. Pers. l. c.

4. *Z. tenuiflora.* Jacq. ic. rar. 3. t. 590. Collect. 5. p. 153. Schmalblüthige Zinnie. In Mexico. Jun. — Aug. Im F. ☉.
Z. revoluta. Pers. l. c.

719. Tagetes, Todtenblume.

1. *T. lucida.* Pers. l. c. Ganzblättrige Todtenblume. In Mexico. Jun. — Aug. Im F. ♃.

2. *T. patula.* Pers. l. c. Gemeine Todtenblume. In Mexico. Jun. — Aug. Im F. ☉.

3. *T. erecta.* Pers. l. c. Grofsblumige Todtenblume. In Mexico. Jun. — Aug. Im F. ☉.

4. *T. tenuifolia.* Pers. l. c. 2. p. 459. Feinblättrige Todtenblume. In Peru. Jun. — Aug. Im F. ☉.

720. Bellis, Mafsliebe.

1. *B. perennis* β hortensis fl. pleno albo. Pers. l. c. 2. p. 459. Garten-Mafsliebe mit weiss-gefüllter Blume. Kömmt in Gärten vor. May — Aug. Im F. 2.

γ. hortensis fl. pl. rubro. Mit rothgefüllter Blüthe.

721. Chrysanthemum, Wucherblume.

1. *Ch. carinatum.* Pers. l. c. 2. p. 462. Dreyfarbige Wucherblume. In der Barbarey. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *Ch. coronarium.* Pers. l. c. 2. p. 463. Garten-Wucherblume. In Candien, Sicilien u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. ☉.

722. Pyrethrum, Bertramwurz.

1. *P. frutescens.* Willd. sp. pl. 2. p. 2150. Strauchartige Bertramwurz. Auf den Canarischen Inseln. Jun. — Aug. Ch. ♄.
Chrysanthem. frutesc. Pers. l. c. 2. p. 461.

2. *P. serotinum.* Willd. l. c. 3. p. 2151. Späte Bertramwurz. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 2.
Chrysanthem. serot. Pers. l. c. 2. p. 460.

3. *P. uliginosum.* Willd. l. c. 3. p. 2152. Schlamm-Bertramwurz. In Ungarn's u. Spanien's Sümpfen. Jul. Aug. Im F. 2.
Chrysanthem. uliginos. Pers. l. c.

4. *P. alpinum.* Willd. l. c. 3. p. 2153. Alpen-Bertramwurz. Auf den höchsten Alpen im südlicher. Europa. Jul. Aug. Im F. 24.
Chrysanthem. alpin. Pers. l, c. 2. p. 461.

5. *P. pinnatifidum.* Willd. l. c. 3. p. 2154. Schlitzblättrige Bertramwurz. Auf hohen Felsen zu Madera. Jun. — Aug. K. H. 24.
Chrysanthem. pinnatif. Pers. l. c.

6. *P. macrophyllum.* Willd. l. c. Grofsblättrige Bertramwurz. In Wäldern v. Croatien, auf Bergen in Sclavon. dann im Banat u. an den Gränzen der Walachey. Jul. Im F. 24.
Chrysanth. macroph. Pers. l. c.

7. *P. corymbosum.* Willd. l. c. 3. p. 2155. Doldentraubige Bertramwurz. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz u. Sibirien. May — Jul. Im F. 24.
Chrysanthem. corymb. Pers. l. c.

8. *P. Parthenium.* Willd. l. c. Mutterkraut-Bertramwurz. In Eur. an bebauten Stellen. Jun. — Aug. Im F. 24.
Chrysanthem. Parthen. Pers. l. c. 2. p. 462.
Matricaria Parthen. Lin. sp. pl. p. 1255.

723. Matricaria, Mutterkraut.

1. *M. Chamomilla.* Pers. l. c. 2. p. 463. Chamillen-Mutterkraut. In Eur. an bebauten Stellen. Jun. — Aug. Im F. ⊙.

724. Lidbeckia, Lidbeckie.

1. *L. pectinata.* Thunb. prod. 161. Eingeschnittene Lidbeckie. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.
Lancisia pectinata. Pers. l. c.
Cotula stricta. Lin. mant. 287.

725. Boltonia, Boltonie.

1. *B. glastifolia.* Pers. l. c. 2. p. 464. Graublättrige Boltonie. In Pensylvan. u. Virgin. Sept. Oct. Im F. 4.

726. Anthemis, Chamille.

1. *A. Cota.* Pers. l. c. 2. p. 465. Stechende Chamille. In Ital. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *A. nobilis.* Pers. l. c. 2. p. 466. Römische Chamille. Im südlichen Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

3. *A. austriaca.* Pers. l. c. Oesterreichische Chamille. In Oesterr. Ungarn, Steyerm. u. Italien. Jun. Jul. Im F. ☉.

4. *A. artemisiaefolia.* Willd. nov. act. soc. nat. scrut. berol. 3. p. 431. Beyfufsblättrige Chamille. In China. Sept. — Decemb. K. H. ♄. Chrysanthem. indicum. Pers. l. c. 2. p. 461.

β. floribus luteis. Mit gelben Blüthen.

5. *A. trilobata.* Orteg. 6. p. 72. Dreylappige Chamille. In Mexico. Jul. Aug. Ch. ♄.

6. *A. tinctoria.* Pers. l. c. 2. p. 466. Färber-Chamille. In Deutschl. u. Schweden auf trockenen, sonnigen Wiesen. Jun. Jul. Im F. 4.

727. Achillea, Schafgarbe.

1. *A. grandiflora.* Bieberst. fl. taurico-caucas. 2. p. 335. Grofsblüthige Schafgarbe. Am Caucasus. Jun. Jul. Im F. 4.
Chrysanth. ptarmicaefol. Pers. l. c. 2. p. 460.

2. *A. Ptarmica.* Pers. l. c. Sumpf-Schafgarbe. An feuchten Stellen in Nordasien u. America. Jul. Aug. Im F. 4.

3. *A. Ageratum.* Pers l. c. 2. p. 467. Gewürzhafte Schafgarbe. In Ital. Frankr. u. Spanien. Jun. Jul. Im F. 4.

4. *A. alpina.* Pers. l. c. Alpen-Schafgarbe. Auf Alpen in der Schweiz, Savoyen u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 4.

5. *A. Clavennae.* Pers. l. c. Bittere Schafgarbe. Auf Alpen in Oesterr. Salzb. Krain, Kärnthen u. der Schweiz. Jul. Aug. Im F. 4.

6. *A. atrata.* Pers. l. c. 2. p. 468. Schwarzkelchige Schafgarbe. Auf Alpen in Oesterr. Salzb. Krain, der Schweiz u. Italien. Jun. — Aug. Im F. 4.

7. *A. aegyptiaca.* Pers. l. c. Aegyptische Schafgarbe. In Aegypten, im Orient u. bey Astrachan. Jun. Jul. K. H. 4.

8. *A. Eupatorium.* Pers. l. c. Caspische Schafgarbe. Am Caspischen Meere. Jul. Aug. Im F. 4.

9. *A. magna.* Pers. l. c. 2. p. 469. Grofse Schafgarbe. In Südeur. Jun. Jul. Im F. 4.

10. *A. Millefolium* β flore purpureo. Pers. l. c. Gemeine Schafgarbe mit purpurrother Blüthe. In Eur. Asien u. Nordamer. May — Aug. Im F. 4.

11. *A. ligustica.* Pers. l. c. Ligurische Schafgarbe. Auf Hügeln in Italien. Jun. Jul. Im F. 4.

728. Verbesina, Verbesine.

1. *V. alata.* Pers. l. c. 2. p. 471. Geflügelte Verbesine. Zu Curassao u. Surinam. Jun. — Aug. W. H. 2.

2. *V. gigantea.* Pers. l. c. Riesenartige Verbesine. In Westind. Jun. Jul. W. H. ♄.

3. *V. pinnatifida.* Pers. l. c. 2. p. 472. Schlitzblättrige Verbesine. In Mexico. Jul. — Sept. W. H. ♄.

4. *V. serrata.* Pers. l. c. Gesägte Verbesine. In Mexico. Jul. — Sept. W. H. 2.

729. Pascalia, Pascalie.

1. *P. glauca.* Pers. l. c. 2. p. 473. Graugrüne Pascalie. In Chili. — K. H. ♄.

730. Ximenesia, Ximenesie.

1. *X. encelioides.* Pers. l. c. Geöhrte Ximenesie. In Mexico. Jun. Jul. Ch. 2.

731. Buphthalmum, Rindsauge.

1. *B. frutescens.* Pers. l. c. Strauchartiges Rindsauge. In Jamaica u. Virginien. Jun. — Oct. K. H. ♄.

2. *B. sericeum.* Pers. l. c. 2. p. 474. Seidenartiges Rindsauge. Auf Teneriffa. Jun. — Aug. Ch. ♄.

3. *B. spinosum.* Pers. l. c. Stachelkelchiges Rindsauge. In Ital. Span. Languedoc u. im Orient. Jun. — Aug. K. H. ♂.

4. *B. maritimum.* Pers. l. c. Meerstrands-Rindsauge. Am Mittelländischen Meere. Jul. — Oct. K. H. 4.

5. *B. salicifolium.* Pers. l. c. Weidenblättriges Rindsauge. Auf Alpen in Oester.. Ital. u. zu Montpellier. Jun. — Aug. Im F. 4.

6. *B. grandiflorum.* Pers. l. c. Grofsblüthiges Rindsauge. Auf Bergen in Oesterr. Ital. u. zu Montpellier. Jun. Jul. Im F. 4.

7. *B. cordifolium.* Pers. l. c. Herzblättriges Rindsauge. In Wäldern im Banat u. in Croatien. Jun. — Aug. Im F. 4.

8. *B. helianthoides.* Lin. sp. pl. p. 1275. Sonnenblumenartiges Rindsauge. In Nordamer. Sept. Oct. Im F. 4.
Heliopsis laevis. Pers. l. c. 2. p. 473.
Helianthus — Lin. l. c. p. 1278.
Rudbeckia oppositifolia. Lin. l. c. p. 1280.
Silphium solidaginoides. Lin. l. c. p. 1302.

732. Helenium, Helenie.

1. *H. autumnale.* Pers. l. c. Herbst-Helenie. In Nordamer. Jun. — Aug. Im F. 4.

2. *H. quadridentatum.* Pers. l. c. 2. p. 475. Vierzähnige Helenie. In Portugall. Jun. — Aug. K. H. 4.
Rudbeckia alata. Jacq. ic. rar. 3. t. 593. Collect. 5. p. 154.

FRUSTRANEA.

733. Helianthus, Sonnenblume.

1. *H. annuus.* Pers. l. c. Gemeine Sonnenblume. In Peru u. Mexico. Jun. — Aug. Im F. ☉.

2. *H. multiflorus.* Pers. l. c. Vielblumige Sonnenblume. In Virgin. Jul. Aug. Im F. 4.

3. *H. tuberosus.* Pers. l. c. Knollige Sonnenblume. In Brasilien. Jul. — Oct. Im F. 4.

4. *H. mollis.* Pers. l. c. Weichblättrige Sonnenblume. In Nordamer. Jul. — Sept. Im F. 4.

5. *H. prostratus.* Pers. l. c. Gestreckte Sonnenblume. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 4.

6. *H. giganteus.* Pers. l. c. Riesen-Sonnenblume. In Virgin. u. Canada. Jul. Aug. Im F. 4.

7. *H. altissimus.* Pers. l. c. 2. p. 476. Höchste Sonnenblume. In Pensylvan. Jul. Aug. Im F. 4.

734. Rudbeckia, Rudbeckie.

1. *R. laciniata.* Pers. l. c. Schlitzblättrige Rudbeckie. In Virgin. u. Canada. Jul. Aug. Im F. 4.

2. *R. pinnata.* Pers. l. c. Gefiederte Rudbeckie. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 4.
R. odorata. Hortulan.

3. *R. hirta.* Pers. l. c. Rauhe Rudbeckie. In Virgin. u. Florida. Jul. Aug. Im F. 4.

4. *R. purpurea.* Pers. l. c. 2. p. 477. Purpurrothe Rudbeckie. In Virgin. Carolina u. Florida auf Bergen. Jul. Aug. Im F. 4.

5. *R. amplexicaulis.* Pers. l. c. Stengelumfassende Rudbeckie. In Luisiana u. Mexico. Jun. Jul. Im F. ⊙.

735. Cosmea, Cosmea.

1. *C. bipinnata.* Willd. sp. pl. 3. p. 2250. Doppeltgefiederte Cosmea. In Mexico. Jun. — Aug. Im F. ⊙.
Cosmus bipinnatus. Pers. l. c.

2. *C. parviflora.* Willd. l. c. 3. p. 2251. Kleinblumige Cosmea. In Mexico. Jun. — Aug. Im F. ☉. Cosmus parviflor. Pers. l. c.
Coreopsis parviflora. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 65. t. 374.

736. Coreopsis, Wanzenblume.

1. *C. ferulaefolia.* Pers. l. c. Peitschenkrautblättrige Wanzenblume. In Mexico. Nov. Dec. Ch. 24.

2. *C. verticillata.* Pers. l. c. Wirtelblättrige Wanzenblume. In Virgin. Jul. Aug. Im F. 24.

3. *C. tenuifolia.* Pers. l. c. Feinblättrige Wanzenblume. In Carolina. Jul. Aug. Im F. 24.

4. *C. tripteris.* Pers. l. c. 2. p. 478. Dreyblättrige Wanzenblume. Auf hohen Bergen in Virgin. u. Carolina. Jul. Aug. Im F. 24.

5. *C. auriculata.* Pers. l. c. Geöhrte Wanzenblume. Auf Bergen in Virginien u. Carolina. Jun. — Aug. Im F. 24.

737. Pallasia, Pallasie.

1. *P. grandiflora.* Willd. sp. pl. 3. p. 2261. Grofsblumige Pallasie. In Mexico. Jul. Aug. Ch. ♄. Encelia halimifolia. Pers. l. c. 2. p. 479.

738. Gorteria, Gorterie.

1. *G. rigens.* Pers. l. c. 2. p. 480. Liegende Gorterie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

2. *G. pectinata.* Pers. l. c. Kammförmige Gorterie. Am Cap. Jul. Ch. 24.

739. Berckheya, Berckheye.

1. *B. incana.* Pers. l. c. Graue Berckheye. In den innern Gegenden am Cap. Jun. — Oct. Ch. ♄.
Gorteria asteroides. Lin. suppl. 381.

2. *B. grandiflora.* Pers. l. c. Grofsblumige Berckheye. Auf Bergen am Cap. Aug. — Oct. Ch. ♄.
Atractylis oppositifolia. Lin. mant. 477.

3. *B. squarrosa.* Pers. l. c. 2. p. 481. Sparrige Berckheye. An den Meeresküsten am Cap. Novemb. Decemb. Ch. ♄.
Gorteria squarrosa, Lin. sp. pl. p. 1284.

740. Centaurea, Flockenblume.

1. *C. moschata.* Pers. l. c. Bisamduftende Flockenblume. In Griechenland. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *C. suaveolens.* Pers. l. c. Wohlriechende Flockenblume. Im Orient. Jun. Jul. Im F. ☉.

3. *C. ruthenica.* Pers. l. c. 2. p. 482. Russische Flockenblume. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. 2.

4. *C. phrygia.* Pers. l. c. Phrygische Flockenblume. Auf waldigen Bergen in Oesterr. Deutschl. der Schweiz u. Finnland. Jun. Jul. Im F. 2.

5. *C. axillaris.* Wild. sp. pl. 3. p. 2290. Seitenblüthige Flockenblume. Auf Bergen in Oesterr. Ungarn, der Schweiz u. Südfrankr. May — Jul. Im F. 2.
C. seusana. Pers. l. c. 2. p. 483.

6. *C. montana.* Pers. l. c. Berg-Flockenblume. Auf Bergen in Oesterr. Deutschl. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.

7. *C. ragusina.* Pers. l. c. Ragusische Flockenblume. In Candien u. zu Epidaurus. Jun. Jul. K. H. 24.

8. *C. Cineraria.* Pers. l. c. Aschenfarbige Flockenblume. In Ital. Jun. Jul. K. H. 24.

9. *C. glastifolia.* Pers. l. c. 2. p. 485. Spreukelchige Flockenblume. Im Orient u. in Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

10. *C. sonchifolia.* Pers. l. c. Gänsedistelblättrige Flockenblume. Am Mittelländischen Meeresstrande. Jun. — Aug. K. H. 24.

11. *C. ferox.* Pers. l. c Vielstachlige Flockenblume. In der Barbarey. Jun. — Aug. K. H. 24.

12. *C. Calcitrapa.* Pers. l. c. 2. p. 486. Calcitrapen-Flockenblume. Im südlicher. Eur. Jun. — Aug. Im F. ⊙.

13. *C. napifolia.* Pers. l. c. Rübenblättrige Flockenblume. In Candien u. der Barbarey. Jun. Jul. Im F. ⊙.

NECESSARIA.

741. Silphium, Silphium.

1. *S. therebinthinaceum.* Pers. l. c. 2. p. 489. Therebinthenartiges Silphium. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 24.

2 *S. perfoliatum.* Pers. l. c. Durchwachsenes Silphium. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 24.

3. *S. connatum.* Pers. l. c. Verwachsenes Silphium. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 24.

742. Polymnia, Polymnie.

1. *P. Uvedalia.* Pers. l. c. 2. p. 491. Carolinische Polymnie. In Virgin. Carolin. u. Mexico. Aug. Sept. K. H. 4.

743. Calendula, Ringelblume.

1. *C. officinalis.* Pers. l. c. 2. p. 492. Gemeine Ringelblume. In Südeur. Jun. — Oct. Im F. ☉.

2. *C. pluvialis.* Pers. l. c. Regen-Ringelblume. Am Cap. Jun. — Aug. Im F. ☉.

3. *C. hybrida.* Pers. l. c. Bastard-Ringelblume. Am Cap. Jun. Jul. Im F. ☉.

4. *C. graminifolia.* Pers. l. c. Grasblättrige Ringelblume. Am Cap. März — Sept. Ch. ♄.

5. *C. Tragus* β *flaccida.* Pers. l. c. Grofsblumige Ringelblume mit schlaffen Blättern. Am Cap. May — Aug. Ch. ♄.

6. *C. chrysanthemifolia.* Pers. l. c. Wucherblumenblättrige Ringelblume. März — Jun. Ch. ♄.

7. *C. fruticosa.* Pers. l. c. Strauchartige Ringelblume. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

744. Arctotis, Bährenohr.

1. *A. acaulis.* Pers. l. c. 2. p. 493. Stengelloses Bährenohr. Am Cap wie alle folgende. Jun. Jul. Ch. ♄.

2. *A. tricolor.* Pers. l. c. Dreyfarbiges Bärenohr. Jun. Jul. Ch. ♄.

3. *A. glaucophylla.* Pers. l. c. Graublättriges Bärenohr. Jun. Jul. Ch. 4.

4. *A. rosea.* Pers. l. c. Rosenfarbiges Bärenohr. Jun. Jul. Ch. ♄.

5. *A. decumbens.* Pers. l. c. Liegendes Bärenohr. Jun. Jul. Ch. 4.

6. *A. angustifolia.* Pers. l. c. Schmalblättriges Bärenohr. Apr. — Jun. Ch. ♄.

7. *A. flammea.* Jacq. fragm. bot. p. 41. n. 141. t. 47. f. 1. Feuerrothes Bärenohr. Jun. Jul. Ch. ♄.

8. *A. decurrens.* Pers. l. c. Ablaufendes Bärenohr. März — Jun. Ch. ♄.

9. *A. auriculata.* Pers. l. c. Geöhrtes Bärenohr. Jun. — Aug. ♄.

10. *A. melanocycla.* Willd. enum. 2. p. 937. Schwarzzirkliges Bärenohr. Jun. Jul. Ch. ♄.

11. *A. chrysocycla.* Hort. bot. vindob. Gelbzirkliges Bärenohr. Jun. Jul. Ch. ♄.

12. *A. aenea.* Jacq. eclog. fasc. 6. p. 77. t. 52. Erzfärbiges Bärenohr. May, Jun. Ch. ♄.

13. *A. aspera.* Pers. l. c. 2. p. 494. Scharfblättriges Bärenohr. Jun. Jul. Ch. ♄.

14. *A. elatior.* Pers. l. c. Hochstieliges Bärenohr. Jun. Jul. Ch. ♄.

15. *A. arborescens.* Pers. l. c. Baumartiges Bärenohr. Jun. — Aug. Ch. ♄.

16. *A. cuprea.* Pers. l. c. Kupferfarbiges Bärenohr. May — Jul. Ch. ♄.

17. *A. squarrosa.* Pers. l. c. Sparriges Bärenohr. May — Jul. Ch. ♄.

β. floribus pallidioribus. Mit blässeren Blüthen.

745. Arctotheca, Bärenbüchse.

1. *A. repens.* Pers. l. c. 2. p. 495. Kriechende Bärenbüchse. Am Cap. Blüht den ganzen Sommer hindurch. Ch. 4.
Arctotis repens. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 31. t. 306.

746. Osteospermum, Beinsame.

1. *O. spinosum.* Pers. l. c. Dorniger Beinsame. Am Cap. Sept. Oct. Ch. ♄.

2. *O. pisiferum.* Pers. l. c. Erbsentragender Beinsame. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

3. *O. moniliferum.* Pers. l. c. Halsbandförmiger Beinsame. Am Cap. Apr. — Jul. Ch. ♄.

4. *O. coeruleum.* Pers. l. c. Blauer Beinsame. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.
O. pinnatifidum. L'Herit. stirp. nov. 11. t. 6.

747. Othonna, Othonne.

1. *O. crassifolia.* Pers. l. c. 2. p. 496. Dickblättrige Othonne. In Africa. Jul. Aug. Ch. ♄.

2. *O. Linguа.* Pers. l. c. Zungenförmige Othonne. Am Cap. Jänn. — März. Ch. 4.

748. Hippia, Hippie.

1. *H. frutescens.* Pers. l. c. 2. p. 497. Strauchartige Hippie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♄.

749. Eriocephalus, Wollenkopf.

1. *E. africanus.* Pers. l. c. Africanischer Wollenkopf Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♄.

750. Iva, Ive.

1. *I. frutescens.* Pers. l. c. Strauchartige Ive. In Nordamer. u. Peru. Sept. Oct. Ch. ♄.

SEGREGATA.

751. Elephantopus, Elephantenfuſs.

1. *E. scaber.* Pers. l. c. 2. p. 498. Rauher Elephantenfuſs. In Ostindien. Jun. Jul. W. H. ♃.

752. Echinops, Kugeldistel.

1. *E. sphaerocephalus.* Pers. l. c. 2. p. 499. Gemeine Kugeldistel. In Oesterr. Deutschl. u. Ital. Jun. Jul. Im F. ♃.

2. *E. Ritro.* Pers. l. c. Glattblättrige Kugeldistel. Auf Hügeln in Krain, Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. ♃.

CLASSIS XIX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

753. Cymbidium, Kahnlippe.

1. *C. aloifolium.* Pers. l. c. 2. p. 515. Aloeblättrige Kahnlippe. In Malabar. Apr. — Aug. W. H. 24.
Epidendrum aloifolium. Lin. sp. pl. p. 1350.

2. *C. verecundum.* Pers. l. c. 2. p. 516. Faltige Kahnlippe. Auf den Bahamainseln. Jun. — Aug. W. H. 24.
Limodorum verecundum. Salisb. prod. 9.
Limodorum altum. Jacq. ic. rar. 3. t. 602.

3. *C. altum.* Pers. l. c. Hohe Kahnlippe. In Westind. Jun. — Aug. W. H. 24.
Limodorum altum. Lin. syst. veg. p. 680.

4. *C. ensifolium.* Pers. l. c. 2. p. 517. Schwertblättrige Kahnlippe. In China u. Japan. Jun. Jul. Ch. 24.
Epidendrum ensifolium. Lin. sp. pl. p. 1352.

754. Epidendrum, Baumwurzler.

1. *E. cochleatum.* Pers. l. c. 2. p. 518. Schneckenförmiger Baumwurzler. Auf den Bahamainseln. In Jamaica, Martinique u. Gujana. Nov. Decemb. W. H. 24.

2. *E. ciliare.* Pers. l. c. 2. p. 519. Gefranzter Baumwurzler. In Wäldern zu Martinique. Jun. — Sept. W. H. 24.

3. *E. elongatum.* Pers. l. c. Verlängerter Baumwurzler. In Caracas. Jun. Jul. W. H. 4.

755. Vanilla, Vanille.

1. *V. aromatica.* Pers. l. c. 2. p. 520. Gewürzhafte Vanille. Im wärmeren Amer. —. W. H. ♄. Epidendrum Vanilla. Lin. sp. pl. p. 1347.

2. Eine noch unbeschriebene Art. v. Caracas.

756. Limodorum, Dingel.

1. *L. Tankervilliae.* Ait. hort. kew 3. p. 302. t. 12. Chinesischer Dingel. In China. Jun. Jul. W. H. 4.
Limodor. Incarvillei. Pers. l. c..

757. Cypripedium, Frauenschuh.

1. *C. Calceolus.* Pers. l. c. 2. p. 525. Europäischer Frauenschuh. In schattigen Wäldern v. Europa. May. Im F. 4.

HEXANDRIA.

758. Aristolochia, Osterluzey.

1. *A. trilobata.* Pers. l. c. 2. p. 526. Dreylappige Osterluzey. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. ♄.

2. *A. panduriformis.* Pers. l. c. Geigenblättrige Osterluzey. In Caracas. —. W. H. ♄.

3. *A. Sipho.* Pers. l. c. Grofsblättrige Osterluzey. Auf den Alleghanischen Bergen von Carolina gegen Florida. May. Im F. ♄.

4. *A. glauca.* Pers. l. c. 2. p. 527. Graublättrige Osterluzey. In Portugall u. der Barbarey. Jun. Jul. K. H. ♄.

5. *A. oblongata.* Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 29. t. 183. Verlängerte Osterluzey. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. ♄.

6. *A. sempervirens.* Pers. l. c. Immergrüne Osterluzey. In Candien. Jun. — Aug. K. H. ♄.

7. *A. Serpentaria.* Pers. l. c. Arzeneykräftige Osterluzey. In Virginien. Jul. — Sept. K. H. 4.

8. *A. rotunda.* Pers. l. c. Runde Osterluzey. In Ital. Südfrankr. u. Spanien. Jun. Jul. K. H. 4.

9. *A. Clematitis.* Pers. l. c. Gemeine Osterluzey. In Oesterr. Frankr. u. der Tartarey. Jul. Im F. 4.

CLASSIS XX.

MONOECIA.

MONANDRIA.

759. Casuarina, Streitkolbenbaum.

1. *C. equisetifolia.* Pers. l. c. 2. p. 531. Indischer Streitkolbenbaum. In Ostind. u. den Inseln des stillen Meeres. März, Apr. W. H. ♄.

TRIANDRIA.

760. Tripsacum, Löchergras.

1. *Tr. monostachyon.* Pers. l. c. 2. p. 533. Einähriges Löchergras. In Südcarolina. Jun. Jul. W. H. 4.

761. Coix, Thränengras.

1. *C. Lachryma.* Pers. l. c. Hiobs-Thränengras. In Ostind. Jul. Aug. W. H. 2.

762. Comptonia, Comptonie.

1. *C. asplenifolia.* Pers. l. c. 2. p. 549. Streifenfarrenblättrige Comptonie. In Virginien u. auf hohen Bergen in Carolina. —. Ch. ♄. Liquidambar asplenifol. Lin. sp. pl. p. 1418.

763. Tragia, Tragie.

1. *Tr. volubilis.* Pers. l. c. Windende Tragie. In Westind. auf Kalkboden. Apr. May. u. Aug. Sept. W. H. ♄.

764. Hernandia, Hernandie.

1. *H. sonora.* Pers. l. c. 2. p. 550. Tönende Hernandie. In beyden Indien. —. W. H. ♄.

2. *H. ovigera.* Pers. l. c. Eyertragende Hernandie. In Ostind. —. W. H. ♄.

TETRANDRIA.

765. Aucuba, Aucube.

1. *A. japonica.* Pers. l. c. Japanische Aucube. In Japan. Apr. — Jun. Ch. ♄.

766. Alnus, Erle.

1. *A. glutinosa.* Pers. l. c. Gemeine Erle. Am Wasser in den nördlichen Theilen von Eur. Asien, Africa u. America. Apr. Im F. ♄. Betula Alnus. Lin. sp. pl. p. 1394.

β. laciniata. Mit zerschlitzten Blättern.

2. *A. incana.* Pers. l. c. Graue Erle. Auf Bergen in Oesterr. Steyerm. Tyrol, Salzb. der Schweiz u. Niederamer. dann in Sandgegenden Preussens u. Lapplands. März. Im F. ♄. Betula incana. Lin. suppl. 417.

3. *A. serrulata.* Pers. l. c. Hasel-Erle. Von Pensylvan. gegen Carolina zu. Apr. Im F. ♄. Betula serrulata. Ait. hort kew. 3. p. 338.

767. Cicca, Cicca.

1. *C. disticha.* Pers. l. c. 2. p. 451. Zweyzeilige Cicca. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♄. Averrhoa acida. Lin. sp. pl. p. 613. Phyllanthus longifolius. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 36. t. 194.

2. *C.*? Von Madagascar.

768. Buxus, Buchsbaum.

1. *B. sempervirens.* Pers. l. c. Gemeiner Buchsbaum. In Südeur. May, Jun. Im F. ♄.

β. arborescens. Mit baumartigem Wuchse.

γ. —— foliis variegatis. Mit fleckigen Blättern.

2. *B. balearica.* Pers. l. c. Balearischer Buchsbaum. Auf den Balearischen Inseln. Jun. K. H. ♄.

769. Pachysandra, Dickfaden.

1. *P. procumbens.* Pers. l. c. Liegender Dickfaden. Auf den Alleghanischen Bergen in Nordamer. März. Apr. Im F. 24.

770. Diotis, Doppelohr.

1. *D. ceratoides.* Willd. sp. pl. 4. p. 368. Orientalisches Doppelohr. In Mähren, der Tartarey, Armenien u. dem glücklichen Arabien. Jul. Aug. Im F. ♄.
Ceratospermum papposum. Pers. l. c.
Axyris Ceratoides. Lin. sp. pl. p. 1389.

771. Urtica, Nessel.

1. *U. pilulifera.* Pers. l. c. 2. p. 552. Römische Nessel. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *U. crassifolia.* Pers. l. c. Dickblättrige Nessel. Im wärmer. Amer. ? May — Jul. W. H. ♄.

3. *U. cannabina.* Pers. l. c. 2. p. 553. Hanfblättrige Nessel. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *U. canadensis.* Pers. l. c. 2. p. 554. Canadische Nessel. In Canada u. Sibirien. Jul. Aug. Im F. 24.

5. *U. nivea.* Pers. l. c. 2. p. 555. Schneeweifse Nessel. In China auf Mauern. Jul. Ch. 24.

6. *U. caracasana,* Pers. l. c. Caracasanische Nessel. Zu Caracas. Jun. — Aug. W. H. ♄.

7. *U. baccifera.* Pers. l. c. Beerentragende Nessel. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. W. H. ♄.

772. Parietaria, Glaskraut.

1. *P. officinalis.* Pers. l. c. Gemeines Glaskraut. In Eur. Jun. Jul. Im F. 2|.

2. *P. cretica.* Pers. l. c. Candisches Glaskraut. In Candien u. am Caspischen Meere. Jun. Jul. Im F. ⊙.

773. Boehmeria, Böhmerie.

1. *B. cylindrica.* Pers. l. c. 2. p. 556. Walzenährige Böhmerie. In Nordamer. an feuchten Plätzen u. in Jamaica. Sept. — Dec. Ch. 2|.
Urtica cylindrica. Lin. sp. pl. p. 1396.

2. *B. ramiflora.* Pers. l. c. Astblüthige Böhmerie. Zu Jamaica u. Martinique. May, Jun. W. H. ♄.
Caturus ramiflorus. Lin. mant. 127.

3. *B. rubescens.* Jacq. fragm. bot. p. 8. n. 30. t. 5. f. 1. Röthliche Böhmerie. Zu Teneriffa auf waldigen feuchten Bergen. Jun. Jul. K. H. ♄.
Boehmeria arborea. Pers. l. c.
Parietaria arborea. Ait. hort. kew. 3. p. 429.

774. Dorstenia, Dorstenie.

1. *D. Contrajerva.* Pers. l. c. 2. p. 557. Wurmtreibende Dorstenie. In Südamer. Jul. Aug. W. H. 2|.

775. Morus, Maulbeere.

1. *M. alba.* Pers. l. c. Weifse Maulbeere. In China u. Persien. May. Im F. ♄.

2. *M. tartarica.* Pers. l. c. Tartarische Maulbeere. An der Wolga. May. Im F. ♄.

3. *M. nigra.* Pers. l. c. Schwarze Maulbeere. In Südeuropa u. Persien. May. Im F. ♄.

4. *M. rubra.* Pers. l. c. 2. p. 558. Rothe Maulbeere. In Canada u. Florida. May. Im F. ♄.

5. *M. mauritiana.* Pers. l. c. Scharfblättrige Maulbeere. Auf der St. Moritzinsel. Jun. Jul. W. H. ♄.

PENTANDRIA.

776. Ambrosia, Ambrosie.

1. *A. peruviana.* Pers. l. c. 2. p. 559. Peruvianische Ambrosie. In Peru. Jun. — Aug. Ch. 4.

777. Amaranthus, Amaranth.

1. *A. tricolor.* Pers. l. c. Dreyfarbiger Amaranth. In Ostind. China. Jul. Aug. Im F. ☉.

2. *A. bicolor.* Pers. l. c. Zweyfarbiger Amaranth. In China? Jul. Aug. Im F. ☉.

3. *A. tristis.* Pers. l. c. 2. p. 560. Trauriger Amaranth. In Ostind. u. China. Jun. — Aug. Im F. ☉.

4. *A. lividus.* Pers. l. c. Braunblättriger Amaranth. In Virgin. Jul. Aug. Im F. ☉.

5. *A. viridis.* Pers. l. c. Grüner Amaranth. In Jamaica u. Brasilien. Jun. — Aug. Im F. ☉.

6. *A. sanguineus.* Pers. l. c. Blutfarbiger Amaranth. Auf den Bahamainseln. Jul. Aug. Im F. ☉.

7. *A. caudatus.* Pers. l. c. Geschwänzter Amaranth. In Peru, Persien u. Rufsland. Jun. Jul. Im F. ☉.

POLYANDRIA.

778. Begonia, Begonie.

1. *B. nitida.* Pers. l. c. 2. p. 564. Glänzende Begonie. Auf Bergen zu Jamaica. Sept. W. H. ♄.

2. *B. odorata.* Willd. enum. suppl. p. 64. Wohlriechende Begonie. —. Jul. Aug. W. H. ♄.

3. *B. dichotoma.* Pers. l. c. Gabelästige Begonie. In sumpfigen Wäldern zu Caracas. Apr. — Aug. W. H. ♄.

4. *B. stipulacea.* Pers. l. c. Afterblättrige Begonie. —. März, Apr. W. H. ♄.

5. *B. acuminata.* Pers. l. c. Zugespitzte Begonie. Auf Bergen in Jamaica. Apr. — Aug. W. H. ♄.

6. *B. hirsuta.* Pers. l. c. Rauhe Begonie. Auf Felsen zu Gujana. März. — Aug. W. H. 2.

7. *B. discolor.* Hort. parisiensis. Zweyfarbige Begonie. —. Jun. — Sept. W. H. 2.

779. Amirola, Amirole.

1. *A. nitida.* Pers. l. c. 2. p. 565. Glänzende Amirole. In Peru. Jul. Ch. ♄.

780. Ailanthus, Götterbaum.

1. *A. glandulosa.* Pers. l. c. Drüsiger Götterbaum. In China. Jul. Im F. ♄.

781. Juglans, Wallnufs.

1. *J. regia.* Pers. l. c. 2. p. 566. Gemeine Wallnufs. In Persien. Apr. May. Im F. ♄.

2. *J. nigra.* Pers. l. c. Schwarze Wallnufs. In Pensylvan. u. Florida. May. Im F. ♄.

3. *J. cinerea.* Pers. l. c. Graue Wallnufs. Am Meeresstrande in Canada, Pensylvan. u. den Alleghanischen Bergen. May. Im F. ♄.

4. *J. alba.* Pers. l. c. Weifse Wallnufs. In Pensylvan. Virgin. u. Carolina. May, Im F. ♄.

782. Quercus, Eiche.

1. *Q. Phellos.* Pers. l. c. 2. p. 567. Weiden-Eiche. In Nordamer. —. Im F. ♄.

2. *Q. maritima.* Pers. l. c. Meeresstrands-Eiche. Am Meeresstrande in Carolina. —. K. H. ♄.

3. *Q. virens.* Pers. l. c. Grünende Eiche. In Virgin. am Meeresstrande u. gegen Florida zu. May. Im F. ♄.

4. *Q. Ilex.* Pers. l. c. 2. p. 568. Stein-Eiche. In Südeur. u. Nordafr. May. K. H. ♄.

5. *Q. Suber.* Pers. l. c. Kork-Eiche. In Südeur. u. Nordafr. May. K. H. ♄.

6. *Q. coccifera.* Pers. l. c. Kermes-Eiche. In Südeur. u. im Orient. —. K. H. ♄.

7. *Q. Prinus.* Pers. l. c. Castanienblättrige Eiche. In Pensylv. Carol. Virgin. u. Florida. —. Im F. ♄.

8. *Q. tinctoria.* Pers. l. c. Quercitronen-Eiche. In Pensylvan. u. auf hohen Bergen in Carolina u. Florida. —. Im F. ♄.

9. *Q. rubra.* Pers. l. c. Rothe Eiche. In Canada u. Carolina. —. Im F. ♄.

10. *Q. coccinea.* Pers. l. c. Scharlach-Eiche. In Virgin. u. Carol. —. Im F. ♄.

11. *Q. Aegilops.* Pers. l. c. 2. p. 570. Knopper-Eiche. In Span. u. im Orient. —. Im F. ♄.

12. *Q. alba.* Pers. l. c. Weifse Eiche. In Canada bis gegen Florida. —. Im F. ♄.

13. *Q. Robur.* Pers. l. c. Gemeine Eiche. In Eur. May. Im F. ♄.

14. *Q. pedunculata.* Pers. l. c. Stiel-Eiche. In Eur. May. Im F. ♄.

15. *Q. pubescens.* Pers. l. c. Weichhaarige Eiche. In Oesterr. Ungarn, der Krimm, in Frankr. u. England. May. Im F. ♄.

16. *Q. austriaca.* Pers. l. c. Oesterreichische Eiche. (Cerr-Eiche). In Oesterr. Ungarn. u. Krain. May. Im F. ♄.

783. Corylus, Haselnufs.

1. *C. Avellana.* Pers. l. c. Gemeine Haselnufs. In Eur. u. Asien. März. Im F. ♄.

2. *C. tubulosa.* Pers. l. c. Lamberts-Haselnufs. In Südeur. März. Im F. ♄.

3. *C. rostrata.* Pers. l. c. Geöhrte Haselnufs. In Canada u. Florida. März, Apr. Im F. ♄.

4. *C. colurna.* Pers. l. c. Byzantinische Haselnufs. Bey Constantinopel. März. Im F. ♄.

784. Fagus, Buche.

1. *F. sylvatica.* Pers. l. c. Roth-Buche. In Eur. May. Im F. ♄.

β. sanguinea. Mit blutrothen Blättern.
γ. asplenifolia. Mit Streifenfarrn Blättern.

785. Castanea, Castanie.

1. *C. vesca.* Pers. l. c. Aechte Castanie. In Südeur. Jun. Im F. ♄.
Fagus Castanea. Lin. sp. pl. 1416.

786. Betula, Birke.

1. *B. alba.* Pers. l. c. 2. p. 572. Weifse Birke. Im nördlicher. Eur. u. Asien. März, Apr. Im F. ♄.

β pendula. Mit hängenden Aesten.

2. *B. populifolia.* Pers. l. c. Pappel-Birke. In Nordamer. Apr. Im F. ♄.

3. *B. davurica.* Pers. l. c. Davurische Birke. In Ostsibirien u. Canada. Apr. Im F. ♄.

4. *B. nigra.* Pers. l. c. Schwarze Birke. In Canada u. Virgin. Apr. Im F. ♄.

5. *B. papyracea.* Pers. l. c. Papier-Birke. In Nordamer. Apr. Im F. ♄.

6. *B. lenta.* Pers. l. c. Zähe Birke. In Nordamer. Apr. Im F. ♄.

7. *B. nana.* Pers. l. c. Zwerg-Birke. Auf Alpen in Eur. May. Im F. ♄.

8. *B. fruticosa.* Pers. l. c. Strauchartige Birke. In Ostsibirien u. auf den Oesterreich. u. Bayer'schen Alpen. Apr. May. Im F. ♄.

9. *B. pumila.* Pers. l. c. Niedrige Birke. In Nordamer. Apr. May. Im F. ♄.

787. Carpinus, Hainbuche.

1. *C. Betulus.* Pers. l. c. Gemeine Hainbuche. In Hainen v. Eur. May. Im F. ♄.

2. *C. orientalis.* Pers. l. c. 2 p. 573. Orientalische Hainbuche. In Krain, Sclavon. dem Banat u. in Armenien. May. Im F. ♄.

788. Ostrya, Hopfenbuche.

1. *O. vulgaris.* Pers. l. c. Gemeine Hopfenbuche. In Südeur. May. Im F. ♄.
Carpinus Ostrya. Lin. sp. pl. p. 1417.

2. *O. virginica.* Pers. l. c. Virginische Hopfenbuche. In Pensylvan. Virgin. u. Carolina. May. Im F. ♄.
Carpinus virginiana. Ait. hort. kew. 3. p. 363.

789. Platanus, Platanus.

1. *Pl. orientalis.* Pers. l. c. Morgenländischer Platanus. Im Orient. May, Jun. Im F. ♄.

2. *Pl. acerifolia.* Pers. l. c. Ahornblättriger Platanus. Im Orient. May, Jun. Im F. ♄.

3. *Pl. occidentalis.* Pers. l. c. Abendländischer Platanus. In Nordamer. May, Jun. Im F. ♄.

790. Liquidambar, Amberbaum.

1. *L. Styraciflua.* Pers. l. c. Fliefsender Amberbaum. In Nordamer. März. Apr. Im F. ♄.

791. Salisburia, Salisburie.

1. *S. adiànthifolia.* Smith act. soc. lin. lond. 3. p. 330. Krullfarrenblättrige Salisburie. In Japan. — . Im F. ♄.
Ginkgo biloba. Pers. l. c.

792. Arum, Aron.

1. *A. Dracunculus.* Pers. l. c. 2. p. 574. Punctirter Aron. In Südeur. May, Jun. Im F. 4.

2. *A. Dracontium.* Pers. l. c. Vielblättriger Aron. In Nordamer. May, Jun. Im F. ♄.

3. *A. Colocasia.* Pers. l. c. Aegyptischer Aron. In Candien, Cypern, Syrien u. Aegypten. May, Jun. Ch. 4.

4. *A. divaricatum.* Pers. l. c. Ausgebreiteter Aron. In Ostind. Apr. — Aug. W. H. 4.

5. *A. maculatum.* Pers. l. c. Gemeiner Aron. Im südlicher. Eur. Apr. May. Im F. 4.

6. *A. Arisarum.* Pers. l. c. Kappenförmiger Aron. In Ital. Portug. Span. u. der Provence. Jun. K. H. 4.

7. *A.? pinnatum.* Hort. paris.

793. Caladium, Caladium.

1. *C. helleborifolium.* Pers. l. c. 2. p. 575. Christwurzblättriges Caladium. In Wäldern zu Martinique u. Caracas. Jun. Jul. W. H. 4.
Arum helleborifol. Jacq. ic. rar. 3. t. 613. Collect. 3. p. 217.

2. *C. pinnatifidum.* Pers. l. c. Halbgefieder tes Caladium. In schattigen Wäldern zu Caracas. März — Aug. W. H. ♄.
Arum pinnatifid. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 31. t. 187.

3. *C. bicolor.* Pers. l. c. Zweyfarbiges Caladium. in Brasilien. Jun. Jul. W. H. ♄.
Arum bicolor. Ait. hort. kew. 3. p. 316.

4. *C. sagittifolium.* Pers. l. c. Pfeilblättriges Caladium. In Brasilien, Jamaica u. zu Barbados. Jun. Jul. W. H. 2|.
Arum sagittifol. Lin. sp. pl. p. 1369.

5. *C. belophyllum.* Willd. enum. 2. p. 987. Wurfspiefsblättriges Caladium. —. —. W. H. ♄.

6. *C. sequinum.* Pers. l. c. Giftiges Caladium. Auf den Caraibischen Inseln an feuchten Stellen. Jun. Jul. W. H. ♄.
Arum sequinum. Lin. sp. pl. p. 1371.

7. *C. xanthorrhizon.* Pers. l. c. Gelbwurzliges Caladium. —. Apr. W. H. ♄.
Arum xanthorrh. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 32. t. 188.

8. *C. arborescens.* Pers. l. c. Baumartiges Caladium. In Westind. Jun. Jul. W. H. ♄.
Arum arboresc. Lin. sp. pl. p. 1371.

9. *C. grandifolium.* Pers. l. c. Grofsblättriges Caladium. Zu Caracas. Bl. den ganzen Sommer hindurch. W. H. ♄.
Arum grandifol. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 34. t. 189.

10. *C. lacerum.* Pers. l. c. Zerschlitztes Caladium. Zu Caracas u. Jamaica? Jun. Jul. W. H. ♄.
Arum lacerum. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 35. t. 468.

11. *C. tripartitum.* Pers. l. c. Dreytheiliges Caladium. Zu Caracas. May — Jul. W. H. ♄.
Arum tripartitum. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 33. t. 190.

12. *C. auritum.* Pers. l. c. Geöhrtes Caladium. In Jamaica, Hispaniola u. Caracas. Aug. — Oct. W. H. ♄.
Arum auritum. Lin. sp. pl. p. 1371.

794. Caryota, Brennpalme.

1. *C. urens.* Pers. l. c. 2. p. 576. Ostindische Brennpalme. In Ostind. —. W. H. ♄.

MONADELPHIA.

795. Pinus, Fichte.

1. *P. sylvestris.* Pers. l. c. 2. p. 578. Gemeine Fichte. (Weifs-Föhre). Im nördlicher. Eur. May. Im F. ♄.

2. *P. Pumilio.* Pers. l. c. Krummholz-Fichte. Auf den Oesterr. Salzb. Krainersch. Schlesischen Alpen u. den Carpathen. May, Jun. Im F. ♄.

3. *P. Laricio.* Pers. l. c. Korsische Fichte. In Corsica auf Bergen. —. K. H. ♄.

4. *P. Pinaster.* Pers. l. c. Italiänische Fichte. (Schwarz-Föhre). In Oesterr. u. Südeur. May, Jun. Im F. ♄.

5. *P. maritima.* Pers. l. c. Meerstrands-Fichte. Am Meerstrande in Südeur. May. K. H. ♄.

6. *P. Pinea.* Pers. l. c. Geniefsbare Fichte. (Pignole). In Ital. Südfrankr. u. Span. May. K.H. ♄.

7. *P. Taeda.* Pers. l. c. Dreynadlige Fichte In Virgin. u. Carol. May, Jun. Im F. ♄.

8. *P. Cembra.* Pers. l. c. Zirbel-Fichte. Auf Alpen in Südeur. u. Sibir. May. K. H. ♄.

9. *P. Strobus.* Pers. l. c. 2. p. 579. Weymuths-Fichte. In Virgin. u. Canada. May, Jun. Im F. ♄.

10. *P. Cedrus.* Pers. l. c. Ceder-Fichte. Auf dem Libanon, Taurus, u. Amanus. May, Jun. K. H. ♄.

11. *P. microcarpa.* Pers. l. c. Kleinfrüchtige Fichte. An der Hudsondsbay. May, Jun. Im F. ♄. P. laricina. Du Roi harbk. 2. p. 83.

12. *P. Larix.* Pers. l. c. Lerchen-Fichte. Auf Alpen im südlicher. Eur. May, Jun. Im F. ♄.

13. *P. Picea.* Pers. l. c. Tannen-Fichte (Gemeine Tanne). Auf Alpen u. Bergen in Eur. May, Jun. Im F. ♄.

14. *P. Balsamea.* Pers. l. c. Balsam-Fichte. In Virgin. u. Canada. May, Jun. Im F. ♄.

15. *P. alba.* Pers. l. c. Weifse Fichte. In Nordamer. May, Jun. Im F. ♄.
Pinus canadensis. Du Roi harbk. 2. p. 124.

16. *P. taxifolia.* Pers. l. c. Nootka-Fichte. An den östlichen Meeresküsten v. Nordamer. —. Im F. ♄.

17. *P. canadensis.* Pers. l. c. Hemlocks-Fichte. In Nordamer. May, Jun. Im F. ♄.
P. americana. Du Roi harbk. 2. p. 107.

18. *P. Abies.* Pers. l. c. Edel-Fichte. (Weifs-Tanne). Im nördlichen Eur. u. Asien. May, Jun. Im F. ♄.

796. Thuja, Lebensbaum.

1. *Th. occidentalis.* Pers. l. c. 2. p. 580. Gemeiner Lebensbaum. In Canada u. Sibirien. Apr. Im F. ♄.

2. *Th. orientalis.* Pers. l. c. Morgenländischer Lebensbaum. In China u. Japan. Apr. May. Im F. ♄.

797. Cupressus, Cypresse.

1. *C. sempervirens.* Pers. l. c. Gemeine Cypresse. In Candien, Ital. u. Span. Apr. K. H. ♄.

β. horizontalis. Mit wagerechten Aesten.

2. *C. disticha.* Pers. l. c. Zweyzeylige Cypresse. In Virgin. u. Carol. —. Im F. ♄.

3. *C. thyoides.* Pers. l. c. Weifse Cypresse. In Canada. —. Im F. ♄.

798. Podocarpus, Fufsfrucht.

1. *P. elongata.* Pers. l. c. Capische Fufsfrucht. Am Cap. —. Ch. ♄.
Taxus elongata. Ait. hort. kew. 3. p. 415.

799. Acalypha, Brennkraut.

1. *A. caroliniana.* Pers. l. c. Carolinisches Brennkraut. In Virgin. Florida u. Canada an Flüssen. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *A. cuspidata.* Pers. l. c. 2. p. 582. Zugespitztes Brennkraut. Zu Caracas. Aug. — Oct. W. H. ♄.

3. *A. diversifolia.* Pers. l. c. Verschiedenblättriges Brennkraut. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. ♄.

4. *A. virgata.* Pers. l. c. Ruthenförmiges Brennkraut. Im westlichen Jamaica. Jun. Jul. W. H. ♄.

5. *A. macrostachya.* Pers. l. c. Langähriges Brennkraut. Zu Caracas. Jul. Aug. W. H. ♄.

6. *A. polystachya.* Pers. l. c. 2. p. 583. Vielähriges Brennkraut. Aug. Sept. W. H. ☉.

7. *A. scabrosa.* Pers. l. c. Scharfes Brennkraut. Auf Kalkfelsen zu Jamaica. Jul. Aug. W. H. ♄.

800. Croton, Croton.

1. *Cr. pungens.* Pers. l. c. 2. p. 585. Stechendes Croton. Zu Caracas. Jul. Aug. W. H. ♄.

2. *Cr. pennicillatum.* Pers. l. c. Pinseldrüsiges Croton. Auf Cuba. Jul. — Oct. W. H. ♄.

3. *Cr. tomentosum.* Hort. paris. Filziges Croton. —. —. W. H. ♄.

4. *Cr. palmatum.* Hort. paris. Handförmiges Croton. —. —. W. H. ♄.

801. Aleurites, Aleurites.

1. *A. moluccana.* Pers. l. c. 2. p. 587. Moluckische Aleurites. Auf den Moluckischen Inseln u. auf Ceylon. —. W. H. ♄.
Jatropha moluccana. Lin. sp. pl. p. 1428.

802. Jatropha, Brechnufs.

1. *J. panduraefolia.* Pers. l. c. Geigenblättrige Brechnufs. Auf Cuba. Apr. — Aug. W. H. ♄.

2. *J. Curcas.* Pers. l. c. Schwarze Brechnufs. Im wärmer. Amer. —. W. H. ♄.

3. *J. multifida.* Pers. l. c. Vieltheilige Brechnufs. Im wärmeren Amer. Jun. Jul. W. H. ♄.

4. *J. napaeifolia.* Pers. l. c. Zerschlitztblättrige Brechnufs. Auf den Antillen. Jun. Jul. W. H. ♄.

803. Ricinus, Wunderbaum.

1. *R. communis.* Pers. l. c. Gemeiner Wunderbaum. In Ostind. Jul. Aug. Im F. ☉.

2. *R. viridis.* Pers. l. c. Grüner Wunderbaum. In Ostind. Jul. Aug. Im F. ☉.

3. *R. africanus.* Pers. l. c. Africanischer Wunderbaum. In Nordafr. Jul. Aug. Ch. ♄.

4. *R. inermis.* Pers. l. c. 2. p. 588. Glattfrüchtiger Wunderbaum. In Ostind. Jul. Aug. W. H. ♄.

804. Hura, Sandbüchsenbaum.

1. *H. crepitans.* Pers. l. c. Gemeiner Sandbüchsenbaum. In Mexico, Gujana u. Jamaica. Jul. Aug. W. H. ♄.

805. Hippomane, Mancinellenbaum.

1. *H. Mancinella.* Pers. l. c. 2. p. 589. Gemeiner Mancinellenbaum. März, Apr. W. H. ♄.

2. *H. biglandulosa.* Hort. paris. Zweydrüsiger Mancinellenbaum. —. —. W. H. ♄.

806. Phyllanthus, Blattblume.

1. *Ph. nutans.* Pers. l. c. 2. p. 590. Hängende Blattblume. An Flüssen in Südamer. May — Aug. W. H. ♄.

2. *Ph. acuminatus.* Pers. l. c. Zugespitzte Blattblume. Zu Cayenne. Apr. May. W. H. ♄.

3. *Ph. Niruri.* Pers. l. c. Weifse Blattblume. In Ostind. u. Südamer. Jun. — Aug. W. H. ☉.

4. *Ph. falcatus.* Pers. l. c. 2. p. 591. Sichelblättrige Blattblume. Auf den Bahamainseln. Jun. — Oct. W. H. ♄.
Xylophylla falcata. Swartz prodr. 28.

5. *Ph. Arbuscula.* Willd. enum. 2. p. 996. Baumartige Blattblume. In Jamaica. May — Aug. W. H. ♄.
Phyllanthus speciosus. Pers. l. c.

6. *Ph. Epiphyllanthus.* Lin. sp.pl. p. n. 1392. Schmalblättrige Blattblume. In Jamaica. Apr. — Oct. W. H. ♄.
Phyllanthus angustifolius. Pers. l. c.
Xylophylla angustifolia Swartz prodr. 28.

807. Xylophylla, Holzblatt.

1. *X. elongata.* Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 53. t. 348. Langblättriges Holzblatt. In Westind. Apr. — Oct. W. H. ♄.

2. *X. ramiflora.* Ait hort. kew. 1. p. 376. Winkelblättriges Holzblatt. In Sibirien. May — Jul. K. H. ♄.
Phyllanthus ramiflor. Pers. l. c.

3. *X. obovata.* Willd. enum. 2. p. 329. Verkehrteyförmiges Holzblatt. — . —. W. H. ♄.
Phyllanthus obovatus. Pers. l. c. 2. p. 589.

808. Heritiera, Heritiere.

1. *H. littoralis.* Pers. l. c. Ufer-Heritiere. Auf Ceylon. —. W. H. ♄.

809. Momordica, Balsamapfel.

1. *M. Balsamina.* Pers. l. c. 2. p. 592. Gemeiner Balsamapfel. In Ostind. Jun. W. H. ☉.

2. *M. Charantia.* Pers. l. c. Gurkenartiger Balsamapfel. In Ostind. Jun. W. H. ☉.

3. *M. cylindrica.* Pers. l. c. 2. p. 593. Walzenförmiger Balsamapfel. Auf Ceylon u. zu China. Jun. W. H. ☉.

4. *M. Elaterium.* Pers. l. c. Esels-Balsamapfel. In Südeur. Jun. Im F. ☉.

810. Cucurbita, Kürbis.

1. *C. lagenaria.* Pers. l. c. Flaschen-Kürbis. Im wärmer. Amer. an feuchten Stellen. Jun. Jul. Im F. ☉.

2. *C. Pepo.* Pers. l. c. Garten-Kürbis. Im Orient. Jun. Jul. Im F. ☉.

3. *C. verrucosa.* Pers. l. c. Warzen-Kürbis. —. Jun. Jul. Im F. ☉.

4. *C. Melopepo.* Pers. l. c. Turban-Kürbis. —. Jun. Jul. Im F. ☉.

5. *C. Citrullus.* Pers. l. c. Wassermelonen-Kürbis. In Apulien, Calabrien u. Sicilien. Jun. Jul. Im F. ☉.

811. Cucumis, Gurke.

1. *C. prophetarum.* Pers. l. c. 2. p. 594. Propheten-Kürbis. In Arabien u. Africa. Jun. Jul. Im F. ⊙.

2. *C. Anguria.* Pers. l. c. Fyförmige Gurke. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. ⊙.

3. *C. Melo.* Pers. l. c. Melonen-Gurke. In der Kalmückey. Jun. Jul. W. H. ⊙.

4. *C. Chate.* Pers. l. c. Arabische Gurke. In Arabien u. Aegypten. Jun. Jul. W. H. ⊙.

5. *C. anguinus.* Pers. l. c. Schlangen-Kürbis. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ⊙.

6. *C. sativus.* Pers. l. c. Gemeine Gurke. In der Tartarey u. Ostind. Jun. — Aug. Im F. ⊙.

812. Bryonia, Zaunrübe.

1. *Br. alba.* Pers. l. c. 2. p. 595. Schwarzbeerige Zaunrübe. In Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

2. *Br. dioica.* Pers. l. c. Rothbeerige Zaunrübe. In Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

3. *Br. dissecta.* Pers. l. c. Feinblättrige Zaunrübe. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 4.
Bryonia africana. Lin. sp. pl. p. 1438.

813. Sicyos, Haargurke.

1. *S. angulata.* Pers. l. c. Eckige Haargurke. In Canada u. Pensylvan. Jul. Im F. ⊙.

CLASSIS XXI.

DIOECIA.

MONANDRIA.

814. Pandanus, Pandanus.

1. *P. utilis.* Bory de St. Vincent itin. 2. p. 3. Nutzbarer Pandanus. Auf den Inseln Bourbon, Madagascar u. St. Moritz. —. W. H. ♄.
P. odoratissima. Jacq. fragm. bot. p. 21. n. 74. t. 13. et 14. f. 1.

2. *P. humilis.* Pers. l. c. 2. p. 597. Kleiner Pandanus. Auf der St. Moritzinsel u. den Molucken. —. W. H. ♄.

DIANDRIA.

815. Vallisneria, Vallisnerie.

1. *V. spiralis.* Pers. l. c. 2. p. 598. Spiralförmige Vallisnerie. In Wassergräben der Schweitz Italiens u. Südfrankreichs. Jul. Aug. K. H. 4.

816. Cecropia, Trompetenbaum.

1. *C. peltata.* Pers. l. c. Schildförmiger Trompetenbaum. In Wäldern des wärmer. Jamaica u. Surinam. —. W. H. ♄.

817. Fraxinus, Esche.

1. *Fr. excelsior.* Pers. l. c. 2. p. 604. Gemeine Esche. In Eur. May. Im F. ♄.

β. pendula. Mit hängenden Aesten.

γ. crispa. Mit krausen Blättern.

2. *Fr. aurea.* Willd. enum. 2. p. 1059. Goldfarbige Esche. —. May. Im F. ♄.
Fr. excelsior aurea. Pers. l. c.

3. *Fr. simplicifolia.* Willd. arb. 121. Einblättrige Esche. —. May. Im F. ♄.
Fr. excelsior simplicifolia. Pers. l. c.

4. *Fr. parvifolia.* Pers. l. c. Kleinblättrige Esche. Im Orient? May, Im F. ♄.

5. *Fr. americana.* Pers. l. c. Americanische Esche. May. Im F. ♄.

6. *Fr. juglandifolia.* Pers. l. c. Wallnufsblättrige Esche. In Nordamer. May, Im F. ♄.

7. *Fr. pubescens.* Pers. l. c. Weichhaarige Esche. In Pensylvan. May. Im F. ♄.
Fr. nigra. Du Roi harbk. ed. 2. t. p. 398.

8. *Fr. sambucifolia.* Pers. l. c. 2. p. 605. Hollunderblättrige Esche. In Canada u. Pensylvanien. May. Im F. ♄.

9. *Fr. caroliniana.* Pers. l. c. Carolinische Esche. In Carolina. May. Im F. ♄.

10. *Fr. rotundifolia.* Pers. l. c. Rundblättrige Esche. In Calabrien u. der Syrmier Gespannschaft in Sclavonien. May. Im F. ♄.

11. *Fr. Ornus.* Lin. sp. pl. p. 1510. Blühende Esche. In Südeur. May. Im F. ♄.
Ornus europaea. Pers. l. c. 1. p. 9.

818. Borya, Borya.

1. *B. acuminata.* Pers. l. c. Zugespitzte Borya. In Carolina u. Georgien. —. K. H. ♄.
Adelia acuminata. Mich. amer. 2. p. 225. t. 48.

TRIANDRIA.

819. Empetrum, Rauschbeere.

1. *E. nigrum.* Pers. l. c. Schwarze Rauschbeere. Auf Bergen in den kältesten Theilen Europa's. —. Im F. ♄.

820. Osyris, Osyris.

1. *O. alba.* Pers. l. c. 2. p. 606. Weifse Osyris. In Südeur. Jun. Jul. K. H. ♄.

821. Ficus, Feige.

1. *F. Carica.* Pers. l. c. 2. p. 608. Gemeine Feige. In Südeur. Asien u. Africa. Aug. — Oct. K. H. ♄.

2. *F. nymphaeifolia.* Pers. l. c. Seerosenblättrige Feige. Zu Caracas. —. W. H. ♄.

3. *F. populifolia.* Pers. l. c. Pappelblättrige Feige. Im glücklichen Arabien. —. W. H. ♄.

4. *F. religiosa.* Pers. l. c. Heilige Feige. In Ostind. März. Apr. W. H. ♄.

5. *F. bengalensis.* Pers. l. c. 2. p. 609. Bengalische Feige. In Ostind. Jun. — Aug. W. H. ♄.

6. *F. venosa.* Pers. l. c. Aderige Feige. In Ostind. ? Jul. — Sept. W. H. ♄.

7. *F. citrifolia.* Pers. l. c. Citronenblättrige Feige. In Ostind. —. W. H. ♄.

8. *F. martinicensis.* Pers. l. c. Martinikische Feige. In Westind. —. W. H. ♄.

9. *F. cordata.* Pers. l. c. Herzblättrige Feige. Am Cap. —. Ch. ♄.
F. capensis. Hortulan.

10. *F. glandulosa.* Hort. carlsruh. Drüsige Feige. —. Jul. Aug. W. H. ♄.

11. *F. australis.* Willd. sp. pl. 4. p. 1138. Südliche Feige. In Neuholl. —. Ch. ♄.
F. rubiginosa. Pers. l. c.

12. *F. stipulata.* Thunb. diss. de Ficub. n. 7. Kletternde Feige. In China u. Japan. Nov. Dec. W. H. ♄,
F. scandens. Pers. l. c.

13. *F. glaucophylla.* Pers. l. c. 2. p. 610. Graublättrige Feige. —. —. W. H. ♄.

14. *F. benjamina.* Pers. l. c. Benjamin-Feige. In Ostind. —. W. H. ♄.

15. *F. pertusa.* Pers. l. c. Durchlöcherte Feige. In Surinam. —. W. H. ♄.

16. *F. terebrata.* Pers. l. c. Durchbohrte Feige. Auf der St. Moritzinsel. u. in Ostind. —. W. H. ♄.

17. *F. nitida.* Pers. l. c. Glänzende Feige. In Ostind. —. W. H. ♄.

18. *F. racemosa.* Pers. l. c. Traubige Feige. In Ostind. —. W. H. ♄.

19. *F. mauritiana.* Pers. l. c. 2. p. 611. Erd-Feige. Auf der St. Moritzinsel u. Bourbon. —. W. H. ♄.
F. terragena. Bory de St. Vincent itin. 2. p. 143.

20. *F. oppositifolia.* Roxb. fl. corom. 2. p. 14. t. 124. Paarblättrige Feige. In Ostind. Jun. — Aug. W. H. ♄.
F. scabra. Pers. l. c.

TETRANDRIA.

822. Broussonetia, Broussonetie.

1. *Br. papyrifera.* Pers. l. c. 2. p. 612. Papiergebende Broussonetie. In Japan u. den Inseln des stillen Meeres. May. Im F. ♄.
Morus papyrifera. Lin. sp. pl. p. 1399.

823. Anthospermum, Amberstrauch.

1. *A. aethiopicum.* Pers. l. c. Gewöhnlicher Amberstrauch. Am Cap. —. Ch. ♄.

824. Viscum, Mistel.

1. *V. album.* Pers. l. c, 2. p. 613. Weiſse Mistel. In Eur. schmarotzend auf Bäumen. März, Apr. Im F. ♄.

825. Brucea, Brucea.

1. *Br. ferruginea.* Pers. l. c. 2. p. 614. Braune Brucea. In Abyssinien. Febr. März. W. H. ♄.

826. Hippophaë, Sanddorn.

1. *H. Rhamnoides.* Pers. l. c. Weidenblättriger Sanddorn. Am Meeresstrande in Nord- u. auf Felsen in Südeuropa. May, Jun. Im F. ♄.

2. *H. canadensis.* Pers. l. c. Canadischer Sanddorn. In Canada. Jun. Im F. ♄.

827. Myrica, Gagel.

1. *M. Gale.* Pers. l. c. Gemeiner Gagel. In Südeur. u. Nordamer. May. Im F. ♄.

2. *M. cerifera.* Pers. l. c. Wachsgebender Gagel. In Pensylvan. u. Carolina. Jul. — Sept. K. H. ♄.

3. *M. carolinensis.* Pers. l. c. Carolinischer Gagel. Am Meeresstrande in Pensylvan. u. Florida. —. K. H. ♄.
M. pensylvanica. Duham. arb. 2. p. 190. t. 52.

4. *M. Faya.* Pers. l. c. Azorischer Gagel. In Portugall, Madera u. den Azorischen Inseln. Jun. — Aug. K. H. ♄.

5. *M. segregata.* Pers. l. c. Lanzettblättriger Gagel. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. Ch. ♄.

6. *M. serrata.* Pers. l. c. Gesägter Gagel. Am Cap. —. Ch. ♄.
M. banksiaefolia. Wendl. collect. pl. 1. p. 70. t. 24.

7. *M. laciniata.* Willd. enum. 2. p. 1012. Schlitzblättriger Gagel. Am Cap. —. Ch. ♄.
M. quercifolia. Jacq. fragm. bot. p. 2. n. 7. t. 1. f. 4.

8. *M. quercifolia.* Pers. l. c. Eichenblättriger Gagel. Am Cap. Apr. May. Ch. ♄.

9. *M. cordifolia.* Pers. l. c. [Herzblättriger Gagel. Am Cap. —. Ch. ♄.

PENTANDRIA.

828. Pistacia, Pistacie.

1. *P. vera.* Pers. l. c. 2. p. 615. Aechte Pistacie. In Persien, Arabien, Syrien u. Indien. Jun. Jul. K. H. ♄.

2. *P. Terebinthus.* Pers. l. c. Terpentin-Pistacie. In Südeur. u. Nordasien. May, Jun. K.H. ♄.

3. *P. Lentiscus.* Pers. l. c. Mastix-Pistacie. In Portugall, Spanien, Ital. u. Persien. May, Jun. K. H. ♄.

829. Zanthoxylum, Zahnwehholz.

1. *Z. fraxineum.* Pers. l. c. Eschenblättriges Zahnwehholz. In Canada, Pensylvan. u. Virgin. May. Im F. ♄.

830. Picramnia, Bitterstrauch.

1. *P. Antidesma.* Pers. l. c. 2. p. 617. Langtraubiger Bitterstrauch. In Jamaica u. Hispaniola. —. W. H. ♄.

831. Antidesma, Giftstiller.

1. *A. alexiteria.* Pers. l. c. Glänzender Giftstiller. In Ostind. —. W. H. ♄.

832. Humulus, Hopfen.

1. *H. Lupulus.* Pers. l. c. 2. p. 618. Gemeiner Hopfen. In Eur. u. Nordamer. May. Im F. 4.

833. Ceratonia, Johannisbrodbaum.

1. *C. Siliqua.* Pers. l. c. Gemeiner Johannisbrodbaum. In Apulien, Sicilien, Candien, Cypern, Syrien, Palästina u. im ganzen Orient. Jul. Aug. K. H. ♄.

HEXANDRIA.

834. Smilax, Smilax.

1. *Sm. aspera.* Pers. l. c. Stachelblättriger Smilax. In Ital Span. Palästina u. Virginien. Aug. Sept. K. H. ♄.

2. *Sm. Sarsaparilla.* Pers. l. c. 2. p. 619. Sarsaparillen-Smilax. In Virgin. —. K. H. ♄.

3. *Sm. rotundifolia.* Pers. l. c. Rundblättriger Smilax. In Canada u. Pensylvan. März, Apr. K. H. ♄.

4. *Sm. tamnoides.* Pers. l. c. Schmeerwurzartiger Smilax. In Carolina, Virgin. u. Pensylvan. Jul. Aug. K. H. ♄.

835. Dioscorea, Yamswurzel.

1. *D. bulbifera.* Pers. l. c. 2. p. 621. Knollentragende Yamswurzel. In Ostind. Jun. W. H. 4.

2. *D. villosa.* Pers. l. c. Feinbehaarte Yamswurzel. In Virgin. Florida u. Canada. Jul. Aug. K. H. 4.

836. Phoenix, Dattelpalme.

1. *Ph. dactylifera.* Pers. l. c. 2. p. 622. Gemeine Dattelpalme. In der Barbarey, Aegypt. Syrien, Persien u. Ostind. Jul. Aug. W. H. ♄.

2. *Ph. reclinata.* Pers. l. c. Schlaffe Dattelpalme. In den inneren Gegenden am Cap. — W. H. ♄.

837. Gleditschia, Gleditschie.

1. *Gl. triacanthos.* Pers. l. c. 2. p. 623. Dreydornige Gleditschie. Auf den Alleghanischen Bergen in Nordamerica. Jun. Jul. Im F. ♄.

β inermis. Mit stachellosem Stamme.

2. *Gl. monosperma.* Pers. l. c. Einsamige Gleditschie. In Carolina, Georgien u. Florida. Jun. Jul. Im F. ♄.

3. *Gl. horrida.* Pers. l. c. Langdornige Gleditschie. In China. Jun. Jul. Im F. ♄.

OCTANDRIA.

838. Populus, Pappel.

1. *P. alba.* Pers. l. c. Silber-Pappel. In Schweden, England, Frankr. Deutschl. u. Italien. März. Apr. Im F. ♄.

2. *P. tremula.* Pers. l. c. Zitter-Pappel. In Eur. März. Apr. Im F. ♄.

3. *P. laevigata.* Pers. l. c. Glatte Pappel. In Nordamer. März. Apr. Im F. ♄.

4. *P. graeca.* Pers. l. c. Griechische Pappel. Auf den Archipelagischen Inseln. März. Apr. Im F. ♄.

5. *P. nigra.* Pers. l. c. Schwarze Pappel. In Mitteleur. März, Apr. Im F. ♄.

6. *P. dilatata.* Ait. hort. kew. 3. p. 406. Lombardische Pappel. In Italien. —. Im F. ♄.
P. fastigiata. Pers. l. c.

7. *P. monilifera.* Pers. l. c. Canadische Pappel. In Canada u. Pensylvan. —. Im F. ♄.

8. *P. angulata.* Pers. l. c. 2. p. 624. Eckige Pappel. In Pensylvan. Virgin. u. Carolina. —. Im F. ♄.

9. *P. balsamifera.* Pers. l. c. Balsam-Pappel. In Nordamer. u. Sibirien. —. Im F. ♄.
P. Tacamahaca. Mill. dict. n. 6.

839. Diospyros, Dattelpflaume.

1. *D. Lotus.* Pers. l. c. Italienische Dattelpflaume. In Languedoc Ital. u. Mauritanien. May, Jun. K. H. ♄.

2. *D. virginiana.* Pers. l. c. Virginische Dattelpflaume. In Nordamer. May, Jun. Im F. ♄.

3. *D. Ebenum.* Pers. l. c. Ebenholz-Dattelpflaume. In Wäldern auf Ceylon. —. W. H. ♄.

4. *D. Kaki.* Pers. l. c. Japanische Dattelpflaume. In Japan. —. Ch. ♄.

ENNEANDRIA.

840. Triplaris, Dreyling.

1. *Tr. americana.* Pers. l. c. 2. p. 626. Americanischer Dreyling. In Wäldern zu Carthagena u. Gujana. —. W. H. ♄.

DODECANDRIA.

841. Carica, Melonenbaum.

1. *C. Papaya.* Pers. l. c. Gemeiner Melonenbaum. In Ostind. May — . Aug. W. H. ♄.

2. *C. cauliflora.* Pers. l. c. Stammblüthiger Melonenbaum. Zu Caracas. Apr. — Oct. W. H. ♄.

3. *C. microcarpa.* Pers. l. c. Kleinfrüchtiger Melonenbaum. Zu Caracas u. Chili. Apr. — Oct. W. H. ♄.

4. *C. citriformis.* Jacq. eclog. fasc. 7. p. 101. n. 68. 69. Citronenartiger Melonenbaum. In Guinea. Jul. Aug. W. H. ♄.

5. *C. monoica.* Pers. l. c. Einhäusiger Melonenbaum. — . Febr. März. W. H. ♄.

842. Gymnocladus, Chicot.

1. *G. canadensis.* Pers. l. c. Canadischer Chicot. In Canada. May, Jun. Im F. ♄.
Guilandina dioica. Lin. sp pl. p. 546.

843. Kiggellaria, Kigellarie.

1. *K. africana.* Pers. l. c. Gesägte Kiggellarie. Am Cap. Jul. — Sept. Ch. ♄.

844. Schinus, Molle.

1. *Sch. Molle.* Pers. l. c. Hängender Molle. In Brasilien u. Peru. — . Ch. ♄.

845. Coriaria, Gerberstrauch.

1. *C. myrtifolia.* Pers. l. c. Myrthenblättriger Gerberstrauch. In Südfrankr. Spanien u. der Barbarey. Jul. Aug. Im F. 4.

DODECANDRIA.

846. Stratiotes, Siggel.

1. *St. Aloides.* Pers. l. c. 2. p. 627. Aloeartige Siggel. In reinen stillen Wässern des nördlicheren Eur. Jun. Jul. Im F. 4.

847. Euclea, Euclea.

1. *E. racemosa.* Pers. l. c. Traubenförmige Euclea. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♄.

848. Datisca, Strickkraut.

1. *D. cannabina.* Pers. l. c. Hanfartiges Strickkraut. In Candien. Jun. Jul. Im F. 4.

849. Menispermum, Mondsame.

1. *M. canadense.* Pers. l. c. Canadischer Mondsame. In Virgin. u. Canada. Jun. Jul. Im F. ♄.

2. *M. carolinum.* Pers. l. c. Carolinischer Mondsame. In Nordamer. —. K. H. ♄.

ICOSANDRIA.

850. Flacourtia, Flacourtie.

1. *Fl. Ramontchi.* Pers. l. c. 1. p. 628. Genießbare Flacourtie. Zu Madagascar. —. W. H. ♄.

POLYANDRIA.

851. Cliffortia, Cliffortie.

1. *Cl. ilicifolia.* Pers. l. c. 2. p. 629. Hülsenblättrige Cliffortie. Am Cap. May — Aug. Ch. ♄.

852. Cycas, Sagopalme.

1. *C. circinalis.* Pers. l. c. 2. p. 631. Gemeine Sagopalme. In Ostind. —. W. H. ♄.

2. *C. revoluta.* Pers. l. c. Zurückgerollte Sagopalme. In Japan u. China. —. W. H. ♄.

853. Zamia, Keulpalme.

1. *Z. media.* Pers. l. c. Mittlere Keulpalme. In Westind. Febr. — May. W. H. ♄.

2. *Z. integrifolia.* Pers. l. c. Ganzblättrige Keulpalme. In St. Domingo u. Ostflorida. Apr. May. W. H. ♄.

3. *Z. longifolia.* Pers. l. c. Langblättrige Keulpalme. In den innern Gegenden am Cap. Jun. Jul. W. H. ♄.

4. *Z. lanuginosa.* Pers. l. c. Wollige Keulpalme. In den innern Gegenden am Cap. —. W. H. ♄.

5. *Z. horrida.* Pers. l. c. Graublättrige Keulpalme. In den innern Gegenden am Cap. —. W. H. ♄.

MONADELPHIA.

854. Latania, Sammetpalme.

1. *L. rubra.* Pers. l. c. Rothe Sammetpalme. Auf der St. Moritzinsel. —. W. H. ♄.

2. *L. chinensis.* Jacq. fragm. bot. 1. p. 16. n. 58. t. 11. f. 1. Chinesische Sammetpalme. In China; cultivirt auf den Inseln Bourbon u. St. Moritz. —. W. H. ♄.
L. borbonica. Pers. l. c.

855. Juniperus, Wachholder.

1. *J. Sabina.* Pers. l. c. 2. p. 632. Stinkender Wachholder. In Portugall, Ital. u. Sibirien. May, Jun. Im F. ♄.

2. *J. prostrata.* Pers. l. c. Niederliegender Wachholder. In Nordamer. —. K. H. ♄.

3. *J. virginiana.* Pers. l. c. Virginischer Wachholder. In Virgin. u. Carolina. Apr. May. Im F. ♄.

4. *J. communis.* Pers. l. c. Gemeiner Wachholder. In Wäldern des nördlicher. Eur. Apr. Im F. ♄.

5. *J. Oxycedrus.* Pers. l. c. Spanischer Wachholder. In Span. Languedoc u. Griechenland. May. Im F. ♄.

6. *J. tamariscifolia.* Cat. hort. bot. monachiens. p. 28. Tamariskenblättriger Wachholder. — —. K. H. ♄.

7. *J. phoenicea.* Pers. l. c. Dichtnadliger Wachholder. In Südeur. u. im Orient. —. K. H. ♄.

856. Taxus, Taxus.

1. *T. baccata.* Pers. l. c. Gemeiner Taxus. In Eur. u. Sibirien. März. Im F. ♄.
β. foliis variegatis. Mit gefleckten Blättern.

857. Ephedra, Meerträubel.

1. *E. distachya.* Pers. l. c. 2. p. 683. Europäischer Meerträubel. In Südfrankr. Span. u. der Barbarey. Jun. Jul. K. H. ♄.

2. *E. monostachya.* Pers. l. c. Sibirischer Meerträubel. In Sibirien u. Ungarn auf trockenen sonnigen Bergen. Jun. Jul. K. H. ♄.

858. Cissampelos, Grieswurz.

1. *C. smilacina.* Pers. l. c. 2. p. 634. Eckige Grieswurz. In Carolina. —. K. H. ♄.

859. Adelia, Adelie.

1. *A. Acidoton.* Pers. l. c. 2. p. 635. Dornige Adelie. In Jamaica. —. W. H. ♄.

2. *A. ovata.* Pers. l. c. Eyförmige Adelie. In Nordamer. —. K. H. ♄.

3. *A. myrtifolia.* Catal. hort. carlsruhan. p. 5. Myrthenblättrige Adelie. In Nordamer. —. K. H. ♄.

860. Ruscus, Mäusedorn.

1. *R. aculeatus.* Pers. l. c. 2. p. 636. Stechender Mäusedorn. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ♄.

2. *R. Hypophyllum.* Pers. l. c. Breitblättriger Mäusedorn. An den Rändern der Hügel in Italien. Jun. Jul. K. H. 24.

3. *Hypoglossum.* Pers. l. c. Zungen-Mäusedorn. Auf Bergen in Ungarn u. dem Genuesischen. Jun. Jul. K. H. 24.

4. *R. racemosus.* Pers. l. c. Trauben-Mäusedorn. Auf den Archipelagischen Inseln. Jun. Jul. K. H. ♄.

GYNANDRIA.

861. Cluytia, Cluytie.

1. *Cl. daphnoides.* Pers. l. c. Seidelbastblättrige Cluytie. Am Cap. —. Ch. ♄.

2. *Cl. polifolia.* Pers. l. c. Poleyblättrige Cluytie. Am Cap. März — Aug. Ch. ♄.

3. *Cl. pulchella.* Pers. l. c. Gemeine Cluytie. Am Cap. Febr. — Aug. Ch. ♄.

CLASSIS XXII.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

862. Acrostichum, Staubfarrn.

1. *A. calomelanos.* Lin. sp. pl. p. 1529. Schwarzstrunkiger Staubfarrn. Zu Jamaica, Hispaniola u. Gujana. W. H. 24.

863. Hemionitis, Netzfarrn.

1. *H. dealbata.* Willd. hort. berol. 1. p. 40. t. 40. Weifsblättriger Netzfarrn. In Südamer. Jamaica, Peru u. Chili. W. H. 24.

864. Polypodium, Engelsüfs.

1. *P. crassifolium.* Lin. sp. pl. p. 1543. Dickblättriger Engelsüfs. In Jamaica, Hispaniola u. zu Lima. W. H. 24.

2. *P. phymatodes.* Lin. mant. 306. Warziger Engelsüfs. In Ostind. W. H. 24.

3. *P. aureum.* Lin. sp. pl. p. 1546. Goldner Engelsüfs. In Westind. W. H. 24.

4. *P. vulgare.* Lin. sp. pl. p. 1544. Gemeiner Engelsüfs. In Eur. u. Nordamer. zwischen Felsenritzen u. auf Bäumen. Im F. 24.

β. cambricum. Mit geschlitzten Lappen.

5. *P. Phegopteris.* Lin. sp. pl. p. 1550. Buchen-Engelsüfs. In Wäldern v. Eur. Im F. 24.

865. Aspidium, Wurmfarrn.

1. *A. trifoliatum.* Swartz synops. filic. 43. Gedreiter Wurmfarrn. In Hispaniola, Jamaica u. Martinique. W. H. 24.
Polypodium trifoliatum. Lin. sp. pl. p. 1547.

2. *A. Lonchitis.* Swartz l. c. Buchtenfarrnartiger Wurmfarrn. Auf Alpen u. Bergen in Schweden, Norwegen, der Schweiz, Ital. England u. Frankr. Im F. 24.
Polypodium Lonchitis. Lin. sp. pl. p. 1548.

3. *A. molle.* Swartz l. c. 49. Weicher Wurmfarrn. In Caracas. W. H. 24.
Polypodium molle. Jacq. ic. rar. 3. t. 640. Collect. 3. p. 188.

4. *A. aculeatum.* Swartz l. c. 53. Stachliger Wurmfarrn. Auf Bergen v. Eur. Nordafr. u. am Cap. Im F. 4.
Polypodium aculeat. Lin. sp. pl. p. 1552.

5. *A. Filix* mas. Swartz l. c. 55. Gebräuchliger Wurmfarrn. In Eur. Nordasien u. Nordafr. Im F. 4.
Polypodium Filix mas. Lin. sp. pl. p. 1551.

6. *A. bulbiferum.* Swartz l. c. 29. Zwiebeltragender Wurmfarrn. In Canada. K. H. 4.
Polypodium bulbiferum. Lin. sp. pl. p. 1553.

7. *A. Filix* femina. Swartz l. c. 59. Falscher Wurmfarrn. In Eur. Im F. 4.
Polypodium Filix femina. Lin. sp. pl. p. 1551.

8. *A. fragile.* Swartz l. c. 58. Zerbrechliger Wurmfarrn. In Eur. K. H. 4.
Polypodium fragile. Lin. sp. pl. p. 1553.

Nebst einer noch unbestimmten Wurmfarrnart.

866. Struthiopteris, Straufsfarrn.

1. *St. germanica.* Willd. enum. 2. p. 1071. Deutscher Straufsfarrn. In Deutschl. Ungarn, der Schweiz, Rufsland u. der Insel Seeland bey Norwegen. Im F. 4.
Osmunda Struthiopt. Lin. sp. pl. p. 1522.
Onoclea Struthiopt. Swartz synops. filic. 111.

867. Asplenium, Streifenfarrn.

1. *A. septentrionale.* Swartz l. c. 75. Nördlicher Streifenfarrn. In Felsenritzen v. Eur. Im F. 4.

2. *A. marinum.* Lin. sp. pl. p. 1540. Meerstrands-Streifenfarrn. Auf Meeresfelsen in England, Spanien, der Barbarey u. den Canarischen Inseln. K. H. 24.

3. *A. Trichomanes.* Lin. l. c. Wiederthon-Streifenfarrn. In Felsenritzen v. Eur. u. dem Orient. Im F. 24.

4. *A. viride.* Swartz l. c. 80. Grünstrunkiger Streifenfarrn. Auf Felsen in Deutschl. Oesterr. Salzb. der Schweiz, England. u. Frankr. Im F. 24.

5. *A. praemorsum.* Swartz prod. 13. Abgebissener Streifenfarrn. Auf waldigen Bergen in Jamaica u. Caracas. W. H. 24.

6. *A. Ruta muraria.* Lin. sp. pl. p. 1541. Mauer-Streifenfarrn. Auf Mauern u. Felsen in Eur. Im F. 24.

7. *A. Adiantum nigrum.* Lin. sp. pl. p. 1541. Schwarzer Streifenfarrn. In Felsenritzen v. Deutschl. der Schweiz, Ital. Frankr. Engl. u. Spanien. Im F. 24.

868. Scolopendrium, Hirschzunge.

1. *Sc. officinarum.* Swartz synops. filic. 89. Gemeine Hirschzunge. An schattigen Oertern in Eur. Im F. 24.
Asplenium Scolopendrium. Lin. sp. pl. p. 1537.
β. dedaleum. Mit verworrenen Blättern.

869. Pteris, Saumfarrn.

1. *Pt. longifolia.* Lin. sp. pl. p. 1531. Langblättriger Saumfarrn. In Jamaica u. Hispaniola. W. H. 24.

2. *Pt. serrulata.* Lin. suppl. 443. Gesägter Saumfarrn. In Japan, China u. Ceylon. W. H. 24.

3. *Pt. cretica.* Lin. mant. 130. Candischer Saumfarrn. In der Schweiz, Ital. Corsica, Candien u. Arabien. K. H. 24.

4. *Pt. atropurpurea.* Lin. sp. pl. p. 1534. Schwarzrother Saumfarrn. In Pensylvan. Virgin. u. Carolina. K. H. 24.

5. *Pt. aquilina.* Lin. sp. pl. p. 1533. Adler-Saumfarrn. Auf waldigen Bergen im nördlicher. Eur. Asien- u. America. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *Pt. elegans.* Jacq. fragm. bot. p. 74. n. 233. t. 116. Schöner Saumfarrn. Am Cap. Ch. 24.

870. Blechnum, Rippenfarrn.

1. *Bl. boreale.* Swartz synops. filic. 115. Nördlicher Rippenfarrn. An feuchten Stellen in Nord- u. auf Alpen im südlicher. Eur. ingleichen auf den Canarischen Inseln. Im F. 24.
Osmunda Spicant. Lin. sp. pl. 1522.

2. *Bl. occidentale.* Lin. l. c. 1534. Westlicher Rippenfarrn. In Westind. u. andern Gegenden des wärmer. Amer. W. H. 24.

871. Woodwardia, Woodwardie.

1. *W. radicans.* Swartz synops. filic. 117. Wurzelnde Woodwardie. In Ital. Portugall, zu Madera u. Teneriffa K. H. 24.
Blechnum radicans. Lin. mant. 307.

872. Adiantum, Krullfarrn.

1. *A. reniforme.* Lin. sp. pl. p. 1556. Nierenförmiger Krullfarrn. Zu Madera u. Teneriffa. K. H. 24.

2. *A. pedatum.* Lin. sp. pl. p. 1557. Fufsförmiger Krullfarrn. In Canada, Virgin. u. Pensylvan. K. H. 24.

3. *A. Capillus veneris.* Lin. sp. pl. p. 1558. Frauenhaar-Krullfarrn. Auf Felsen in Oesterr. Bayern, der Schweiz, Ital. Engl. Span. Frankr. Teneriffa, Jamaica, Südamer. u. Bourbon. K. H. 24.

873. Davallia, Davallie.

1. *D. canariensis.* Swartz synops. filic. 134. Canarische Davallie. Auf den Canarischen Inseln u. in Portugall. K. H. 24.
Trichomanes canariense. Lin. sp. pl. p. 1562.

REGISTER.

A.

	Seite
Abroma	268
Abrus	287
Acacia	278
Acalypha	351
Acanthus	248
Acer	136
Achania	276
Achillea	322
Achimenes sieh Trevirana	
Achyranthes	74
Aconitum	214
Acorus	127
Acrostichum	372
Actaea	206
Acynos sieh Thymus	
Adelia	371
Adenanthera	149
Adiantum	377
Adonis	222
Aegiphila	32
Aegopodium	91
Aeschynomene	292
Aesculus	133
Aethusa	89
Agapanthus	106
Agathosma	70
Agave	125
Ageratum	302
Agrimonia	170
Agrostemma	166
Ailanthus	343
Albuca	110
Aletris	119
Aleurites	352
Allamanda	76
Allium	108
Alnus	338
Aloë	122
Aloisia sieh Verbena	
Alpinia	3
Alstroemeria	126
Althaea	271
Alyssum	250
Amaranthus	341
Amaryllis	106
Ambrosia	341

	Seite
Amirola	342
Amomum	2
Amorpha	286
Amygdalus	182
Amyris	136
Anagallis	46
Anagyris	146
Anchusa	39
Andrewsia sieh Pogonia	
Andromeda	153
Andropogon	28
Androsace	43
Andryala	298
Anemone	219
Anethum	90
Angelica	89
Anigosanthos	106
Annona	218
Anredera	86
Anthemis	322
Anthericum	113
Antholyza	19
Anthospermum	361
Anthyllis	286
Antidesma	363
Antirrhinum	240
Apicra	120
Apium	91
Apocynum	78
Aponogeton	131
Aquilegia	215
Aralia	96
Arbutus	153
Arctotheca	332
Arctotis	330
Ardisia	64
Arduina	76
Arenaria	160
Argemone	207
Aris[illegible]hia	335
Aristotelia	170
Armeniaca sieh Prunus	
Armeria	96
Arnica	317
Arnopogon	296
Aronia sieh Mespilus et Pyrus	
Artemisia	305
Arum	347
Arundo	27
Asarum	168
Asclepias	78
Asparagus	114
Asphodelus	113
Aspidium	373
Asplenium	374
Aster	311
Astragalus	294
Astrantia	87
Athamanta	88
Athanasia	304
Atractylis sieh Berckheya	
Atragene	219
Atraphaxis	129
Atriplex	84
Atropa	58
Aucuba	337
Averhoa sieh Cicca	
Axyris — Diotis	
Azalea	54
Azima sieh Monetia	

B.

	Seite
Baccharis	308
Bactyrilobium	148
Balsamita	305
Bambos sieh Bambusa	
Bambusa	129
Banisteria	161
Banksia	29
Barleria	248
Bartsia	239
Basella	95
Bauhinia	146
Begonia	342
Bellis	320
Berberis	127
Berckheya	328
Besleria	244
Beta	85
Betonica	229
Betula	345
Bidens	300
Bignonia	245
Billardiera	70
Biscutella	250
Bistropogon	227
Bixa	208
Blechnum	376
Blitum	4
Bocconia	168
Boehmeria	340
Boerhaavia	17
Boltonia	322
Bombax	269
Bonapartea	109
Bonplandia sieh Caldasia	
Bontia	244
Borago	41
Borya	359
Bosea	86
Bromelia	101
Broussonetia	361
Browallia	244
Brownea	268
Brucea	361
Brunia	69
Brunsfelsia	245
Bryonia	356
Bubon	89
Bubroma sieh Guazuma	
Buchnera sieh Manulea	
Buddleja	32
Bulbine	113
Bumelia	66
Buphthalmum	324
Bupleurum	87
Butomus	145
Buttneria	75
Buxus	338

C.

	Seite
Cacalia	300
Cactus	174
Caesalpinia	148
Caladium	347
Calanchoë	143

	Seite
Caldasia	50
Calendula	330
Calla	133
Callicarpa	32
Calomeria sieh Humea	
Caltha	224
Calycanthus	205
Camellia	277
Campanula	50
Camphorosma	36
Canarina	128
Canella	168
Canna	1
Cantua sieh Vestia	
Capparis	205
Capraria	244
Capsicum	62
Carduus	299
Carica	367
Carissa sieh Arduina	
Carlowizia	299
Carolinea	269
Carpinus	346
Carthamus	298
Carum	91
Caryota	349
Cassia	147
Cassine	94
Castanea	345
Casuarina	336
Catananche	298
Cathartocarpus sieh Bactyrilobium	
Caucalis	87
Ceanothus	68
Cecropia	357
Cedrela	70
Celastrus	68
Celosia	74
Celsia	242
Celtis	84
Centaurea	328
Cephalanthus	30
Ceratonia	364
Ceratospermum sieh Diotis	
Cerbera	76
Cercis	146
Ceresia	26
Cerinthe	40
Cestrum	62
Chaerophyllum	90
Chamaerops	131
Cheiranthus	251
Chelidonium	206
Chelone	245
Chenopodium	85
Chionanthus	7
Chironia	82
Chloranthus	36
Chloris	26
Chrysanthemum	320
Chrysocoma	303
Chrysophyllum	65
Cicca	338
Cineraria	310
Cissampelos	371
Cissus	33
Cistus	211
Citharexylum	236
Citrus	210
Clayfonia	72
Clematis	220

	Seite
Cleome	128
Clerodendrum	238
Clethra	154
Cliffortia	369
Clusia	209
Cluytia	372
Cneorum	18
Cnicus	299
Cobaea	49
Coccoloba	141
Coffea	54
Coix	337
Colchicum	131
Collinsonia	15
Colutea	291
Commelina	25
Comptonia	337
Condalia	67
Conium	87
Convallaria	116
Convolvulus	47
Conyza	308
Corchorus	209
Cordia	42
Coreopsis	327
Coriaria	368
Cornus	34
Cornutia	237
Coronilla	292
Correa	137
Cortusa	44
Corydalis	282
Corylus	344
Corypha	127
Cosmea	326
Cosmus sieh Cosmea	
Costus	2
Cotula sieh Lidbeckia	
Cotyledon	161
Crambe	249
Crassula	99
Crataegus sieh Mespilus	
Cremastostemon	47
Crepis	298
Crescentia	245
Crinum	105
Crithmum	88
Crocus	19
Crotalaria	283
Croton	352
Cucubalus	158
Cucumis	356
Cucurbita	355
Cunila sieh Westeringia	
Cupressus	351
Curcuma	3
Cussonia	86
Cycas	369
Cyclamen	45
Cydonia	189
Cymbidium	334
Cynanchum	78
Cynoglossum	39
Cynosurus sieh Eleusine	
Cyperus	25
Cypripedium	335
Cyrilla sieh Trevirana	
Cyrtanthus	106
Cytisus	289

D

	Seite
Dahlia sieh Georgina	
Daphne	139
Datisca	368
Datura	57
Davallia	377
Decumaria	168
Delphinium	214
Dentaria	251
Desmanthus	278
Dianella	115
Dianthus	157
Dichondra	83
Dictamnus	150
Diervilla	56
Digitalis	242
Dillenia	217
Dioscorea	364
Diosma	69
Diospyros	366
Diotis	339
Disandra	132
Dodecatheon	45
Dodonaea	136
Dolichos	287
Dombeya	269
Doronicum	317
Dorstenia	340
Dracaena	115
Dracocephalum	232
Dracontium	133
Drimia	117
Dryas	204
Duranta	236

E

	Seite
Echinops	333
Echites	77
Echium	41
Eckebergia sieh Trichilia	
Ehretia	42
Elaeagnus	36
Elaeodendrum	67
Elephantopus	333
Eleusine	26
Elichrysum	307
Ellisia	43
Embothrium	30
Empetrum	359
Encelia sieh Pallasia	
Ephedra	371
Epidendrum	334
Epilobium	135
Epimedium	34
Eranthemum sieh Ruellia	
Erianthus	27
Erica	138
Erigeron	309
Eriocephalus	333
Eriospermum	111
Erodium	258
Eryngium	86
Erythrina	283
Eucalyptus	181
Euclea	368
Eucomis	109
Eugenia	180

	Seite
Eupatorium	302
Euphorbia	170
Evonymus	68
Exacum	33

F.

Fabricia	178
Fagara	35
Fagus	340
Ferraria	253
Ferrula	88
Ficus	359
Flacourtia	6 8
Fontanesia	7
Fothergilla	213
Fragaria	203
Frankenia	129
Fraxinus	358
Fritillaria	109
Fuchsia	135
Fumaria sieh Corydalis	

G.

Galanthus	104
Galaxia sieh Ixia	
Galega	294
Gardenia	53
Gaura	135
Genista	285
Gentiana	82
Georgina	318
Geranium	266
Gesneria	247
Geum	204
Ginkgo sieh Salisburia	
Gladiolus	19
Glaucium	206
Gleditschia	365
Globularia	30
Gloriosa	110
Gloxinia	247
Glycine	287
Glycirrhiza	291
Gnaphalium	307
Gnidia	140
Gomphrena	73
Goodenia	52
Gorteria	327
Gossypium	274
Gouania	70
Grewia	208
Guajacum	149
Guazuma	268
Guilandina sieh Moringa et Gymnocladus	
Gypsophila	157

H.

Haemanthus	103
Hakea	29
Halesia	168
Halleria	243
Haloragis	143
Hamamelis	37
Hamellia	53
Harrachia	248

	Seite
Hebenstreitia	238
Hedera	71
Hedychium	2
Hedysarum	293
Helenium	325
Helianthemum	212
Helianthus	325
Helichrysum sieh Elichrysum	
Heliconia	75
Helicteris	268
Heliocarpus	169
Heliotropium	38
Helleborus	223
Hemerocallis	126
Hemimeris	242
Hemionitis	372
Hepatica	218
Heracleum	88
Heritiera	355
Hermannia	254
Hernandia	337
Hesperis	252
Heuchera	83
Hibiscus	274
Hieracium	297
Hippia	332
Hippocrepis	292
Hippomane	353
Hippophaë	362
Hoffmanseggia	148
Homalium	214
Horminum	232
Hortensia sieh Hydrangea	
Hosta sieh Hemerocallis et Cornutia	
Hostana sieh Cornutia	
Houstonia	31
Humea	301
Humulus	364
Hura	353
Hyacinthus	117
Hydrangea	155
Hydrophyllum	43
Hymenaea	147
Hyosciamus	57
Hyperanthera sieh Moringa	
Hypericum	216
Hypoxis	111
Hyssopus	225

I.

Jacquinia	65
Jasminum	5
Jatropha	352
Iberis	249
Ilex	37
Illecebrum	74
Impatiens	73
Imperatoria	90
Indigofera	293
Inga	277
Inula	316
Ipomoea	48
Iris	23
Isatis	250
Isopyrum	223
Itea	47
Juglans	343

	Seite
Juniperus	370
Justicia	10
Iva	333
Ixia	21
Ixora	32

K.

Kaempferia	3
Kalmia	151
Kennedia sieh Glycine	
Kiggellaria	367
Killingia	25
Kitaibelia	273
Knautia	31
Koelreuteria	135
Kookia	150

L.

Lachenalia	118
Lachnaea	140
Lagerstroemia	210
Lagunaea	276
Lamium	228
Lancisia sieh Liddeckia	
Lantana	235
Larochea sieh Crassula	
Laserpitium	88
Latania	369
Lathyrus	288
Laurus	143
Lavandula	226
Lavatera	272
Ledum	151
Leea	65
Leptospermum	178
Lespedeza sieh Hedysarum	
Leucoium	104
Lidbeckia	321
Ligusticum	88
Ligustrum	6
Lilium	109
Limodorum	335
Limonia	150
Linaria	239
Linum	98
Liquidambar	346
Liquiritia sieh Glycirrhiza	
Liriodendron	217
Lithospermum	39
Lobelia	253
Lomandra	129
Lomatophyllum	120
Lonicera	55
Lopezia	4
Lotus	296
Ludia	210
Lunaria	251
Lupinus	286
Lychnis	167
Lycium	63
Lycopsis	41
Lycopus	11
Lysimachia	46
Lythrum	169

Seite

M.

Macrocnemum 53
Madia 309
Magnolia 217
Mahernia 256
Malachra 271
Malpighia 160
Malva 271
Mandragora 58
Manglilla sieh Sclerroxylon
Manulea 238
Maranta 3
Marrubium 229
Massonia 103
Matricaria 321
Maurandia 241
Medeola sieh Myrsiphyllum
Medicago 296
Melaleuca 179
Melastoma 151
Melia 151
Melianthus 248
Melicocca 135
Melissa 232
Melittis 232
Melochia 256
Menispermum 368
Mentha 227
Mentzelia 209
Menyanthes 45
Mesembrianthemum 189
Mespilus 185
Messerschmidia 41
Metrosideros 179
Meum sieh Aethusa
Mikania 302
Mimosa 278
Mimulus 243
Mirabilis 47
Modecca 95
Moehringia 141
Moluccella 230
Momordica 355
Monarda 12
Monetia 35
Monsonia 268
Moraea 22
Moringa 148
Morus 340
Murraya 150
Musa 101
Muscari 117
Myosotis 38
Myrica 362
Myrsine 64
Myrsiphyllum 131
Myrtus 181

N.

Napaea sieh Sida
Narcissus 104
Nemesia 240
Nepeta 226
Nerium 77
Nicandra 59
Nicotiana 57
Nigella 215

	Seite
Nissolia	283
Nolana	43
Nymphaea	207

O.

Ochrosia	75
Ocymum	233
Oenothera	134
Olea	6
Onoclea sieh Struthiopteris	
Ononis	285
Onosma	41
Ophioxylon sieh Ochrosia	
Origanum	230
Ornithogalum	111
Ornus sieh Fraxinus	
Orobus	288
Orontium	127
Orontium sieh Antirrhinum	
Oryza	129
Osmunda sieh Struthiopteris et Blechnum	
Osteospermum	332
Ostrya	346
Osyris	359
Othonna	332
Oxalis	163

P.

Pachysandra	339
Paederia	54
Paeonia	213
Pallasia	327
Panax	86
Pancratium	105
Pandanus	357
Panicum	26
Papaver	207
Parietaria	340
Parkinsonia	148
Parnassia	96
Pascalia	324
Paspalum sieh Ceresia	
Passerina	140
Passiflora	256
Pastinaca	90
Paullinia	142
Pavonia	276
Pelargonium	259
Peltaria	250
Pentapetes	269
Pentstemon	245
Pentzia	305
Perilla	228
Periphragmos sieh Vestia	
Periploca	78
Petiveria	132
Phalangium sieh Anthericum	
Phalaris	26
Philadelphus	178
Phillyrea	6
Phlomis	230
Phlox	49
Phoenix	365

	Seite
Phormium	118
Phylica	69
Phyllanthus	353
Phyllis	86
Physalis	59
Phyteuma	52
Phytolacca	167
Picramnia	363
Picridium sieh Sonchus	
Pinus	349
Piper	15
Piqueria	301
Pisonia	132
Pistacia	363
Pitcairnia	102
Pittosporum	70
Planera	84
Plantago	33
Platanus	346
Plectranthus	233
Plinia sieh Eugenia	
Plumbago	47
Plumeria	77
Podalyria	146
Podocarpus	351
Pogonia	64
Polemonium	49
Polyanthes	116
Polygala	282
Polygonum	141
Polymnia	330
Polypodium	373
Pontederia	102
Populus	365
Porcelia sieh Annona	
Portulaca	169
Portulacaria	96
Potentilla	203
Pothos	35
Prasium	234
Prenanthes	297
Primula	43
Prinos	128
Priva	235
Protea	28
Prunella	234
Prunus	182
Psiadia	309
Psidium	180
Psoralea	295
Psychotria	54
Ptelea	35
Pteris	375
Pulmonaria	40
Pulsatilla	218
Punica	182
Pyrola	154
Pyrethrum	320
Pyrus	187

Q.

Quercus	343

R.

Rafnia	283
Randia sieh Gardenia	
Ranunculus	222
Rauwolfia	75
Renealmia	2

	Seite
Reseda	170
Rhamnus	66
Rheum	144
Rhipidodendrum	120
Rhodiola sieh Sedum	
Rhododendrum	152
Rhus	91
Ribes	70
Ricinus	353
Riyina	36
Robinia	290
Rondeletia	53
Rosa	199
Rosmarinus	12
Royena	155
Rubia	32
Rubus	202
Rudbeckia	326
Ruellia	247
Ruizia	273
Rumex	130
Ruscus	371
Ruta	150

S.

Saccharum	27
Salicornia	4
Salisburia	347
Salsola	85
Salvia	12
Sambucus	94
Sanguisorba	33
Sanseviera	116
Santolina	304
Sapindus	143
Saponaria	157
Satureja	225
Saururus	133
Saxifraga	156
Scabiosa	30
Scandix	89
Schinus	367
Schollia	80
Schotia	149
Scilla	112
Scleroxylum	66
Scolopendrium	375
Scolymus	298
Scrophularia	241
Scutellaria	234
Sedum	162
Selago	238
Sempervivum	173
Senecio	309
Seriana	142
Serissa	54
Serratula	299
Sesbania sieh Coronilla	
Sickingia	165
Sicyos	356
Sida	270
Sideritis	227
Sideroxylum	65
Silene	159
Silphium	329
Sison	89
Sisyrinchium	252
Smilax	364
Smyrnium	90

	Seite
Solandra	58
Solanum	59
Soldanella	45
Solidago	315
Sonchus	297
Sophora	145
Sorbus	185
Sparmannia	208
Spartium	284
Spermacoce	31
Spielmannia	33
Spigelia	82
Spilanthus	300
Spiraea	198
Stachys	229
Stachytarpheta	11
Staehelina	300
Stapelia	80
Staphylea	95
Statice	97
Stellaria	160
Stephania	128
Sterculia	268
Stevia	303
Stratiotes	368
Strelitzia	75
Strumaria	104
Struthiopteris	374
Styphelia	46
Styrax	154
Symphoricarpos	55
Symphytum	40
Syringa	7

T.

	Seite
Tabernaemontana	77
Tagetes	319
Talinum	169
Tamarindus	252
Tamarix	95
Tanacetum	305
Tarchonanthes	304
Taxus	370
Teedia sieh Capraria	
Terminalia	154
Ternstroemia	210
Tetragonia	189
Teucrium	224
Thalia	3
Thalictrum	221
Thea	210
Theobroma sieh Guazuma	
Theophrasta	75
Thrinax	127
Thuja	350
Thymus	231
Tigridia sieh Ferraria	
Tilia	208
Tillandsia	102
Tormentilla	204
Tournefortia	42
Trachelium	52
Tradescantia	102
Tragia	337
Trevirana	244

	Seite
Trichilia	150
Trichomanes sieh Davallia	
Trilix	210
Triplaris	366
Tripsacum	336
Triumfetta	169
Trollius	223
Tropaeolum	134
Tulbagia	104
Tulipa	110
Turnera	95
Tussilago.	318

U.

Ulex	285
Ulmus	83
Urena	273
Urtica	339
Utricularia	10

V.

Vaccinium	152
Valeriana	18
Vallisneria	357
Vanilla	335
Varronia	42
Veltheimia	119
Verbascum	56
Verbena	234
Verbesina	324
Verea sieh Calanchoë	
Vernonia	303
Veronica	8
Verratum	130
Vestia	50
Viburnum	93
Vinca	76
Viola	72
Viscum	361
Visnea	173
Vitex	237
Vitis	72
Volkameria	237
Volkmannia sieh Clerodendron	

W.

Waldschmidtia sieh Menyanthes	
Waldsteinia	184
Watsonia	19
Westeringia	231
Woodwardia	376
Wulfenia	9

X.

Xenopoma	247
Xeranthemum	306
Ximenesia	324
Xylophylla	354

Y.

Yucca	119

Z.

	Seite		Seite
Zamia	369	Ziziphora	12
Zanthorrhiza	101	Zizyphus	67
Zanthoxylum	363	Zuccagnia	118
Zinnia	319	Zygophyllum	149

ZUSÄTZE.

Jasminum, Jasmin. (Diandr. Monogyn.)

1. *J. mauritianum.* Desfont. cat. horti bot. paris. p. 53. Moritzischer Jasmin. Auf der St. Moritzinsel. —. W. H. ♄.

Justicia, Justicie.

1. *J. hyssopifolia.* Pers. syn. pl. 1. p. 22. Isoppblättrige Justicie. Auf den Canarischen Inseln. —. Ch. ♄.

Salvia, Salbey.

1. *S. indica.* Pers. l. c. 1. p. 26. Indische Salbey. In Ostindien. Apr. May. W. H. ♃.

Campanula, Glockenblume. (Pentandr. Monogyn.)

1. *C. versicolor.* Catal. horti bot. carlsruh. p. 51. Verschiedenfarbige Glockenblume. —. —. Ch. ♃.

Ribes, Johannisbeere.

1. *R. Uva crispa.* Pers. l. c. 1. p. 252. Glatte Johannisbeere. Im nördlichen Europa. Apr. May. Im F. ♄.

Pomaderis, Pomaderis.

1. *P. apetula.* Labillardiére specim. Nov. Holl. 1. p. 62. t. 87. Blumenlose Pomaderis. Am Cap Van-Diemen in Neuholland. —. Ch. ♄.

Statice, Statice. (Pentandr. Pentagyn.)

1. *St. graminifolia.* Pers. l. c. 1. p. 332. Grasblättrige Statice. An der Wolga. Jun. — Aug. Im F. ♃.

2. *St. auriculaefolia.* Pers. l. c. Aurikelblättrige Statice. Am Meerstrande der Barbarey. Jun. — Aug. Im F. 4.

Lachenalia, Lachenalie. (Hexandr. Monogyn.)

1. *L. orchioides.* Pers. l. c. 1. p. 376. Ragwurzartige Lachenalie. Am Cap. März. Ch. 4.

Juncus, Simse.

1. *J. maximus.* Pers. l. c. 1. p. 385. Gröfste Simse. Auf waldigen Bergen in Eur. Apr. May. Im F. 4.
J. latifolius. Wulff. in Jacq. coll. 3. p. 59.

Melanthium, Schwarzblume. (Hexandr. Trigyn.)

1. *M. eucomoides.* Pers. l. c. 1. p. 397. Schopflilienartige Schwarzblume. Am Cap. — Ch. 4.

Rhapis, Rhapis.

1. *Rh. flabelliformis.* Ait. hort. kew. 3. p. 473. Fächerblättrige Rhapis. In China u. Japan. Jun. Jul. W. H. ♄.
Chamaerops excelsa. Pers. l. c. 1. p. 400.

2. *Rh. acaulis.* Willd. sp. pl. 4. p. 1093. Stammlose Rhapis. In Carolina u. Georgien. Jun. Jul. W. H. ♄.
Sabal minor. Pers. l. c. 1. p. 399.
Corypha — Jacq. hort. vind. 3. p. 8. t. 8.
Chamaerops acaulis. Michaux fl. amer. 2. p. 207.

Cardiospermum, Herzsame. (Octandr. Trigyn.)

1. *C. Halicacabum.* Pers. l. c. 1. p. 444. Glatter Herzsame. In beyden Indien. Jun. — Aug. W. H. ☉.

Cafsia, Cafsie. (Decandr. Monogyn.)

1. *C. mexicana.* Pers. l. c. 1. p. 458. Mexicanische Cassie. In Mexico. Jun. Jul. W. H. ♄.

Cadia, Cadie.

1. *C. purpurea.* Pers. l. c. 1. p. 461. Rothe Cadie. Im glücklichen Arabien. —. W. H. ♄.

Clerodendrum, Losbaum. (Didynam. Angiosp.)

1. *Cl. infortunatum.* Pers. l. c. 2. 145. Unglücklicher Losbaum. In Ostindien. —. W.H. ♄.

Ruellia, Ruellie.

1. *R. paniculata.* Pers. l. c. 2. p. 177. Rispenblättrige Ruellie. Auf Hügeln in Südjamaica. Jun. — Aug. W.H. ♄.

Pelargonium, Kranichschnabel. (Monadelph. Heptandr.)

1. *P. Tormane.* Cat. horti carlsruh. p. 119. Tormanescher Kranichschnabel. —. May, Jun. Ch. ♄.

2. *P. Burmanni.* Cujus? Burmann'scher Kranichschnabel. —. May — Jul. Ch. 24.

3. *P. formosissimum.* Desfont. cat. horti paris. p. 141. Schönster Kranichschnabel. Am Cap. May — Jul. Ch. ♄.

4. *P. formosum.* Cat. horti bot. carlsruh. p. 118. Anmuthiger Kranichschnabel. —. May — Jul. Ch. ♄.

5. *P. superbum.* Cujus? Herrlicher Kranichschnabel. —. May — Jul. Ch. ♄.

Hedysarum, Hahnenkopf. (Diadelph. Decandr.)

1. *H. canescens.* Pers. l. c. 2. p. 321. Graulicher Hahnenkopf. In Virginien. —. K. H. 24.

Alnus, Erle. (Monoecia Tetrandr.)

1. *A. undulata.* Pers. l. c. 2. p. 550. Wellenblättrige Erle. In Canada. Apr. Im F. ♄. Betula crispa. Ait hort. kew. 3. p. 339.

Verbesserungen.

Seite	Zeile	
2		letzte setze hinzu: Coll. 1. p. 143.
3	9	zu Jacq ic. etc. setze: Collect. 4. p. 117.
4	5	von unten besonders statt hesonders.
6	13	lies: 16 statt 6.
9	5	von unten dentata st. dendata.
19	6	von unten folgende st. folgenden.
22	4	Nro. 4 ist überflüssig.
23	15	Swertischer st. Schwertischer.
28	11	folgende st. folgenden.
29	13	übrige st. übrigen.
29	7	von unten folgende st. folgenden.
30	3	Embothrium st. Embothryum.
33		letzte ♄ st. 24.
34	5	24 st. ♄.
34	7	♄ st. 24.
44	7	gefülltvioleter st. gefülltvioletter.
46		letzte setze hinzu: May.
48	4	von unten violeter st. violetter.
50	9	u. 11 Apr. st. Jun. Jul.
50		letzte persicifolia st. versicifolia.
51	10	von unten nach Kitaib. pl. rar. setze hinzu: 2. p. 65. t. 64.
53	13	Hamellia st. Hamelia.
71	4	setze hinzu: Oesterreichischen.
76	15	Apr. st. Jun. Jul.
95	2	May st. Jun. Jul.
96	3	von unten Grasnelke st. Armerie.
97	9	tige st. lige.
102	8	Ananasblättrige st. Ananasblätttrige.
106	10	Bogenlilie st. Bonlilie.
108	2	von unten Sibiriens st. Steyermarks.
110	9	wilde st. willde u. maialis st. mayalis.
120	13	lies: Nr. 322 st. 310 u. so fort bis an's Ende.
124	8	A. saponaria st. Asaponaria.
133	3	von unten Eidechsenschwanz st. Eidechenschwanz.
139	1	hispida st. hisvida.
147	13	West-indische st. We-stindische.
153	10	Winkelblüthige st. Winkelblättrige.

Seite	Zeile	
172	10	von unten nach Jacq. ic. rar. setze: 1.
177	12	fa-ckeldistel st. fa-keldistel.
197	11	flügelstielige st. fliegelstielige.
203	11	grandiflora st. graodiflora.
203	10	von unten Spaltblätt. st Spaltelblätt.
203	6	— — Canada st. Cschnada.
204	13	Tormentille st. Tormentill.
207	1	phoeniceum st. phoenicium.
207	6	violetes st. violettes.
215	16	unterscheidenden st. unterscheidende.
216	2	Erdbeersame st. Erdbarsame.
217		statt 117.
218	6	von unten zwischen Jun. u. F. setze Im.
220	10	v. u. zwischen Nordamer. u. — setze: Jun.
220	4	von unten 24 st. ♄.
221	4	24 st. W.
223	16	März — May st. May.
226	4	langgriffliger st. langrüfsliger.
228	13	Pulegium st. pulegium.
228	8	von unten Orvala st. onvala.
228	4	Berge st. Bergen.
231	2	vor Steyermark setze: In.
233	4	sibiricum st. Sibiricum.
234	5	von unten Angiospermia st. Angiosperma.
235	4	Jun. Aug. st. Jun. —, und 24 st. W.
236	6	von unten cinereum st. cynereum.
240	12	v. unten nach Antirrhinum setze: Löwenmaul u. dem st. den.
251	12	Apr. st. Jun. Jul.
274	3	von unten Lampas st. Lampus.
279	13	obliqua st. ogliqua.
280	17	M. st. A.
299	4	Carlowizia st. Carlovizia.
312	5	Isopp st. Ysopp.
331	15	nach Aug. lies. Ch.
350	7	v. unt. Gemeine Fichte st. Weifs-Tanne.
364	3	von unten feinbehaarte st. feinbeharrte.
373	10	In st. zwischen.
379	4	von unten Averrhoa st. Averhoa.
384	nach 9	v. unten setze: Gymnocladus Seite 367.

Anmerkung f. d. Buchbinder: Dieses Blatt mufs

1

cianeus

4

caesius

7

prasinus

10

luteus

13

21. ~~latrni~~ Ziegelfarben

22. scharlachroth

23. fleischfarben

24. safranfarbig dunkel orang

25. hochroth wie Carmin

26. blutroth

27. rosenroth

1. cæruleo-ceruleus sive Lasurblau
2. ceruleo-viridis cum nonnihil cinereo
3. ceruleus albo-virens
4. viridi-ceruleus
5. viridi-flavus cum nonnihil albedine
6. viridi-pinguis olivaceus
7. pinguis
8. flavo-virens cum nonnihil albedine
9. flavo-virens cum nonnihil cinereo
10. mere flavus
11. rufescens cum nonnihil cinereo
12. flavo-rufescens
13. rufescens
14. rufescens
15. rufescens
16. rufescens
17. rufescens
18. rufescens
19. rufescens
20. rufescens
21. rufescens
22. rufescens
23. rufescens
24. rufescens
25. rufescens
26. rufescens
27. rufescens
28. rufescens
29. rufescens
30. rufescens
31. rufescens
32. rufescens
33. rufescens
34. rufescens
35. rufescens
36. rufescens

11. rufescens flavo-virens
12. rufescens flavus
13. rufescens flavus
14. rufescens flavus nonnihil cinereus
15. rufescens flavus
16. rufescens flavus
17. rufescens flavus
18. rufescens flavus nonnihil cinereus
19. rufescens flavus
20. rufescens flavus
21. rufescens flavus
22. rufescens flavus
23. rufescens flavus
24. rufescens flavus nonnihil cinereus
25. rufescens flavus
26. rufescens flavus
27. rufescens flavus
28. rufescens flavus
29. rufescens flavus nonnihil cinereus
30. rufescens flavus
31. rufescens flavus
32. rufescens flavus
33. rufescens flavus
34. rufescens flavus
35. rufescens flavus
36. rufescens flavus.